



BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III

RACCOLTA
VILLAROSA

B
801
NAPOLI





B. de Grado Fec.

609671

Racc. Vill. B. 801

(1)

I S T O R I A .
D E L L'
ACCADEMIA
R E A L E
DELLE SCIENZE.

Dell' Anno M. DC. XCIX.

Con le Memorie di Matematica , e di
Fisica dell' istesso Anno .

Ritratte da Registri di detta Accademia.

Tradotte dalla Lingua Franzese
nell' Italiana .



IN NAPOLI M. DCC. XXXIX.

A spese di Bernardino Gessari .

Nella Stamperia di Felice-Carlo Mosca ,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

15700

—

IM

...

...

P

BERARDINO GESSARI A DOTTI NAPOLETANI.

IO credo Carissimi Compatriotti, che bastanti ripruove abbiate dello amor mio, e della cura, che mi ha, senza rifinar mai, tenuto sollecito di contribuire per quanto è in me al vostro comun bene, e profitto. Le molte edizioni di varj rinomatissimi libri de' più chiari Scrittori de' nostri tempi da me per vostro comodo fatte, e le penose inchieste sù di tal genere non tralasciate mai, affinché niun lume

a 2 dal-

dalle belle vostre menti si desiderasse, son argomenti, che pur lo dovrebbero aver fatto ad occhi veggenti conoscere. Ma non son io già contento di me, come ch'ama daddovero non è mai soddisfatto di se stesso: Con altra più vigorosa dimostrazione ho deliberato di vincer l'animo vostro, e ritrarne così quel grato riconoscimento, che da gentilissimi, & onesti petti non si scompagna mai. Eccovi le Storie, e Memorie della Celebratissima Accademia Reale delle Scienze di Francia trattate nell' Italiano parlare con quella fedele traduzione, che un mio Amico ha saputo far migliore. Io credo, che 'l solo nome dell' Opera basti per commendarvi, e che ogni cosa, che mai sapessi, o
po-

*potessi io aggiugnere in lode di es-
sa, scemerebbe il di lei pregio, e
le vercherebbe onta, e scorno; e
credo ancora, che 'l vederla nella
nata nostra lingua, la vi rende-
rà doppiamente cara, e commen-
data. Egli è vero, che le Opere
traportate in altro linguaggio da
quello, in cui sono state prima
scritte, perdendo la vivezza, che
ciascun Idioma ha propria, non
sian più le stesse, mancando loro
quel Sale; che seco il naturale
ornato porta: E che non vi sia og-
gi Scrittor Franzese, che giun-
ga alla incomparabil pulitezza
del Signor Fontenelle dottissimo
Segretario di detta Accademia,
che alla felicità maravigliosa di
concepir le Scienze più alte, ag-
giugne quella di ornatamente*

*sprimerle in ristretto: Che è quan-
to dire, esser questa una troppo
dura, e malegevole impresa di
rendere ugualmente con esattez-
za i fatti, e dottrine, che subli-
mi contiene, & ornarli, & ab-
bellirli con leggiadria, & elegan-
za, se non pari, almen poco, di-
varia; Pur tuttavia l'Amico,
che si ha presa una tal cura, mi-
surando il bene, che alla nostra
gioventù può venire da sì fatta
Opera, con qualunque altro pri-
vato comodo, ha tutto lo studio
impiegato nel tradurre fedelmen-
te le cose, e dettarle nella maniera,
che ha egli saputo più acconcia, e
da non rifiutare Ond'è che non a-
ve egli avuto lo scrupolo di tener
le voci delle Scienze, e delle Arti,
talì appunto, quali si scrivono, o
che*

che l'Accademia le abbia ricevute, o no; & ha procurato talvolta poco, o nulla di appararsi dalla giacitura de' periodi Franzesi, quantunque nella nostra più numerosa lingua ne venga perciò lo stile a saltarello, e staccato, su la mira di esser questa una raccolta di materie scientifiche, e non già di eloquenza.

Per tutti questi mie' studj, e fatiche, io non dimando altro compensame, che quello del solo vostro gradimento, e della memoria d'un Amorofo Cittadino, che non lascia, a misura delle proprie debolezze di giovare al comun bene, risparmio, e profitto. Se la mia età un poco avanzata mi darà luogo, ridotta a fine questa novella giovevolissima impresa,

Sa , di ripigliarne altra dell'istesso ordine ; credete pure , che non si rimarrà per altro l'ardente vogliossissimo mio desiderio. Frattanto godetevi di queste , per dirle così , primizie di cose maggiori , e fatemi cuore ad intraprenderne altre , col gradimento delle presenti . State sani .



PRE-

PREFAZIONE.



SECONDO le regole date dal Re all'Accademia Reale delle Scienze su 'l principio dell' Anno 1699. , quest' Istoria avrebbe dovuta esser alla luce nel fine dell' istesso Anno : ma perche venivasi per esse a rinnovare l' intiera Accademia ; vi è corso qualche tempo per dare a tutte le cose un primiero movimento, che oggimai farà di più facile durata. Senza noverar partitamente tutto ciò, che ha ritardata una impressione, quale due Anni prima doveva esser fatta ; basta qui dire , che l' Istoria dell' Anno 1700. è cominciata ad imprimerfi nel finir questa, e che

P R E F A Z I O N E:

e che l'Anno 1701. immantinente seguirà senza interrompimento alcuno, fin tanto che si verrà a diffiniti termini delle Regole.

L'Istoria dell'Accademia delle Scienze altro propriamente non è, che una storia delle di lei opere, e pensamenti, trattone alcuni fatti, che si appartengono al nuovo stabilimento, quali nel solo Anno 1699. si avvisano.

Contiene questa Istoria due parti: Una, che si è più particolarmente detta Istoria, è l'estratto, o lo compendio di tutto ciò, che di pregio, o in iscritto, o a voce si è nell'Accademia detto; l'altra parte la formano le Memorie, cioè quei discorsi fra tutti letti nell'Adunanza, che sono stati riputati li più importanti, e più degni da donarsi al Pubblico intieri. Queste Memorie
son

P R E F A Z I O N E.

son poste quì , come gli atti originali nelle Istorie ordinarie , o come pruove , che talvolta su 'l fine s'imprimono .

Comprende l'Istoria più di quel che le Memorie contengono : An voluto , che ricogliesse ella, oltre alle materie , che trattansi , quelle ancora , che non istimavasi a proposito , di darsi per disteso, e che frattanto non si volevano affatto taciute : Nello stesso tempo si è procurato in tutti i soggetti , o comuni con le Memorie , o particolari , che si fusse ella proporzionata all'intendimento di coloro , che non anno , se non se mediocre conoscenza di Matematica, e di Fisica : Poicche per coloro , che affatto non lo anno , sarebbe miglior consiglio di cominciare da' principj , per non obbligarci , a loro riguardo , di rivenire per lun-

P R E F A Z I O N E.

lungli ragionamenti fino a primi elementi delle scienze.

Si è cercato di rendere perciò questa Istoria confacevole a maggior numero di persone, che fusse possibile mai; e nelle occasioni di spargervi lumi proprj a rischiarar le Memorie, sicche alcuna di queste potrà più agevolmente intendersi, se ri- giugnerassi con quella parte della Istoria, che li corrisponde.

Quando una materia non ha sofferto di essere in altra guisa tradotta, e meno a fondo trattata, di quello, che nelle Memorie erasi, locche avviene talvolta su 'l fatto delle Machine, e nelle dimostrazioni di Geometria, e di Algebra, si è sotto silenzio passata; semprecche non vi sia stato luogo di avvertire istoricamente i progressi, che si eran fatti in tali
fac-

P R E F A Z I O N E.

faccende, e di rendere avvifati que',
che anno per lo meno il piacere di
fentire i progressi delle scienze , e
delle arti.

Quando all' incontro una ma-
teria contenuta nelle Memorie erasi
così chiara di per se , che non sa-
rebbeſi potuta rendere di vantaggio
nella ſtoria , ſi è riſparmiato l'inu-
tile travaglio , di ripeterle.

In genere , così riguardo aven-
do a' Savj profondi , che a coloro,
che non lo ſono , ſi è ſtimato bene
di presentarli ſotto due differenti
forme le materie , che compongono
queſta raccolta ; perche fuſſero più
conofciute le fatighe degli Accade-
mici , e ſi diffondette maggiormente
il guſto delle Scienze.

Ma a che giova , che il guſto
delle Matematiche , e della Fiſica
ſi ſpanda ? qual prò le occupazioni
dell'

P R E F A Z I O N E .

dell' Accademia fanno ? Questa è una domanda molto volgare , e che la maggior parte degli Uomini non la fa , come per dimanda ; ond' è , che io credo a proposito, di dar qualche lume sù di ciò .

Riputasi volentieri inutile quella che non si sà , essendo questa una spezie di vendetta ; e siccome le Matematiche , e la Fisica generalmente sono incognite , son tenute per inutili , e la cagione della loro disgrazia è pur chiara , essendo i sentieri di esse selvatici , spinosi , e difficili a valicarsi .

Abbiain noi una Luna , che ne rende chiara la notte , che n' importa , diran forse , che Giove ne abbia quattro ? Perche tante , e sì penose osservazioni , tanti faticosissimi calcoli , per avere un esatto conoscimento del loro corso ? Noi non
ver-

P R E F A Z I O N E.

verrem mai ad esserne rischiarati, e la natura, che ha poste queste picciole stelle lungi dalla nostra veduta, mostra, che non le ha formate per noi.

Per un ragionamento di tanto plauso, avriam dovuto trascurare di osservarle col cannocchiale, e di studiarvici; e pure egli è fermo, che molta perdita avriam fatti. Per poco, che s'intendano i principj della Geografia, e della Navigazione, conoscesi, che dopo che le quattro lune di Giove si sono scoperte, sono state a noi più utili, riguardo a queste scienze, che l'istessa nostra Luna; che servono esse, e serviranno via più di giorno in giorno a formar le carte marittime, senza paragon più giuste delle antiche, per cui camperanno manifestamente la morte una infinità di Naviganti. Non vi fusse
in

P R E F A Z I O N E:

in tutta la Stronomia altro utile di questo , che si ricava da Satelliti di Giove , ben impiegati , per esso i suoi immensi calcoli , e le sue continue osservazioni , e minute , i suoi grandi apparati di Strumenti con tanta diligenza travagliati , e le sue superbe fabbriche unicamente per uso di detta scienza innalzate , riputerebbonfi . Frattanto la gente grossolana , o non conosce i Satelliti di Giove , se non se forse per fama , e molto confusamente ; o ignora il legame , che colla navigazione li stringe ; o non sa , che nel nostro secolo sia questa ridotta a maggior perfezione .

Tale si è la sorte delle Scienze trattate da picciol numero di persone : l'utile de' loro progressi è sconosciuto alla maggior parte del mondo , tanto più se si restringano esse

tra

P R E F A Z I O N E.

tra professioni meno rilevate, e chiare . Che fiasi oggi reso più facile il regular Fiumi, formar Canali, e stabilir nuove navigazioni ; poicche senza paragone e' si sà meglio livellare un terreno, e far Chiuse, chi l'avverte ? Si è scemata la fatica a Fabricatori, a Marinari; e pur essi non si sono avveduti dell'abilità del Geometra , che liquidava, in guisa mossa , come corpo lo è da un Anima , che affatto egli non conosce ; così il rimanente del Mondo molto meno si è avvertito del Genio , che faceva capo nelle imprese ; ne 'l Pubblico ha fatto galloria a suoi felici avvenimenti , non senza taccia d'ingratitude .

La Notomia , che si coltiva da qualche tempo con tanta accuratezza , in divenendo esatta , ha resa più sicuramente ardita la Chirurgia

Istor.

b

nel.

P R E F A Z I O N E . .

nelle operazioni . I Cerusici ben la fanno , ma quelli , che della loro perizia godono , non la fan fermamente : E come potrebbero saperla ? E' bisognarebbe , che mettessero in confronto la Chirurgia antica colla nuova , studio grande , che nulla lor si conviene . L' operazione è riuscita , tanto basta , nulla importa il sapere , se in altro secolo avrebbe avuto l'istesso buon esito .

E' veramente da sorprendere , che tante cose si parino d'avanti a nostri occhi , che noi non vediamo : Da per tutto brillano nelle botteghe d'Artigiani lo spirito , e l'Invenzione , quali pur non richiamano l'attenzione nostra ; Mancano Spettatori a' strumenti , & ad utilissime pratiche immaginate con fior di senno , le quali farebbero inarcar per lo stupore le ciglia a coloro , che sapessero ben ammirarle .

Se

P R E F A Z I O N E.

Se una dotta Società con suoi lumi ha contribuito a render più perfetta la Geometria , la Notomia, la Mecanica , o in fine altra Scienza utile , non bisogna pretendere , che per lontane ricerche conosca il motivo , donde sappia quel grado , per onorarla su 'l beneficio delle di lei produzioni . Sarà sempre più facile al Pubblico di goder di que' vantaggi , quali ella lor procura , che di conoscerli . La ^a determinazione delle longitudini per mezzo de' Satelliti, la scoperta del Doccio Toracico , una livella più comoda , e più giusta , non sono novità da far rumor tale, quanto un piacevole Poema , o una eloquente Orazione.

L'utile, che dalle Matematiche , e dalla Fisica si ha , tuttoche in verità men sensibile e' sia , non è, che non sia reale : In considerando

P R E F A Z I O N E.

gli Uomini nel naturale loro essere, niuna cosa l'è più profittevole, quanto quella , che può conservargli la vita , e produrre le arti , quali sono d'un sommo beneficio , & ornamento alla sozietà.

Quelche riguarda alla conservazione della vita , si appartiene particolarmente alla Fisica , e sù di tal mira è stata ella divisa nell' Accademia in tre rami , che formano tre differenti spezie di Accademici , la Notomia , la Chimica , e la Botanica . Troppo ben si conosce quanto monti il saper con esattezza i corpi umani , & i rimedj , che da minerali , e dalle piante possan averfi .

Quanto alle Arti , il di cui numero è infinito , alcune dipendono dalla Fisica , & altre dalla Matematica -

E'sembra, che se si volessero restringe-

P R E F A Z I O N E:

ignere le Matematiche in quella lor parte sola, che giova, converrebbe unicamente coltivar quelle , che le Arti immediatamente , e sensibilmente riguardano, e lasciar tutto il rimanente , come una vana Teorica. Ma questa sarebbe una molto falsa idea: L'Arte Nautica, per cagion di esempio , dipende necessariamente dalla Stronomia , e nè mai questa per lo solo utile della Navigazione potrà avanzarsi : Non può far a meno dell'Ottica , per i Cannocchiali , e l'una, e l'altra , come tutte le parti della Matematica son fondate sù la Geometria , & in fine sù l'Algebra istessa.

La Geometria , e soprattutto l'Algebra sono le chiavi di quanto nella grandezza cercafi. Queste Scienze , che s'impiegano sopra di ragioni astratte , & idee semplici , sem-

b 3

brar

P R E F A Z I O N E.

brar possono infruttuose , finattanto che si contengono , per così dire , nel Mondo intellettuale : Ma le Matematiche misle , che vengono a' fatti ; e considerano i movimenti delle stelle , l'accrescimento delle forze moventi , le differenti vie , che tengono i raggi della luce ne' varj mezzi , i diversi effetti del suono per le vibrazioni delle corde , in una parola , tutte le Scienze , che scoprono le ragioni particolari delle grandezze sensibili , si avanzano di più , e con maggior sicurezza , quanto più l'arte di svelare le ragioni in generale è più perfetta . L'istrumento universale non può troppo diffondersi , esser molto trattabile , e troppo facile ad applicarsi a qualche si vorrà ; Egli però è utile per lo bene di tutte le Scienze ; che non saprebbero fare a meno del suo ajuto ; quindi

P R E F A Z I O N E.

diè, che fra Matematici dell' Accademia, quale si è cercata di rendere intutto utile al Pubblico, i Geometri, e gli Algebristi formano una classe, come gli Astronomi, & i Meccanici un'altra.

Egli è pur vero, che le Meditazioni di Geometria pura, o di Algebra non s'impieghino tutte in cose utili; & è ancor vero, che la maggior parte di esse conducano, e servano a quelle, che al cennato utile s'indirizzano. Così, che in una Parabola la sottangente sia doppia dell'Ascissa, che li corrisponde, è una cognizione molto sterile di per se; ella però è un grado necessario, per giugnere all'Arte di lanciar le Bombe con quella aggiustata misura, con la quale oggi si tirano; farebbe molto, che tanti evidenti usi si tenessero dalle Matematiche; quante pro-

b 4 po.

P R E F A Z I O N E.

posizioni , o verità vi sono : e' ci basti , che più verità insieme producano quasi che sempre un uso.

In oltre certe Geometriche speculazioni , che prima per niun utile parean fatte, in appresso si son rinvenute, profittevoli . Quando i famosi Geometri del xvii. secolo studiarono sopra di una Curva , che dissero Cicloide , no 'l fecero , che per pura speculazione , alla quale si affannarono , per la sola vanità di scoprire a gara Teoremi difficili: Essi stessi non pretendevano di travagliare per lo ben pubblico; frattanto, in profondandosi nella natura della Cicloide , scovriron esser ella destinata , per dare a Pendoli tutta la possibil perfezione, da misurare fino all'ultima esattezza i tempi.

La Fisica v'è di pari colla Geometria . La Notomia degli Anima-

li

P R E F A Z I O N E.

li, nè punto, nè poco dovrebbe premerci, importando la sola notizia de' corpi umani: Ma tal parte nell'uman corpo sì delicata, o così nella struttura confusa, che non possa dividersi, ella è chiara, e sensibile ne' corpi di altro tal Animale: Quindi è, che li Mostri stessi non densi trascurare: la Mecanica nascosta in una certa spezie, o in una comune struttura, si sviluppa in un'altra spezie, o in una straordinaria fabbrica: Et oso dire, che la natura, in moltiplicando, e variando le sue opere, non rimane talvolta di tradire il proprio segreto.

Gli Antichi conobbero la Calamita, ma di questa non altra virtù, che quella di tirare il ferro; &, o che poco curassero una inutile curiosità, o che niuna vaghezza avessero delle sperienze; non cercarono a disami-
nar

P R E F A Z I O N E.

inare con istudio tal pietra: Una sola altra speranza l'avrebbe istruiti, che ella si giri di per se verso i Poli del Mondo, & avrebbe fra le loro mani posto l'impareggiabil tesoro della Bussola: Erano essi vicini a scoprimento così importante, e pure se lo lasciaron cader di mano; E se poco più di tempo avessero impiegato sopra di un apparente inutile curiosità, l'utile nascosto sarebbesi loro appalesato.

Facciam tutto giorno un ammassamento di verità Matematiche, e Fisiche alla ventura di ciò, che ne avverrà, non essendo questo un arrischiare molto. Saran fermamente piantate in un Podere, donde un gran numero se n'è raccolto, riconosciuto utile: Possiam con ragione presumere, che da questo stesso fondo ne ritrarremo molte brillanti fin dal

P R E F A Z I O N E .

dal nascere loro istesso , e costantemente profittevoli ; & altre , che attenderanno un qualche tempo , in cui sottil meditazione , o felice caso scoprirà l' uso di esse : Ve ne saran molte , che separatamente prese, faranno sterili , nè lasciaràn di esserle, se non si uniranno insieme ; & in fine alla peggio ve ne faranno altre eternamente inutili .

Dico inutili , riguardo all' uso sensibile , e per così dire grossolano ; poicche in fatti elle nol saran mai tali . Un oggetto , a cui unicamente si drizzi la vista è più chiaro , e lucido , quando gli altri vicini , a quali frattanto non si bada , sono illuminati ugualmente , come egli è , profittando del lume , che per riflessione li compartiscono ; così la verità sensibilmente utili , e che si meritano la principal nostra attenzione ,
so-

P R E F A Z I O N E.

sono in alcun modo da quelle illustrate , che si riguardano come inutili , sicche tutte una per l'altra vieppiù si rischiarano .

Sempre il pensar dritto è giovevole , ancorche sopra cose di poco momento , quando che i numeri , e le linee non conferissero ad altro ; almeno per le sole conoscenze certe concesse a nostri lumi naturali gioveranno , e con maggior sicurezza serviranno ad indurre nella nostra ragione abiti primi , e prime forme del vero : N' istruiranno a travagliare sù le verità , & a prenderne le tracce sottilissime , e sovente impercettibili , a seguirarle il più lungi , che si possa , e renderanno infine il vero così familiare ; che noi a prima veduta , e quasi per istinto potremo in altra occasione ravvissare .

Lo.

P R E F A Z I O N E.

Lo spirito Geometrico non è egli così stretto alla Geometria, che non ne possa esser disciolto, e trasportato sopra altre cognizioni: Un' Opera di Morale, di Politica, e di Critica, e forse ancor di Eloquenza, farà a proporzione più bella, se da mano geometra verrà composta: L'ordine, la purità, la diligenza, l'esattezza, che da certo tempo ne buoni libri regnano, potrebbero da questo spirito geometrico riconoscere le prime origini, quale oggi più che mai diffondesi, e fa comune di mano in mano con quelli ancora, che non fanno la Geometria. Talvolta un Uomo grande regola tutto 'l suo secolo: E la gloria di aver stabilito la novella arte di ragionare ad altri non potrebbe più legittimamente risponderfi, quanto che ad un chiaro Geometra.

In

P R E F A Z I O N E.

In fine tutto quel che c'innalza a riflessioni , le quali , abbenche speculative , son pur grandi , e nobili , reca a noi un utile , che può dirsi spirituale , e filosofico . Ha la mente i suo' bisogni , e forse così grandi , come quelli del corpo : Vuol ella sapere , e tutto ciò , che puol esser conosciuto , è a lei necessario ; nè vi è cosa che meglio divisi , come ella sia nata per la verità ; nè più gloriosa a lei , quanto il piacer , che sente talvolta con pena , nelle più sterili , e più spinose ricerche dell'Algebra.

Ma senza appartarci dalle idee comuni , e senza ricorrere a quegli utili , che sembrar possono affinati troppo , e sottili , può ben convenirsi , che le Matematiche , e la Fisica abbian luoghi , che sono pur curiosi , comuni in questa parte con le cognizioni generalmente riconosciute

te

P R E F A Z I O N E.

te per utili , quali appunto ha l'Istoria .

Le Storie in tutto il loro corso non ne forniscono sempre di esempj virtuosi , e di regole per nostra guida . Fuor di questi , ella è un Teatro di perpetui cambiamenti negli affari degli Uomini , di origini , e cadenze d'Imperj , di costume , di usanze , di opinioni , che senza rifinar mai , succedonsi , & infine di tutto questo rapido , benchè insensibil moto , che intiero seco porta , e cambia l' aspetto della Terra .

Se vogliam contraporre curiosità a curiosità , ritroveremo , che in luogo di questo movimento , che agita le nazioni , e fa nascere , e rovina i Regni , la Fisica considera il grande universal moto , che ha posto in ordinanza la natura ,
che

P R E F A Z I O N E.

che ha librato i Corpi Celesti in differenti sfere, che accende, & ammazza le stelle, e che in tenendo pur le stesse sue invariabili leggi, diversifica in infinito i suoi effetti. Se tanto piacer si ave, in considerando le maravigliose differenze de' costumi, e delle opinioni de' Popoli; con non minore infinito diletto si studiano le varietà della fabrica di differenti spezie di animali, in riguardo alle loro varie funzioni, agli Elementi, in cui vivono, a Climi, ne' quali abitano, & agli Alimenti, di cui si nutrigano. I fatti della Storia più curiosi non potran giugnere in questa parte a fosfori, & a' liquori freddi, che mescolandosi producono la fiamma, nè agli alberi di argento, a' giuochi quasiche magici della calamita, & ad un infinito

nu-

P R E F A Z I O N E.

un infinito numero di segreti, che l'Arte ha ritrovati, in osservando da vicino, e spiando la natura.

In una parola, la Fisica, per quanto può dirriga, e siegue le tracce della infinita Intelligenza, e Sapienza, che ha prodotto il tutto; quando che la Storia ha per oggetti gl' irregolari affetti delle passioni, & un ordine di eventi bizarri, per quali dirigere fù prima immaginata una Divinità cieca, & insensata.

Non son parimente da ripornerfi fra le semplici curiosità della Fisica le sublimi riflessioni, per mezzo delle quali ne conduce ella allo Autor dell' Universo. Questa gran Opera vie più sempre maravigliosa, quanto più è conosciuta, ne risveglia un' idea sì grande del di lei Artefice, che sentiam vincere

Istor.

e

op.

P R E F A Z I O N E.

oppressa la mente da ammirazione, e da rispetto. L'Astronomia, e la Notomia sopra di ogni altra, sono due Scienze, che n'appalesano al vivo due Caratteri del Creatore; l'immenfità sua, uno, per la distanza, numero, e grandezza de' Corpi Celesti; l'altro, l'intelligenza infinita per la Mecanica degli Animali: sicche la vera Fisica s'innalza sino a divenire una spezie di Teologia.

Sono presso che infinite le differenti mire della mente umana, & invero tal n'è la di lei natura; e perciò ne fa sempre sperare scoprimenti, o nelle Matematiche, o nella Fisica, che faranno di una novella spezie di utile, e di curiosità.

Radunati tutti i differenti usi, che si son fatti della Matemarica fino a cento Anni indietro, niuno di

P R E F A Z I O N E!

di essi potrà mettersi in confronto con i Cannocchiali, che ci andati dopo di tal tempo, nuovo organo della vista, che niuno avrebbe ardito a sperare da man dell' Arte. Qual sarebbe stato lo stupore degli Antichi, se loro si fosse predetto, che i Posterì un giorno per mezzo di alcuni strumenti vedrebbero infiniti oggetti ad essi invisibili, un Cielo incognito, piante, & Animali, de' quali nè pur sognerebbero la possibilità? Avevano i Fisici un gran numero di sperienze curiosè; e pur ecco in men di un mezzo Secolo, in qua la machina del voto, che ne ha prodotta una infinità di natura tutto nuova: Ella, in mostrandoci i corpi in luogo voto di aere, ce li presenta, come trasportati in un differente Mondo dal nostro, ove provan essi delle alterazioni, di cui noi

P R E F A Z I O N E.

niuna idea abbiamo . Puol' avvenire , che l'Eccellenza de' metodi geometrici , quali s' inventano , o di giorno in giorno si riducono a perfezione , dimostreran in fine i termini della Geometria , cioè a dire, di quell' arte , che ha per suo studio di fare scoprimenti in Geometria ; Ma la Fisica , che contempla un oggetto di una varia sterminata fecondità , sempre ritroverà osservazioni da fare , & occasioni da arricchirne, & avrà il vantaggio di non mai essere una Scienza compiuta.

Le infinite cose , che pur rimangono , e delle quali rimarranno evidentemente a sapersi molte , scoraggiano affettatamente que' , che non vogliono entrare tra le spine della Fisica : E spesso per disprezzare le scienze naturali , diviensì ammirator della natura , qual si vuole
in-

P R E F A Z I O N E.

incomprensibile; e pure la natura non è mai sì ammirabile, nè sì ammirata, che quando ella è conosciuta: E' vero, che quel si sa, a paragone di qualche non si sa, sia ben picciola cosa, e tal volta quello istesso, che non si sa affatto, è propriamente quello, che sembra, che dovrebbe più che altro saperfi. Per cagion di esempio, non si sa, almeno con certezza, perche una pietra gittata all' aere ricada; Ma fermamente e' si sa la cagione dell' Arcobaleno, perche non oltrepassa mai una certa altura, perche la larghezza sempre è l'istessa, e perche allora che in una fiata vi sono due Arcobaleni, i colori dell' uno son riverfi, riguardo a colori dell' altro &c.; E frattanto il cadimento di una pietra nell' aere non sembra egli un Fenomeno più sempli-

P R E F A Z I O N E.

ce , che l' Arcobaleno ? Ma in fine quantunque non sappiaſi tutto , non s'ignora però tutto ; e ſebbene qualche ſembra più ſemplice non ſi ſappia , qualche è più compoſto però non riman da ſaperſi ; e ſe dobbiam temere di non eſſer luſingati dalla noſtra vanità di poter giugnere a conoſcimenti , che non ſon per noi ; corriam riſchio ancora , che noſtra inſingardagine ne faccia un qualche giorno credere di eſſere in una ignoranza maggiore di quella , in cui in fatti non ſiamo .

Può farſi conto , che le Scienze fianò nel loro naſcere , o perche preſſo gli antichi non potean queſte eſſere ancora , che molto imperfette , o che noi ne abbiām quaſi che intieramente perduti i veſtigj , durantino le lunghe tenebre della barbarie ; o ſia , perche noi non ci ſiam

ri-

P R E F A Z I O N E.

rimessi in buona strada , che da un secolo in dietro . Se storialmente si disaminasse il cammino , che an esse fatte in così breve tempo , malgrado i falsi pregiudizj , che an dovuto combattere da per tutto , e che lungamente l'an resistiti , malgrado ancora gli ostacoli stranieri dell' Autorità, e della potenza, malgrado la poca voglia, che si è avuta per cognizioni dal comun uso lontane , malgrado il picciol numero di persone , che si sono addate a tal impresa , e malgrado la debolezza de' motivi, che l'anno indotti ; stupido rimarrebbe alla grandezza , e velocità de' progressi delle Scienze , in veggendo tutte altre nuove uscir dal nulla ; e forse lascierebbe troppo oltre correr la speranza per lo avvenire .

Quanto più felici ne promet-

P R E F A Z I O N E.

tiamo queste cose , tanto più dobbiamo riguardare ora le Scienze come se fossero nella culla , per lo meno la Fisica : Perciò l'Accademia ad altro non attende , che a fare un ampio provvedimento di osservazioni , e di fatti ben avverati , quali un giorno potran essere il fondamento d'un sistema : Poicche e' bisogno , che la Fisica Sistemática s'impieghi ad ergere edifizj , e che la sperimentale sia in istato di somministrarli i necessarj materiali .

Per un tale ammassamento altri non vi è , che possa riuscirvi a farlo , & apparecchiarlo , quanto che le Adunanze , e queste protette dal Principe ; non lumi , non diligenze , non vita , nè averi de' Particolari vi basterebbero: Evvi bisogno d'un gran numero di sperienze , e queste molte di svariate spezie ; bi-
so,

P R E F A Z I O N E .

sogna ripetere le stesse , variarle in mille maniere , e con egual vigore di animo tenerle dietro . La cagione d'un picciolo effetto è quasi sempre involuppata in tante pieghe , e ripieghe , che se con una estrema diligenza non siano distrigate tutte , non credasi , che verrà in chiaro mai :

Oggi l'Accademia per picciole parti disamina la natura : Non forma sistema generale per timor di non cadere nel disordine de' sistemi precipiti ., a' quali troppo ben si acconcia la poca sofferenza delle menti umane : E pur questi stabiliti una volta , si oppongono alle verità , che indi vengono a conoscersi . Oggi si rende certa di un fatto , di mani di un altro tutto dal primo diverso , nè si rimane di ar-

P R E F A Z I O N E.

rifchiar conghietture sù le cagioni, ma queste non sono altro , che conghietture . Così la Raccolta , che l'Accademia presenta al Pubblico , è composta di pezzi staccati , e dispajati , il particolar Autor de' quali è mallevadore de' fatti , e delle Sperienze ; e l'Accademia non approva i loro raziocinj, se non se con tutto il rigore d'un prudente Pirronismo .


Verrà forse tempo , che in un corpo più regolato si uniranno queste sparse membra : E se son tali , quali si desiderano , elleno da per se uniransi in qualche maniera . Molte disgiunte verità , delle quali ve ne ha quantità , al vivo porgono alla mente le loro connessioni , e scambievoli dipendenze ; Sicche sembra , che dopo di
es-

P R E F A Z I O N E.

essere state per violenza divise una
dall' altra, naturalmente poi proc-
curino di riunirsi.



TA



TAVOLA

P E R

L'ISTORIA.

R *Egolamento ordinato dal Re per l'Accademia
Reale delle Scienze.* pag. 1.

FISICA GENERALE.

<i>Sopra il lume, e colori.</i>	18
<i>Comparazione delle Osservazioni in vari luoghi fatte sù 'l Barometro, sù de' venti, e della quantità del- le acque piovane.</i>	22
<i>Osservazioni intorno alle Isterie naturali, che sono singolari in Francia.</i>	25

FISICA PARTICOLARE.

N O T O M I A.

<i>Della Circolazione del sangue nel Feto</i>	29
<i>Sopra di una nuova maniera di tagliar la Pietra.</i>	33
<i>Sopra l'istoria del Feto.</i>	35
<i>Sopra 'l Cuore della Testuggine.</i>	38
<i>Sopra la straordinaria struttura del Cuore d'un Feto Umano.</i>	42
<i>Sopra le Iniezioni Nephriche.</i>	44
	Sù

T A V O L A.

<i>Sù gl' Insetti .</i>	45
<i>Sopra a' Denti .</i>	47
<i>Sopra le Piume degli Uccelli .</i>	49
<i>Sopra la Rabbia , o Idrofobia .</i>	52
<i>Sù lo Scorbuto .</i>	58
<i>Diverse Osservazioni Notomiche .</i>	ivi

C H I M I C A.

<i>Misura de' Sali volatili acidi contenuti ne' spiriti acidi .</i>	61
<i>Sopra la maniera di conoscere il Solimato corrosivo sostitico .</i>	62
<i>Esame delle acque minerali .</i>	64
<i>Diverse Osservazioni Chimiche .</i>	67

B O T A N I C A.

<i>Sopra il Parallelismo del cesso degli Arbori , col suolo , che adombrano .</i>	70
<i>Sù 'l Sal delle Piante .</i>	72
<i>Osservazion Botanica .</i>	76

M A T E M A T I C A.

ALGEBRA , E GEOMETRIA.

<i>Quadratura d'una infinità di segmenti , e di settori della Cicloide .</i>	77
<i>Metodo per ritrovar Curve , lungo le quali cadendo un</i>	un

T A V O L A.

<i>un corpo si avvicini, o discosti dall'orizzonte in</i>	7
<i>quella ragion de' tempi, che si vorrà.</i>	8
<i>Sù l'equazioni del secondo, e del terzo grado.</i>	84
<i>Sù la duplicazione del cubo.</i>	84

A S T R O N O M I A.

<i>Sù 'l ritorno delle Comete.</i>	85
<i>Osservazioni dell' Eclissi.</i>	89
<i>Osservazione di Giove.</i>	92
<i>Osservazioni di una Stella sìel'orbita della Luna.</i>	93
<i>Sù la Parallasse annuale della Stella Polare.</i>	95
<i>Sopra i Paresi.</i>	97

G E O G R A F I A.

<i>Posizioni di alcune Città della China.</i>	99
<i>Posizioni di alcune Città di Turchia, e di Armenia.</i>	102

O T T I C A.

<i>Sù la moltiplicazione delle Immagini per-i vetri piani.</i>	103
--	-----

D I O T T I C A.

<i>Effetti de' vetri ardenti del diametro di tre, o quattro piedi.</i>	107
ME.	

TAVOLA.

M E C A N I C A.

<i>Per la fabrica de' Vascelli.</i>	112
<i>Disamina della forza dell' Uomo per portare , e per tirare .</i>	115
<i>Sù le Clessidre.</i>	118
<i>Modo di servirsi del fuoco per muovere le Machine .</i>	120
<i>Sù 'l fregamento della Machine.</i>	124
<i>Sù l' intirizzamento delle Corde , che s' impiegano nelle Machine.</i>	131
<i>Sopra la Vite.</i>	133
<i>Sù di una livella.</i>	135
<i>Sù di alcune Machine impiegate nella nuova navigazione della Senna.</i>	137
<i>Sù di una Machina fatta , per misurare la proporzione della caduta de' corpi.</i>	139
<i>Sù la descrizione delle Arti.</i>	141
<i>Machino , o Invenzioni approvate dall' Accademia nell' Anno 1699.</i>	145

<i>Elogio del Signor Bourdelin.</i>	146
-------------------------------------	-----

I S T O R I A D E L L' ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE,

DOPO L' ORDINAMENTO DATOLI NEL
M. DC. XCIX.



L' Accademia Reale delle Scienze stabilita nel 1666. avea così ben corrisposto con suo lavorj, e sue scoperte alla intenzione del Re; che molti anni dopo del di lei stabilimento S. M. volle ben onorarla con una tutta nuova attenzione, facendola rinascere più nobile, e, per così dire, più forte di qualche prima si era.

Questa, per vero dire, era stata formata per ordine del Re, ma senza alcun atto, che dall' autorità Reale venisse. L' amor delle Scienze solo ne dettava le leggi. Ma tutto felice, che ne fosse stato il riuscimento, egli è certo, che per rendere questa Società durevole, & utile insieme quanto maggior potesse farli, vi abbisognavano Regole più precise, e più severe.

Così giudicò il Re allora, che dopo l'ultima guerra cotanto alla M. S. gloriosa, rivolse egli particolar occhio in dentro al suo Regno, per diffondervi con sue proprie mani, a misura de' lumi del suo sapere, le frutta della pace.

A

L'Ac-

Storia dell' Accademia Reale

L' Accademia Reale delle Scienze non li parve oggetto men degno de' suo' sguardi . Le continue sue grazie ne' maggiori bisogni dello Stato non avean fatti sentire alle Scienze i turbamenti , che agitavano l' Europa : Credè frattanto , poicche egli potea di vantaggio , di non aver fatto molto , e pensò nella calma di accrescere , e render più forte quella , che non avea sentito danno in una così crudel tempesta .

Diè l'incarico al Signor di *Pontchartrain* allora Ministro , e Segretario di Stato , indi Cancelliere di Francia , di dare un tal ordine all' Accademia delle Scienze , da quindi ritrarne tutto quell'utile maggiore , che poteasi da lei ripromettere .

Il Signor di *Pontchartrain*, come Segretario di Stato , avendo la Soprantendenza della Casa Reale, era ancora incaricato della cura dell' Accademia, avea da qualche anno fatto Capo di questa Società il Signor Abbate *Bignon* di lui Nipote , e con ciò avea conferito alle Scienze una delle maggiori grazie , che mai da Ministro sianfi tenute .

Il Signor Abbate *Bignon* , che per lunga presidenza all' Accademia , a perfezion conosceva lo Stato di essa , e molto da se avea pensato a' mezzi da poterla ingrandire , e renderla più riguardevole , comunicò suoi disegni al Signor di *Pontchartrain* , che di sua parte volle aggiugnervi que' stessi lumi , che con tanto profitto impiega ne' più gravi affari dello Stato .

Quindi si formò una Società , quasiche tutta nuova , simile in qualche maniera a quelle Repubbliche fondate da Savj , i quali in dettando loro le leggi , si prefero una piena libertà d'immaginarle , e di non tener dietro , che a' voti della loro ragione .

La nuova ordinanza per l'Accademia drizzata
al

dal Signor di Pontchartrain fu approvata dal Re.
L'affare era stato con molta segretezza guidato; e
fu ella una piacevole sorpresa per l'Adunanza, al-
lorche a 4. di febbrajo 1699. il Signor Abbate di
Bignon fe leggere le seguenti;

R E G O L E

. ORDINATE DAL RE

PER L' ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE.

Volendo il Re continuare a dar segni di quell'
amore, ch'è ha per l'Accademia delle Scienze, a
determinate le presenti regole, quali vuole, & in-
tende, che siano osservate con esattezza.

I.

L'Accademia Reale delle Scienze sarà sempre
sotto la protezione del Re, e riceverà i di lui ordini
per mano del Segretario di Stato, a chi si compia-
cerà la M. S. di darne la cura.

II.

Detta Accademia verrà sempre composta da
quattro sorti di Accademici, Onorari, Pensionari,
Associati, & Allievi: Il primo ordine sarà di dieci
persone, i tre altri, ciascheduno di venti; e niuno
sarà ammesso in alcuno di essi, senza scelta, o gra-
zia di S. M.

III.

Gli Onorari saran tutti del Regno commando-
vati per la perizia nelle Matematiche, o nella Fisica,

A 2

uno

4 *Istoria dell' Accademia Reale*
uno de' quali sarà Presidente, e niuno di essi potrà
essere Pensionario.

IV.

I Pensionari faran tutti lor permanenza in Parigi, tre Geometri, tre Astronomi, tre Meccanici, tre Notomisti, tre Chimici, tre Botanici, un Segretario, & un Tesoriero: E allorchè avverrà, che alcun di essi sarà promosso a qualche carica, o commissione, che richiegga lo star fuor di Parigi, verrà il di lui luogo occupato da altri, come se per morte e' fusse voto.

V.

Gli Associati saran di ugual numero, dodici de' quali non potran essere, che del Regno, due applicati alla Geometria, due all' Astronomia, due alla Meccaniche, due alla Notomia, due alla Chimica, e due alla Botanica: I rimanenti otto potran essere Forastieri, quali a lor talento, e piacere potran applicarsi a detta diverse scienze.

VI.

Gli Allievi si tratteranno in Parigi tutti, ciascun de' quali applicherassi a quel genere di Scienze, che professerà l' Accademico Pensionario, cui sarà egli addetto: E se terranno impieghi, quali richiedono lor residenza fuor di Parigi, sarà occupato il loro posto, come se vacasse per morte.

VI.

Per riempire i posti degli Onorari, l' Assen-
blea eliggerà con pluralità di voti un soggetto, che
ella presenterà al Re, per attenerne il suo con-
cetto.

VIII.

Per riempir quelli de' Pensionari, l' Accademia
n' eliggerà tre, de' quali due per lo meno, saranno
Associati, & uno Allievo, quali saran presentati a

S. M.

Delle Scienze .

S. M. , affinché le piaccia di sceglierne uno .

IX.

Per riempire i posti degli Associati , l' Accademia eligerà due soggetti , uno de' quali per lo meno debba esser preso dal numero degli Allievi , e saran proposti a S. M. , perche le piaccia di far la Scltta di uno .

X.

Per riempir quelli degli Allievi , ciascuno de' Pensionari potrà scegliersene uno , che presenterà alla Compagnia a deliberazione di essa , che se sarà aggregato a pluralità de' voti, verrà proposto alla M. S.

XI.

Non sarà proposto a S. M. alcuno , che debba riempir i posti degli Accademici , se egli non sia di buoni costumi , e di conosciuta probità ornato .

XII.

Non saran proposti nè pure i Regolari ligati a qualche Religione , se non se per occupar luogo fra gli Accademici Quorari .

XIII.

Non potrà esser proposto a S. M. per Accademico, Pensionario , o Associato , verun , che non siasi prima fatto conoscere , per qualche considerabil Opera impressa , per qualche corso Illustre , per alcuna Machina di sua invenzione , o per qualche particolare scoprimento .

XIV.

Per Pensionario , o Associato non sarà proposta Persona , che non abbia almeno l' età di venticinquae anni .

XV.

Come non sarà proposto ancora per Allievo Giovane , che per lo meno non sia di venti anni .

Le Ordinarie Adunanze dell' Accademia si terranno nella Libreria del Re, nel Mercoledì, e nel Sabato di ogni Settimana. E se in detto giorno caderà festa alcuna, l' Assemblea farassi nel giorno avanti.

XVII.

Dureranno dette Assemblee per lo meno due ore, cioè dalle tre sino alle cinque.

XVIII.

Le vacanze dell' Accademia cominceranno dalli 8. di Settembre, e finiranno alli 11. di Novembre, come ancora vi sarà vacanza nella Pasca per quindici giorni, per la settimana di Pentecoste, e nel Natale sino a' Re.

XIX.

Saranno gli Accademici assidui in tutti i giorni dell' Assemblea, e niuno de' Pensionarj potrà appartarsi per suoi propri bisogni più dello spazio di due mesi, fuorchè nel tempo delle vacanze, senza espressa licenza di S. M.

XX.

Essendosi per esperienza conosciute le molte inconvenienze, che avvenir sogliono, in travagliando sopra di un' opera tutta l' Accademia in comune. Ogni un degli Accademici piuttosto si sceglierà un particolar oggetto de' suo' studi, & in rendendone conto all' Assemblea, procurerà di arricchire de' suo' lumi que', che compongono l' Accademia, e profittare dagli avvertimenti di questi.

XXI.

Nel principio di ciascun anno, ogni Accademico Pensionario sarà obbligato dichiarare in iscritto alla Compagnia l'Opera principale, che vorrà imprendere; così gli altri Accademici saranno invitati a far

a far simile dichiarazione de' loro disegni.

XXII.

Abbenche ogni Accademico sia obbligato di applicarsi principalmente a ciò che si appartiene alla Scienza particolare, cui egli si è dato; nulla di meno saranno esortati a ricercar più oltre tutto quel che può essere di maggior profitto, e più curioso nelle diverse parti delle Matematiche, e le differenti guide delle arti, e tutto ciò, che riguarda alcun punto dell' Istoria naturale, o si attenga in qualche modo alla Fisica.

XXIII.

In ogni Adunanza due Accademici Pensionari almeno in giro saran obbligati di recare qualche osservazione su la loro Scienza; gli Associati ancora avran la libertà di proporre sempre le loro osservazioni: E ciascun di quelli, che intervengono, così Onorari, che Pensionari, o Associati, potranno, secondo l'ordine della loro Scienza, far loro osservazioni sopra di quel che sarà proposto: Ma gli Allievi non parleranno se non quando il Presidente l'inviterà.

XXIV.

Tutte le osservazioni, che gli Accademici receranno all'Assemblea, nello stesso giorno si daranno in iscritto in mano del Segretario, per conservarle al bisogno.

XXV.

Tutte le sperienze, che saranno da qualche Accademico riferite, egli stesso rifarrà, se sia possibile, nell'Assemblea, o almeno privatamente con l'assistenza di qualche Accademico.

XXVI.

L'Accademia con esatta vigilanza cercherà, se mai alcuni de' Soci sieno di opinioni diverse, che non usino vicendevolmente ne' loro discorsi, o nelle

scritture, termini duri, o di alcun disprezzo; E quando oppugneranno i sentimenti di qual si fusse savio, l'Accademia lo esorterà a parlar con riguardo,

XXVII.

Avrà l'Accademia cura di tener commercio con diversi Savj, o di Parigi, o delle Provincie del Regno; o di Paesi forastieri, perche sia facilmente informata di qualche vi sarà di curioso per le Matematiche, o per la Fisica: E nella elezione degli Accademici farà preferiti più que' Savj, che avran mostrata maggior esattezza in questa specie di commercio.

XXVIII.

L'Accademia incaricherà alcuno degli Accademici a leggere le opere importanti di Fisica, o di Matematica, che verran fuori, o in Francia, o altrove. Quello, che avrà tal incarico, ne farà i rapporti alla Compagnia senza critica, ma solamente avvertendo, se contengan cose da poterne ricavar profitto.

XXIX.

L'Accademia risarrà le sperienze più considerabili, fatte altrove, e noterà ne' Registri la conformità, o differenze tra queste, e quelle disaminate.

XXX.

L'Accademia esaminerà le Opere, che li Soci proporranno, per fare imprimere: Ella non le approverà, che dopo che saranno intieramente lette nell'Assemblea, o per lo meno dopo della disamina, e rapporto, che ne farà quello della Compagnia, cui sarà commessa tal faccenda. E niuno degli Accademici potrà mettere nell'opera, che farà imprimere, il titolo di Accademico, se l'Accademia non la avrà approvate.

XXXI.

Delle Scienze.

9

XXXI.

L'Accademia ancora disaminerà tutte le Macchine, venendo ordinato dal Re, per le quali venga S. M. supplicata per li Privilegj. Ella certificherà se sian nuove, & utili: E gl' Inventori saran tenuti a rimanerne un Modello di quelle, che saranno approvate.

XXXII.

Gli Accademici Onorari, e Pensionari, & Associati avranno voti deliberativi su gli affari di Scienze.

XXXIII.

I Soli Accademici Onorari, e Pensionari avranno voti deliberativi, quando si tratterà di elezioni, o di faccende spettantino all' Accademia, e dette deliberazioni si avranno per isquittinio.

XXXIV.

Que', che non saranno dell' Accademia, non potranno assistere, nè essere ammessi nelle Assemblee ordinarie, se non quando vi saran menati dal Segretario, per proponervi qualche scoperta, o Macchina novella.

XXXV.

Ogni ordine di persone entrerà nelle Assemblee pubbliche, che si terranno due volte per ciascu anno, una nel primo giorno dopo S. Martino, e l' altra nel primo giorno dopo Pasca.

XXXVI.

Il Presidente sederà in cima di tavola cogli Onorari, i Pensionari a lato di essa, e gli Associati a piè di essa: Gli Allievi si assideranno dietro di quelli Accademici, de' quali saranno Allievi.

XXXVII.

Il Presidente sarà attentissimo alla esatta osservanza del buon ordine in ogni Assemblea, & in tutto ciò,

to *Istoria dell' Accademia Reale*

edò, che si attiene all' *Accademia*: Ne renderà conto minuto a S. M., ovvero al Segretario di Stato, cui avrà il Re data la cura di detta *Accademia*.

XXXVIII.

In tutte le *Assemblee*, il *Presidente* farà dilibere sopra le differenti materie, prenderà il parere di coloro, che an voti nella *Compagnia* secondo i loro posti, e pronunzierà la risoluzione con la pluralità de' voti.

XXXIX.

Il *Presidente* sarà nominato da S. M. nel primo di Gennajo di ciascun anno, ma quantunque in ogni anno porti il bisogno di farsi tal nomina; potrà però essere egli continuato tanto, quanto che piacerà a S. M. E perchè, o per malattia, o per suoi gravi affari potrebbe avvenire, che mancasse egli in qualche *Assemblea*; nominerà S. M. nello stesso tempo altro *Accademico*, che terrà le veci di detto *Presidente*.

XL.

Il *Segretario* raccoglierà con esattezza tutto ciò, che sarà stato proposto, trattato, disaminato, e risoluto in sostanza nella *Compagnia*: Scriverà ne' suoi registri, secondo i giorni dell' *Assemblea* tutto, con inferirvi i Trattati in essa letti: Sotscriverà tutte le scritture, che saran date, o a que' della *Compagnia*, o ad altri, cui premerà di averli, e nel fin di Dicembre di ogni anno darà egli al pubblico un estratto de' suoi registri, ovvero un' *Istoria* di ciò che sarà fatto di più riguardevole nell' *Accademia*.

XLI.

I registri, scritture, e carte spettantino all' *Accademia*, saran sempre presso del *Segretario*, a chi tosto si consegneranno con un nuovo inventario, che 'l *Presidente* farà formare; e nel Mese di Dicembre di ogni

Delle Scienze.

11

ogni anno detto Inventario sarà dal Presidente riscontrato, & accresciuto di qualche sì rinverrà di giunta in tutto l' Anno fattavi.

XLII.

Il Segretario sarà perpetuo, e quando che, o per malattia, o per altra considerabil ragione non potrà venir nell' *Assemblea*; egli darà la commissione ad alcun degli *Accademici*, che più al proposito sia, per tenere in di lui vece il registro.

XLIII.

Il Tesoriere terrà in guardia tutti i libri, Mobili, Istrumenti, Machine, o altre curiosità appartenenti all' *Accademia*. Quando entrerà nella carica, il Presidente glie li consegnerà per Inventario, e nel mese di Dicembre di ciascun anno detto Presidente riscontrerà il cennato Inventario, per accrescerlo di qualche vi sarà aggiunto per tutto l' anno.

XLIV.

Quando i Savi cercheran di vedere alcuna delle cose guardate dal Tesoriere; egli avrà cura di mostrarglielo; ma non permetterà, che sian trasportate fuori delle sale, dove saran custodite, senza un ordine in iscritto dell' *Accademia*.

XLV.

Il Tesoriere sarà perpetuo; e quando per legittimo impedimento non potrà compire a' doveri della sua carica, nominerà qualche *Accademico*, che li soddisfaccia.

XLVI.

Per agevolare le impressioni di diverse Opere, che potran componere gli *Accademici*, S. M. per mese all' *Accademia*, che scelga un Librajo, al quale dopo tale Scelta il Re farà spedire i necessari Privilegi, per imprimere; e distribuire le Opere degli *Accademici* approvate.

XLVII.

XLVII.

Per innanimare gli Accademici a continuar le loro fatiche, S. M. farà pagare continuamente le pensioni ordinarie loro assegnate, come ancora graziosi straordinari, secondo i meriti delle loro Opere.

XLVIII.

Per dare ajuto agli Accademici ne' loro Studi, e render facile i mezzi di ridurre a perfezione la loro Scienza, il Re soccorrerà alle spese necessarie, per le diverse esperienze, e ricerche da farsi.

XLIX.

Per rimunerare l' assiduità alle Assemblee degli Accademici, S. M. farà distribuire per ciascheduna Assemblea quaranta lire da segnare a tutti i Pensionari, che saranno presenti.

L.

Vuole S. M., che le presenti regole sian lette nella prossima Assemblea, & inserite ne' registri, per essere osservate con esattezza, secondo la loro forma, e tenore: E se avvenisse, che qualche Accademico controvienisse ad alcuna di esse, S. M. ordinerà la punizione a misura del fatto. Versaglies li 26. Genajo 1699. Ludovico, e più basso, Philipeaux.

Per queste norme l' Accademia delle Scienze diviene un corpo stabilito in forma dall' autorità Reale, che prima non lo era.

E' oggi un corpo più numeroso, che comprende sotto varj titoli, le più Illustri Persone nelle Scienze, o almeno le più abili a divenirvi.

Abbraccia non solamente i più celebri Saccenti delle Provincie di Francia; ma quelli di altri Paesi ancora.

Contiene dentro di se, donde continuamente ella si rifaccia: E quelli che possono divenire i primi

ci

cipali membri, che li addestreranno di buon ora a farvisi.

Nello stesso tempo non lascia di dar luogo al merito de' Forastieri.

Tiene ella delle corrispondenze in tutte parti, dove si coltivano le Scienze, & in tal guisa trae le prime notizie, & i primi frutti della maggior parte de' scoprimenti, che altrove si fanno.

Le differenti maniere di entrare in questo corpo son proporzionate alli differenti oggetti, che possono muovere il desiderio, per entrarvi, & a' diversi ordini di Accademici.

Gli Accademici si son più che mai fortemente addati alle fatiche, & all' assiduità.

L' Accademia viene ad essere più conosciuta dal Pubblico, e le materie, che tratta, non più tra se restringe, il gusto, il frutto, e lo spirito delle Scienze, possono farsi comuni piacevolmente.

Dopo che si lessero le cennate ordinanze nell' Assemblea, il Signor Abbate Bignon vi fe leggere ancora questa lettera del Signor di Pontchartrain.

S I G N O R I.

In adempimento delle regole, per l' Accademia Reale delle Scienze, ordinate dal Re a 26. Agosto, lo lessi a S. M. nota degli Accademici, che presentemente la compongono: cioè voi Signori. Onorari il Signor Marchese de l' Hopital, il P. Truchet, Signor Renau Capitan di Vascello, Signor di Mallezieu, il P. Mallebranche, il P. Gouye: Pensionari Geometri Signor Abbate Gallois, Signor Rolle, Signor Varignon: Astronomi Signor Cassini, Signor De la Hire, Signor la Feure: Meccanici Signor Filleau de Billettes, Signor Jaugeon, Signor Daleme: Notomisti Signor Du Hamel, Signor Du Verney, Signor Mery:
Chi-

Chimici Signor Bourdelin, Signor Homberg, Signor Baulduc: *Botanici* Signor Dodart, Signor Marchant, Signor Tournesot: *Segretario* Signor Fontenelle, Signor Couplet: *Tesoriere*: *Associati Forastieri* Signor Leibnitz, Signor Tschirnaus, Signor Guglielmini: *Geometri* Signor Maraldi, Signor Regis: *Astronomi* Signor Cassini figlio, Signor De la Hire figlio: *Mecanici* Signor Chazelle, Signor Lagni: *Noromisti* Signor Taury, Signor Bordellin Figlio: *Chimici* Signor di Langlade, Signor Lemery: *Botanici* Signor Morin di S. Victor, Signor Morin de Toulon: *Allievi sotto* Varignon, Signor Carrè: *sotto* Cassini, il Signor Montti: *sotto* il Signor Homberg, Signor Geogroffoy: *sotto* il Signor Couplet, il Signor Couplet figlio. S. M. dimostrò un particolar piacere per lo merito di ciascheduno, e per la particolar applicazione presa, e di nuovo, se mai così bisognasse, ave aggregati, e scelti tutti per quella carica, che tengono: E' qui bene frattanto d'avvertire, che per lo Signor Dodart Pensionario si è avuta una particolar considerazione, come che il di lui impiego di Medico della Signora Principessa di Conti Vidua l'obbligò a riseder fuori di Parigi, presso di detta Principessa; pur si lascia nel detto numero di Accademico, contro l'ordine registrato nello articolo IV. Il Re non per altro lo mantiene in tal posto, che riguarda avendo alla estrema di lui anzianità nell' Accademia: Qual esempio non vuole, che in appresso si adducbi per pruova. Mi ha di più comandato S. M. a dirvi, che sua intenzion sia, che innumantinenti si procada alla elezione de' Soggetti degni per que' luoghi, che rimangono ad esser occupati, & a compir il numero nelle regole diffinito. Io sono vostro umilissimo Affezionatissimo Servidore. Pontchartain. Varsaglies 28. Gennajo 1699.

Noi

Nominando il Re con questa lettera molti nuovi Accademici, nell'altra Assemblée videfi un'aggradevole confusione, fin allora non mai veduta; poicché gli antichi Accademici (fra' quali ve ne eran de' poco frequenti) non mancarono in quel giorno, & i nuovi, venuti a prendere i loro posti, facean numero maggiore di qualche una delle più picciole stanze della Libreria del Re, dove si ragunarono, poteva contenere. Finì tosto questo disordine, poicché il Signor Abbate *Bignon* a ciascuno segnò suo luogo fisso, dove alloggiò: Non è forse dal proposito lontano il riferir le minuzie su gli affari della Società, potendo divenire importanti: Si viderono Savj diversi, come un' Geometra, & un Notomista esser vicini, quali non trattando le stesse cose, la loro conversazione particolare era meno a temersi.

In detta Adunanza, che fù la prima della novella Accademia, si ebbe principal cura a dimostrare il dovuto riconoscimento al Signor di *Pontchartrain*. Concordemente fù determinato, che la Società in corpo col Signor Abbate *Bignon* Presidente, andasse a renderli umilissime grazie, per le Regole, che egli con tanta bontà avea ottenute dal Re, richiedendoli con istanza la protezione, che non mai la scontinuasce: Questo Ministro obbligò la Compagnia con la maniera, nella quale egli la raccolse a nuove gratitudini; E nel licenziarli l'onore, in accompagnandola fino alla sua Corte, donde non volle rientrar ne' suo' Appartamenti, fino a che ella intiera non fusse uscita fuori.

Qualche giorno dopo si risolvè ancora, che per mezzo de' Deputati l'Accademia rendesse le grazie al Signor Abbate *Bignon*, per quella parte, ch'egli avea tenuta su la nuova ordinanza, e confel-

feffassero ancora le infinite antiche obbligazioni ; che le sentiva : Fù scelto per proporre , e dirigge- re i Deputati un giorno, in cui per fortuna non era nell' Assen blea il Signor Abbate *Bignon* , e si stimò necessario sopra tutto avvertire , che si tenesse ciò inviolabilmente segreto , fin attanto , che fusse ese- guito .

Vi furono ancora de' convenevoli , che nello allogar si , secondo le prescritte norme divise , in quell' unica volta si passarono.

Indi si diè principio , secondo gli ordini delle regole a compire i possi voti degli Onorarj , Asso- ciati , & Allievi : I nuovi Onorarj proposti , & ap- provati dal Re , furono secondo i tempi della lor nomina , il Signor *Fagon* primo Medico di S.M. il Signor Abbate *Louis* , e 'l Signor di *Vauban* , gli Associati novelli , secondo lo stesso ordine , furono il Signor *Hartsoeker* , i Signori *Bernoulli* fratelli , il Signor *Newton* , il Signor *Viviani* Forastieri : I nuovi Allievi furono il Signor *Bourlet* Medico , sotto il Signor *Dodart* , il Signor *Berger* Baccelliere in Medicina , sotto il Signor *Tournefort* , il Signor *Boulduc* figlio , sotto il Signor *Boulduc* , il Signor *Tuillier* Baccelliere in Medicina , sotto il Signor *Bourdelin* , il Signor *Chevalier* , sotto il Signor Ab- bate *Galois* , il Signor *Litore* Dottore in Medicina , sotto il Signor *du Haniel* , il Signor *Poupart* , sotto il Signor *Mery* , il Signor *Simon de Valbebers* , sot- to il Segretario , il Signor *Parent* , sotto il Signor *de Billettes* , il Signor *Senne* , sotto il Signor *Jaugeon* , il Signor *Rencaume* Baccelliere in Medicina , sotto il Signor *Marchand* , il Signor *Amontons* , sotto il Signor *le Feure* , il Signor *du Torré* , sotto il Signor *Roll* , il Signor *Lientad* , sotto il Signor *de la Hire* , il Signor *du Verney* , sotto il Signor *du Verney* suo fra-



fratello, il Signor *Beauvilliers*, sotto il Signor *Dalesme*: il Signor *Sauveur*, che era da molti anni dell' Accademia, continuò ad esserlo in qualità di Veterano.

Si studiò in fine, per ritrovare un sugello, & una divisa per la Compagnia.

Il sugello fù un Sole, simbolo del Rè, e delle Scienze, fra tre Gigli, e la divisa, una Minerva circondata da strumenti di Scienze, e di arti, con questo motto latino: *Invenit, & perficit*.

Fra tutte queste Assemblee, nelle quali si dibatterono varj affari preliminari, la più riguardevole si fù, la dichiarazione de' Pensionarj in iscritto delle opere, sù delle quali travaglierebbero, e la determinazion del tempo per compirle: Sembrò ella una spezie di voto, che facevano a questa novella nascente Compagnia: La maggior parte degli Associati, & Allievi fecero le simili, quantunque non l' astringesse obbligo alcuno. Parte di essi ha di già soddisfatto al voto, e tenuta sua parola, essendo già fuori le opere designate.

Tutti gli Accademici presenti diedero nota di varie Persone, con le quali terrebbero corrispondenza sù gli affari delle Scienze, così delle Provincie, come Forestiere, & il Signor Segretario, per parte della Compagnia, scrisse a tutti i nominati corrispondenti, pregandoli a regolarmente tener questo commercio.

Per detti Preliminari, tutto che indispensabile, par che s'illanguidisse la Compagnia, impaziente di venire alle seriose fatiche, alle quali pur giunse, & oggidì sua Istoria altro non ha, che osservazioni fatte, e discorsi tenuti nell' Assemblea.

Rimane pure a dire altra cosa, che la gratitudine, e la gloria dell' Accademia richiedono, che
Istor. B ne-

neceffariamente fi noti nelle fue Iftorie , e quefta fi è la nuova grazia ricevuta dal Rè. col dono delle magnifiche , e fpaziofe ftanze nel Louvre in luogo della picciola , e ftretta Camera , che nella Libreria aveva ; Sicchè la prima Afemblea dopo Pafca , la quale , fecondo l' ordinanza data nel mefe di febbrajo , fù publica , ella fi tenne in quefto nuovo Appartamento .



F I S I C A .

F I S I C A G E N E R A L E

SOPRA IL LUME , E COLORI.

LA Filosofia ha fcoffo intieramente il giogo dell' autorità , ficche i più rinomati Filofofi non perfuadono altramente , che con le ragioni. Il Siftema del Signor *Descartes* * fopra del lume , tuttoche ingegnoso e' fia , pure viene dal P. *Mallebranche* abbandonato , e itabilito altro nuovo , su' l modello del fiftema del fuono formato : Quefta analogia ifteffa ha preffo di coloro , che fanno , come la natura fia uniforme ne' principj generali , un carattere di vero .

D' accordo fi tiene che'l fuono fi faccia per lo tremito , o vibrazioni delle parti infentibili del corpo fonoro : Le vibrazioni più grandi , o più picciole , cioè , che fcorrono più grandi , o più pic-
pic.

* *Ved. le Memmor. pag. 42.*

piccioli archi di un istesso cerchio, si fanno sensibilmente in tempi uguali, & il suono, che producono non può divariare, che nell'essere più forte, o più debile, più forte, se le vibrazioni sien più grandi, più debile, se le stesse sieno più picciole. Ma supposto, che in un medesimo tempo si produca maggior numero di vibrazioni in un corpo, che in un altro; Quelle, che in maggior numero fanfi, essendo più ristrette, e serrate, e per così dirle, più vive, divengono d'una differente spezie dall'altre; Et allora i suoni parimente differiscono di spezie, e son quelli appunto, che dicono Tuoni. Le vibrazioni più pronte formano l'acuto; e quelle, che sono più lente, il Tuono grave.

Quest'idea, da tutti i Filosofi ricevuta, facilmente s'adatta al lume, & a' colori. Tutte le minute parti d'un corpo luminoso sono in un rapido moto, che di momento in momento piugono, e con sollecitissime scosse comprimono tutta la materia sottile, che v'è sino agli occhi, e secondo il Mallebranche cagiona in essi vibrazioni con pressione: Allorache le vibrazioni sono più grandi, si vedono i corpi più luminosi, e più chiari; E secondo che sono più pronte o più lente, formano tali, o tali altri colori; Donde nasce, che i gradi della luce non cambiano per ordinario le spezie de' colori, quali si vedono l'istessi, così nel maggiore, come nel minor lume, quantunque più, o meno vivaci.

Ma poichè le vibrazioni, le quali in un istesso tempo si fanno, e che differiscono nel numero, possono secondo tutte le immaginabili ragioni de' numeri esser differenti; Quindi è facile a conoscere da tal diversità infinita di ragioni la diversità infinita de' colori; E che i colori più differenti

nascono da ragioni più divise, e differenti dall' egualità: Per cagion d' esempio, se un corpo colorito produca quattro vibrazioni di pressione sù la materia sottile, nello stesso tempo, che altro ne dà due; Quello differirà nel colore più, che se egli facesse tre vibrazioni.

Nella Musica an determinate le ragioni tutte de' numeri, che formano i varj tuoni; Ma non parmi, che possa sperarsi lo stesso nello affare de' colori; Poicché solo per esperienza si sa, che se dopo di esserci fissati al sole, ovvero a qualche risplendentissimo oggetto per alcun tempo, si chiudan gli occhi; Immantinenti si veda il bianco, indi il giallo, di poi il rosso, il celestro appresso, & in fine il nero; Donde si può legittimamente; concludere, supposto, che tal ordine sia sempre lo stesso, che i colori, quali primi appajono, sian cagionati da più pronte vibrazioni, e vive, poicché il moto impresso nella retina dall' oggetto luminoso vada di continuo scemando.

Con tal occasione il Signor *Homborg* riferì all' Accademia una sperienza fatta da lui sopra l' ordine, e successione di varj colori.

Prese egli un vetro da tutte due le bande grezzo, e poco, o nulla trasparente, e postolo in uno spizaglio, per dove tutta la luce trapelava, e non vedeva di là del vetro altri oggetti, che i bianchi, quali erano nell' opposta parte, e non già altri di variari colori: Avendo un poco pulito il vetro, vide il bianco migliore, e cominciò a scernere il giallo, & a misura, che egli più lo puliva, i varj altri colori più si divisavano con quest'ordine, giallo, verde, rosso, porporino, e nero.

Nel sistema del Signor *Descartes* il lume si trasmette per mezzo de' globetti del secondo elemento.

mento pinti per linea retta dalla materia sottile de' corpi luminosi; & i colori si producono qualora detti globetti, oltre al moto retto, son forzati a girare; E secondo le differenti combinazioni di detto moto retto, e di girazione, i colori vengon vari, e diversi.

Dovendo però secondo 'l cennato sistema i globetti esser duri; Come un istesso globo può nel medesimo tempo aver differenti spezie di giramenti? e pur questo sarebbe assolutamente necessario; poicché differenti raggi, che portano agli occhi svariati colori, in un sol punto incrocicchiano si segano, senza confonderli, e senza distruggerli, come la speranza tutto di ne dimostra.

Quindi è, che 'l P. Mallebranche sostituisce a tali globetti duri, piccioli gironi, o vortici di materia sottile attissimi ad esser compressi, e propri a ricevere in un istesso tempo nelle differenti sue particelle differenti compressioni; Poicché, ad immaginar l' istessi, quanto si voglian piccioli, sempre anno delle parti: Et essendo la materia in infinito divisibile; La sfera più picciola può corrispondere a tutti i punti di un' altra a piacimento più grande.



COMPARAZIONE.

Delle osservazioni in varj luoghi fatte su'l Barometro, sù de' Venti, e della quantità delle Acque piovane.

VErrà forse riputata affatto inutil cosa un esatto registro del vento, che in ciascun giorno spira, della forza dello stesso, e di sua durata, come ancora della quantità della pioggia, che cade, e dallo stato del Barometro; Ma le mutazioni, che avvengono in tutta questa gran massa dell'aere, sembrano più bizarre di quel che in fatti non sono, appunto per difetto di Osservatori, che con tutta diligenza per lungo tempo vi ci sieno applicati; per incoprire alcuna regolarità, se mai ella la tenga, quale solamente può ravvisarsi, per lunghe osservazioni, e per molte comparazioni delle stesse in differenti luoghi fatte. Chi sa, per cagion di esempio, se vi sia scambievole cambiamento di bel tempo, e di male fra differenti parti della terra? Sanno i Marinari talvolta predire i venti, e le tempeste, per alcuni segni, che alla fin fine non sono altro, che appariscenze visibili in detta massa, non molto difficili a conoscersi, e rinvenirli.

Il Signor *Maraldi* avendo veduto le osservazioni, che il Signor *Voillaz Descan* ha fatte su'l Barometro, e sopra a' venti in *Upminster* in *Inghilterra* nell'anno 1697., e 1698. comparò quelle con le già fatte nelle Accademie in questi stessi Anni; & eccone il risultamento del paragone.

Quantunque differenti sieno i venti, che regnano in *Parigi*, & in *Upminster*, si osserva però, che

che in moltissimi giorni delle varie stagioni dell' anno questi sieno stati l' istessi in tutte due le Città, allora per ordinario, che o per durata, o per grandezza eran maggiori; ma ciò non costantemente.

Si osserva ancora alcuna conformita nella costituzione dell'aere, e sovente rincontrasi esser piovuto, o nevigato, o serenato, in dette due Città nello stesso giorno.

La variazione dell' altezza del Barometro in tutte due i luoghi v'è molto d' accordo, ritrovandosi quasi che sempre montare egli, o calare in Parigi, allora stesso, che era alzato, o bassato in *Upminster*, abbenche tali cambiamenti non sieno all' intutto sempre di ugual misura; poichè i giorni d' ogni mese, ne' quali l' Argento vivo s' è tenuto più alto, o più basso, sono stati l' istessi in Parigi, che in *Upminster*, con tal divario, che in Parigi è calato quasi sempre tre, o quattro linee più di *Upminster*; avendo ridotta la misura Inglese alla Parigina.

Dalle osservazioni ancora si hà:

1. Che l' Mercurio si alzi alle volte, quando spira Tramontana, Greco, o Ponente, e che scenda, quando soffiano Ostro, Scilocco, o Libeccio: Nè per ciò è rimasto di montare, o abbassarsi nello stesso tempo in tutte due dette Città, quantunque fossero venti sovente differenti, e tal volta contrarj.

2. In questi due ultimi anni è caduta neve, stando il Mercurio più basso nell' uno, e nell' altro luogo: E talvolta ha nevigato, senzache detto Argento vivo fusse più dell' ordinario disceso.

3. Spesso alzandosi il Mercurio, è stato buon tempo, e bassandosi, è seguita la pioggia: E spesso ancora il buon tempo è venuto, stando detto

Argento vivo basso, e s'è coperto l'aere di nugole, essendo egli in alto.

4. Quando il Mercurio è bassato nel tempo stesso in tutte due le Città, e che in una abbia piovuto, e nell'altra fatto buon tempo, lovente egli è sceso più a proporzione in quella, dove è piovuto.

Sembra in fine, che'l Mercurio ugualmente sia montato, e disceso in tutti e due i luoghi, o che i tempi, & i venti si fossero stati gli stessi, o differenti.

Avendo il Signor di *Vanban* inviato all'Accademia Memorie della quantità della pioggia caduta nella Cittadella dell' *Isola*, fra lo spazio di dieci anni dal 1685. sino al 1694. ; Il Signor *de la Hire* a paragonati gli ultimi sei di detta osservazione fatta nell' *Isola*, con li stessi Anni osservati con esattezza da lui in *Parigi*.

Anni.	Nell' <i>Isola</i> .		A <i>Parigi</i> .	
	Dita.	Linee.	Dita.	Linee.
1689.	18.	9.	18.	11. $\frac{1}{2}$.
1690.	14.	8. $\frac{1}{2}$.	22.	3. $\frac{3}{4}$.
1691.	15.	2.	14.	5. $\frac{1}{2}$.
1692.	25.	4. $\frac{1}{2}$.	22.	7. $\frac{1}{2}$.
1693.	20.	3. $\frac{1}{2}$.	22.	8.
1694.	19.	3.	19.	9.

6. Anni . . 122. 6. $\frac{1}{2}$ 121. 9.

Nella comparazione di questi sei anni si vede in generale essere stata la pioggia maggiore nell' *Isola*, che in *Parigi*, e che l'anno mezzano dell' *Isola*, sarebbe di 22. dita, e 2. linee, quel di *Parigi* di 20. dita, e tre linee, e mezza. Il Signor *de la Hire* oltre a ciò avverte nell' anno 1695., 19. dita;

sette linee, e tre quarti, nel 1696., 19. dita, cinque linee, e mezza, nel 1697., 20. dita, e 3. linee, nel 1698., 21. dita, e 9. linee: Sicche da tutti i dieci Anni prendendo un anno mezzano, ritrovasi questo di 20. dita, e tre linee e mezza per ciascheduno, come ne' lei anni antecedenti si era osservato; quandoche nell' *Isola* l'anno mezzano delli sei ultimi, si scorge di 22. dita, e tre linee, e quello de' dieci anni intieri ascende a 23. dita, e tre linee.

OSSERVAZIONI

Intorno all' Isorie naturali, che son singolari in Francia.

Tutti i Paesi anno le loro maraviglie, o si vantano almeno di averle, poiche sovente disaminate svaniscono. L'Accademia nel voler fare inchiesta di quelle della Francia, cominciò dal Delfinato, ove un Fonte molto famoso in detta Provincia, distante da Granoble per quattr' ore di cammino, con maraviglia arde.

S. Agostino in parlando dello stesso *, e' sembra, che lo riputasse un sovranatural portento. Ma perche' è bene, prima di formar giudizio, di tener i fatti con esattezza avverati, affinche non si dimandi ragione di qualche in verità non vi è; il Signor de la Hire scrisse sopra di tal faccenda al Signor Dieulamant Ingegniere del Re nel quartiere di Granoble, da cui ebbe un rapporto così ben diviso: che migliore non può desiderarsi: Andò egli su'l luogo, e vidde con occhi da Fisico.

II

De Civ. Dei lib. 11. cap. 7.

Il Fonte , che arde , non esser egli già un Fonte , ma un ristretto terreno , lungo sei piedi , e largo tre , o quattro , sopra del quale osservasi leggier fiamma errante , e simile a quella dell' Acquarzen- te : esser egli attaccato ad una roccia arida formata da una spezie di pietra , che dicono *Ardozia* , o di *Genova* guasta , che all'aere si sbriciola : il terreno esser sopra d' un molto erto pendio , intorno a dodici piedi al di sotto , & altrettanti a lato della roccia : Da monti vicini cadere un picciolo Rivo , o Torrente , qual forse altre volte ha corso più alto , e lungo il terreno ardente ; locche avrà dato luogo al credere , che le di lui acque si accendessero .

Non si avvisa affatto , che la fiamma esca da buca , o fessò della Ripa ; donde potrebbe supposti comunicazione con alcuna caverna interiore , che fusse infiammata: Nè vi si scorge materia , che servir possa di alimento alla fiamma ; Ma solo sentesi un grave odor di solfo , senzache cenere vi rimanga : Et intorno al luogo , che arde , ravvisasi una spezie di salnitro bianco , e molto agre .

Afferma il Signor *Dieulamant* , che tal fiamma si osserva più nel Verno , e ne' tempi umidi ; che ne' gran caldi della state , quando a poco a poco manca , e sovente nel finir di essa si estingue , riaccendendosi da se stessa col variar della stagione ; tuttocchè sia molto facile a ralluminarlo con fiaccola , che all' istante con istrepito l'accende .

Osserva infine , che intorno al fuoco il terreno screpoli , s' avvalli , e scorra giù ; nè che ciò addivenga dal fuoco istesso ; Ma dalle acque , le quali trapelando per le roccie aride , seco ne portin via il terreno ; e lo scavino . E' sembra , che nel *Delfinato* sia considerabile , e grande un tal avvallamento de' luoghi , e soprattutto nel Paese , che

dicono *Chanseaux*, dove alcune volte due Villaggi posti sopra due differenti monti, che prima non vedevansi per altri Monti più alti, che si frapponavano tra essi, tutto in un subito si sien cominciati a vedere, per l'abbassamento di questi, che l'impedivano.

Ecco i principali fatti rapportati dal Signor *Dieulamant* all' Accademia, l'esplicazion fisica de' quali non sarà molto difficile a coloro, che avranno qualche idea de' Volcani; essendo questo terreno ardente del *Delfinato* un Vesuvio, ovvero un Monte Etna in picciolo.



FISICA PARTICOLARE NOTOMIA.

DELLA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE NEL FETO.

E' Si sa, che 'l sangue di tutto 'l corpo, per mezzo della Vena cava portato al cuore, si scarichi nella di lui auricula destra, e quindi nel ventricolo destro; qual restringendosi lo pinga per via delle arterie polmonari ne' polmoni istessi; che le vene di questi lo si ricevano, e riconducano nell' auricula sinistra del cuore, donde piomba nel sinistro ventricolo, che contraendosi, lo intruda in fin nell' Aorta, per cui diviso si spanda in tutto 'l corpo, per mezzo delle Arterie, dalle quali indi le

vene lo ripiglino, e nella Cava riportino: E che questa chiamino circolazione del Sangue.

Or questa circolazione propriamente ne comprende due, una più picciola, e breve, che si fa, raggirandosi tutta la massa del Sangue per li soli polmoni; L'altra più grande, e generale, che in tutto 'l rimanente del corpo dalla stessa massa si compie.

Nel Feto non v'è così affatto la bisogna; poichè la tramezza, che divide le due auricole del cuore, è traforata, e la buca dicesi *Doccia ovale*, e 'l Tronco dell'arteria polmonare, fuori del core getta un canale detto di comunicazione nell'Arteria Aorta discendente.

Dopo che li Feto è nato, il *Doccia ovale* chiudesi a poco a poco, e 'l canale di comunicazione si dissecca, e diviene un semplice ligamento.

Conosciuta, che si fù una tale *Mecanica*, non molto ristette a conghietturarsi qual ne potesse essere l'uso: finattanto, che 'l Feto è racchiuso nell'utero materno, non riceve altro aere, che quel poco, quale dalle vene dell'ombelico li viene; Sicchè i polmoni nè loro si gonfiano, e sgonfiano, come dopo ch'egli è nato, fanno, e dopo il libero valicar dell'aere: Stan dunque essi quasi che oscuri, e senza moto, & i suo'vasi ripiegati in se stessi non dan luogo, che 'l Sangue vi circoli, nè molto, nè agevolmente: Ond'è, che la natura ha dovuto rilevare i polmoni dal trapasso della maggior parte del Sangue; E perciò ha succhiato il *Doccia ovale*, affine che il Sangue della Vena Cava scaricato nell'auricola destra, in parte si rifondesse per questa *Doccia* alla sinistra, nella imboccatura delle vene de' polmoni, e venisse così a scortar cammino, come se l'avesse traversati. E' però non è intero il Sangue

gue della Vena Cava, che cade dall' auricola destra nel ventricolo, rimanendovi pur gran parte di esso per passare ne' polmoni, ove è pinto per le arterie polmonari, scemato in qualche parte per via dal canale di comunicazione, che immantinenti lo versa nell' aorta discendente, quasi che pur da polmoni venisse.

Tale si fù il parere di *Arueo*, e di *Louuer* seguito da tutti i Notomisti, e quella idea sembrava tanto conforme allo stato, & a' bisogni del Feto, che tutti eran certi di avere sopra di ciò scoperto il segreto della Natura.

Frattanto il Signor *Mery* cominciò a dubitare, fin da otto anni, da che li venne in concio di esaminare il cuore d'una Testuggine marina. Questo animale, che può lungo tempo, come il Feto, astenersi dalla respirazione, ave un cuore di una struttura sì fatta; che pare formato per supplire a tal difetto: Ravvisasi in esso la necessità, che ha il Sangue ritornato da polmoni nel cuore, di passare dal ventricolo sinistro al destro per mezzo di un' apertura; Donde il Signor *Mery* per analogia dedusse, che nel Feto dovesse pur tenere il Sangue l' stesso corso, facendo un giro contrario a quello, che nel combn sistema e' teneva.

Quantunque il Signor *Mery* non credesse, che l' imbarazzo de' polmoni nel Feto fusse la cagione, perche la natura avesse succhiato il Duccio ovale, & aperto il canale di comunicazione; concede però, che la poca quantità d' aere, che nel Sangue del Feto è, sia la cagione di questa fabbrica particolare. Durando più fatica il cuore nel pignere un Sangue spogliato d' aere, che è quanto dire, più lento, e men vivo, per tutte le parti del corpo, bisognava, che si accorciasse la circolazio-

zione, & abbreviasse così parte del cammino, che in tutto l'Uomo far suole. A questo effetto di tutta la massa del Sangue, che 'l ventricolo destro del Feto per l'arteria polmonare urta, e muove, una parte passa da quest'arteria per lo canale di comunicazione nell'aorta discendente, senza girar per i polmoni; E l'altra penetra i detti polmoni, e ritorna poi nell'auricola sinistra, ove, parte per lo *Doccio ovale* passa nel ventricolo destro, senza esser ita in giro per l'aorta in tutte le membra del corpo; E l'altra, secondo suole, è dalla contrazione del sinistro ventricolo spinta nell'aorta, e per tutto il corpo del Feto.

La quistion dunque si riduce, a sapere, se 'l Sangue, che passa per lo *Doccio ovale*, passi egli dal lato destro del cuore al sinistro, secondo la comune opinione; ovvero dal sinistro al destro, come il Signor *Mery* vuole.

Il Signor di *Verney* si era dichiarato per l'antica supposizione, sostenendo egli, che nel *Doccio ovale* fussevi una animella, che permettesse il passaggio dalla parte destra alla sinistra, facilmente rivolgendosi per tal verso, quando dal Sangue, che dalla vena cava veniva, fusse pinta, e forzata; ma che allò 'ncontro urtata dal Sangue della vena polmonare, si adattasse ella contro il *Doccio ovale*, & impedisse assolutamente di potere nè pur gocciola trapelare dal sinistro al destro ventricolo.

Il Signor *Mery* negò non solamente l'uso di tal animella al Signor *Du-Verney*, ma l'esistenza ancora; Sicche dopo molte contestazioni, sino al venire a minuti divisamenti notomici, la quistione passò sopra d' un altro punto.

Nell' Uomo l'Arteria de' polmoni riceve tutta la massa del Sangue, che dalla vena cava è riportata

tata al cuore; e l'aorta raccoglie ella ancora tutta detta massa, quale dopo di aver girati i polmoni, ritorna al cennato cuore dalle vene polmonari rifusa; dunque l'arteria polmonare, e l'aorta, che ricevono la stessa quantità del Sangue, devono essere uguali nella capacità, come in fatti le sono.

Ma nel Feto l'arteria polmonare, e l'aorta ricevono quantità ineguali di Sangue, o che si tenga l'uno, o l'altro sistema.

Secondo il comune, il *Doccio ovale* toglie dall'arteria polmonare gran parte del Sangue, che la vena cava vi conduce: Questo Sangue entrato nel sinistro ventricolo, deve per l'aorta uscire, quale, non lascia la sua funzione ordinaria e naturale, di riceverfi quel Sangue ancora, che per i polmoni è girato; dunque l'aorta terrà più Sangue, che l'arteria polmonare.

Secondo il Signor *Mery*, l'arteria polmonare riceve tutto il Sangue dalla vena cava, e di sopra più per lo *Doccio ovale* una porzione di quello, che dalle vene polmonari è destinato naturalmente per l'aorta; dunque l'aorta terrà minor quantità di Sangue, che l'arterie polmonari.

Per far giudizio della verità de' due sistemi, altro dunque non bisognava, che vedere qual de' due vasi, se l'aorta, o l'arteria polmonare avesse nel Feto maggiore ampiezza.

Il Signor *Mery* sempre ritrovò il tronco dell'arteria polmonare più ampio quasi per metà di quel dell'aorta; locche sembravali di mettere al coverto la di lui opinione.

La quistione era ne' divisati termini, e faceva mostra di attutarsi; quando per cagion d'una conclusione, che il Signor *Taury* Dottor di Medicina, & *Accademico Associato*, morto già da un anno,

fe sostenere contra l'opinione del Signor *Mery*, più viva che mai risurfe. Appena l'Accademia avea presa la nuova forma datale dal Reale ordinamento, che fù occupata a tal contestazione; poicche trattavasi di molti fatti alle prime, sù de' quali non eran d'accordo, e principalmente intorno all'ampiezza dell'aorta, e dell'arteria polmonare nel Feto; ond'è, che l'adunanza fe elezione de' Commessarj, quali con esattezza dovessero esaminare i fatti, che recavansi da un parte, e dall'altra.

Bisogna confessare, che si verificarono tutti e due i contrarj, cioè il Signor *Mery* dimostrò l'arteria polmonare più grande dell'aorta; e 'l Signor *Taury* la fe vedere più picciola: Tanto è vero, che nelle facende fisiche le semplici quistioni de' fatti, che pur sono le preliminari, tengono sovente esse stesse molte difficoltà.

Il Signor *Taury* non perciò si rimase, e pretendeva due cose, una, che 'l suo sistema non era scisso da' fatti del Signor *Mery*: tuttoche si supponessero veri; l'altra, che le sue osservazioni distruggevano il sistema del Signor *Mery*; poicche credeva egli, che l'ampiezza dell'arteria polmonare non addivenisse, perchè più Sangue indi si tragittasse, che per l'aorta; ma perchè il Sangue con minor velocità vi scorresse, impedito da polmoni, che allora non son così facili ad esser penetrati; Ond'è, che e'ringorga nelle arterie polmonari, le quali essendo per altro composte di membrane meno forti, e strette di quelle dell'aorta, arrendevoli con molta facilità si stendano. Nato poi il Feto, venendo i polmoni spiegati dalla respirazione, cominci il Sangue a più liberamente scorrer per essi, come per le altre parti del corpo, nè più ribocchi nell'arteria polmonare, la quale
 ripi-

ripigliando per vigor di sua molla quell' ampiezza, che è propria, si rende uguale all' Aorta istessa.

Ma allora che il tronco dell' Aorta nel Feto è più grande di quello dell' arteria polmonare, come il Signor *Taury* dimostrò agli Esaminatori de' suoi fatti, e sembrarebbe di necessità, che maggior quantità di sangue dovesse passar per l' Aorta, non potendo dirsi, che quì ancora e' ringorghi: Quante volte dunque copia maggior di sangue scorra per l' Aorta, l' opinione del Signor *Mery* perde tutto il suo verisimile.

Questa è una leggier idea, che si dà di tal contestazione, qual comprendeva ancora molti altri capi: Et essendo ella fatta pubblica, per mezzo de' libri dati alla luce da due Avversarj, non porta la bisogna, a dirne di vantaggio. L' Accademia n' ha rimesso il giudizio al Pubblico, non ritenendosi altra parte, che l' autorità, per una sicura testimonianza de' differenti fatti avverati.

Il Signor *Mery*, in ripigliando, al Signor *Taury*, ha risposto ancora a molti altri Notomisti abili, che s' erano opposti al di lui sistema, per difendere l' antico.

SOPRA D' UNA NUOVA

MANIERA DI TAGLIAR LA PIETRA.

IL Signor *Mery* a tutto quel che riguarda al Doc-
cio ovale ave aggiunto un Trattato men cu-
rioso forse, ma più utile sopra l' estrazion della pie-
tra, composto da lui con l' occasione del metodo
particolare, di cui si serviva per tale operazione

1807.

C

un

Un Frate del Terzo Ordine di S. Francesco, chiamato Fra *Giacopo Beaulieu* della *Franconia*, che venne in *Parigi* nel 1697. Questo novello Operatore tenuto nella di lui Provincia in una molta riputazione, colla di lui venuta qui, se l'accrebbe, e fè credere, che l'arte di tagliare, in cambiando aspetto, dovesse ella divenire molto più sicura, e facile: Frattanto l'Accademia non confidò in questi primi rumori intieramente; E'l primo Presidente diè la cura al Signor *Mery*, che disaminasse più da presso questa operazione. Vide egli cavar la pietra dalla Vesica d'un Cadavere, dove a bello studio si era riposta: Piacqueli tal nuovo metodo, e ne fè al Signor Presidente rapporto, preferendolo all'antico, sotto però di alcune condizioni, da adempirsi colla sola speranza.

Fù questa invero molto sgraziata a Fra *Giacopo*, e funesta alla maggior parte de' Malati, appunto per quel verso, che 'l Signor *Mery* avea dubitato; Cambiò il Signor *Mery* sentimento con la stessa libertà, e decorosa docilezza, con la quale avea prima dimostrata molta natural disposizione per cose nuove.

Di questo affare spesso si parlò nell'Accademia per le frequenti storie, che venivan riferite della strage, che Fra *Giacopo* avea fatto, con un metodo in tutto ardito, e quasichè sempre mortale. L'Accademia lo condannò come temerario, e 'l Pubblico troppo tardi si arrese a' mali eventi.



SOPRA L'ISTORIA DEL FETO.

IL Signor *Taury* non fù contento di semplicemente quistionare su 'l Doccio ovale, vollo' egli con tale occasione tessere tutta la Storia del Feto della sua prima origine, non ancora con certezza dalla mente umana potuta indovinare, fino al nascimento dello stesso .

In questo Trattato sostiene egli a tutto potere il sistema delle Uova, dimostrando, fra le altre pruove, che le opposizioni, quali possan farsi contro la generazione dell' Uomo per mezzo delle Uova contenute nella Ovaja delle Donne, sarebbero più forti, se si appoggiassero su le osservazioni della Testuggine, la quale fermamente non ingenera, che per mezzo delle Uova . Le Tube della Matrice di questo Animale, sono slegate sì, che nel suo ventre vanno a nuoto, e per conseguenza disadattatissime, che per esse le Uova dall' ovaja si dipongano nella matrice; Sono ancora nelle loro estremità forate d' una buca, niente proporzionata alla grossezza dell' Uovo, che dovrian ricevere; e malgrado tutto ciò, egli è fermo, che esse pur fanno qualche sembra sì difficile a poterli eseguire, e qualche nelle Donne non incontra da presso tanta difficoltà. Ecco la notomia comparata, di cui il Signor *Taury* in quasi che tutta la sua opera fa uso, quando giovi; poicchè quello, che in una certa specie d' animali è incerto, assolutamente considerato, divien certo col paragone, dovendo esser lo stesso di quello, che nell' altra

spezie, senza verun dubbio si avvifa. Quanto più si mettono in confronto le produzioni particolari della natura, più si sperare in fine lo scoprimento del piano, e dello spirito generale.

Il Signor *Tanry* cerca sempre le ragioni delle strutture mechaniche, e delle loro differenze in varie spezie di Animali. Per ragion di esemplo, tutti i Quadrupedi, o che partoriscono le Uova, o schiudano gli Animali, an due ovaja, e due Tube, donde si mandan le Uova nella Matrice, site ne' due lati del Ventre. I volatili allo 'ncontro ne anno una sola, & una Doccia per condur le Uova, e questa su 'l loro dosso attaccata, e propriamente nel mezzo: Conghiettura egli da ciò, che ne' Quadrupedi quel movimento, che in caminando fatti, agevoli l' uscita alle Uova, e la discesa per le Tube, venendo allora le viscere dell' Addomine alternatamente spinte contro le due Ovaja, e contro le due Tube; ma ne' Volatili, ne' quali l'osso dell' Addomine impedisce una tal compressione delle viscere, che dal moto, & avvicinamento delle coscie si fa, sarebbe stato inutile, che l' ovaja, e suoi Docci fossero raddoppiati; l' hà perciò la natura allogati nel mezzo del Dosso, perche sieno ugualmente premuti da' lati col gonfiamento, e sgonfiamento de' sacchi membranosi, proprie parti agli ucelli, per uso della loro respirazione.

Le Secondine delle Donne, e di alcuni altri Animali, come delle Cagne, delle Gatte, &c. non si staccano dalla Matrice senza sangue, & in altri, come ne' Ruminanti, ne' Conigli, ne' Sorci d'India &c.; non vien fuori da tal istaccamento altro, che succo latticinofo. Avvifa il Signor *Tanry*, che gli Animali del primo caso, si nutricano di carne, e que' del secondo, di erbe: Sicche sem-

bra

bra molto verisimile, che siccome la Secondina porta al Feto tutto quel nutrimento, che la Madre trasinettevi, gli Animalì destinati a detti alimenti cotanto diversi, abbian dovuti dalla loro prima formazione accostumarvisi.

Nuota inoltre il Feto in un liquore contenuto nella membrana, detta *Amnios*, in cui egli è immediatamente involto: Questo liquore, a molti segni sembra, che sia nutricevole, e più ce 'l persuade, e convince la simiglianza, che tiene con quell'altro, che ritrovasi nel ventricolo del Feto, facilmente per la bocca introdotto ivi.

Fra la membrana detta *Amnios*, e l'altra detta *Chorium*, che involge l'*Amnios*, evvi una terza, dove si raccoglie l'orina del Feto, e vien perciò chiamata membrana urinaria, sita in ver la secondina, per la qual membrana si seltrano tutti i succhi nutricevoli, che 'l Feto tira dalla Madre: E' dunque converrebbe, che questi succhi per entrare nella cavità dell'*Amnios*, penetrassero la membrana urinaria, trapelando per essa, e per quel liquido, che contiene. Ma come senza corrompersi, e senza perdere quel necessario dolcior, che i nutricevoli succhi anno?

Deirissimi Notomisti si sono a bistento ingegnati infelicamente ad immaginare andirivieni, per quali senza penetrar la membrana urinaria, si rifondesse nell'*Amnios* il cennato licore. Il Signor *Tunry* ricorre ad un nuovo spediente: Suppone egli, che la cavità dell'*Amnios* si riempisse nel primo formarsi il Feto, alloracche non può aver egli orina, da scaricare nella membrana cennata.

Essendo pieno l'*Amnios*, e divenuto il Feto più forte, la membrana urinaria comincia ella ancora a riempirsi, e distendersi all'intorno, sic-

che l' *Amnios* non più tragga nuovo succo, tenendo in riserba l'introdotta, che a poco a poco somministra al Feto, sino al suo nascere, per nutrirlo. Conferma questo pensiero l'osservazione fatta, che i rispettivi liquidi delle due membrane, a misura, che 'l Feto si avvanza, nell' *Amnios* si fecerò, e cresca nell' orinaria. Se non è tale l'artificio della natura, almeno è questo molto profondo, & ingegnoso, per meritarsi di esserlo.

Da questo saggio formerassi il giudizio dell'opera del Signor *Taury*, alla quale, come divenuta pubblica per le stampe, rimettiamo i Lettori &c.

SOPRA IL CUORE

DELLA TESTUGGINE.

* **N**on era possibile; che 'l Signor *Du-Verney* non avesse parte in una Guerra Notomica, che sotto a di lui occhi facevali: Era egli del comun sentimento intorno al Doccio ovale; e poichè il cuor della Testuggine terrestre, in cui il sangue dal sinistro ventricolo passa nel destro, per mezzo d'una apertura, avea risvegliata la prima idea nella mente del Signor *Mery*, che avvenisse lo stesso nel Feto; Il Signor *Du-Verney* con accuratezza esaminò tal cuore, descrivendone con esattezza la struttura affatto singolare, e sostenne, che non potean quindi dedursi le stesse conseguenze per lo Feto.

Dal.

* *Ved. le Memor. pag. 267.*

Dalla Mekanica del cuore di questo Animale ben isviluppata, ne nasce una maravigliosa conformità dell' opera, col disegno del sovrano Artefice, quale appunto suol avvisarsi, in profondando le osservazioni sù la Notomia . E' si sà ; che l' aere, in mescolandosi col sangue, sia a questo necessario per lo moto, e sua fluidezza, come per la molla, e per renderlo più spiritoso, per mezzo di una soave fermentazione, e per quel che lo stesso contribuisce alla generazione de' spiriti animali primi moventi dell' intiera machina . L' Uomo, e la maggior parte degl' Animali destinati a molti, e diversi moti, & a funzioni di somma vivezza, devono avere un sangue zeppo ripieno di particelle dell' aere ; Ond' è, che egli valichi per due sorti di circolazioni ; una, che di lui intiero fassi per i polmoni, affincbe in ogni momento si riempia, quanto suo bisogno porta, di aere in questa conserva doviziosa sempre di tal nuovo, e fresco elemento ; E l' altra che avviene per tutto il corpo dell' istessa massa carica d' aere, diffondendosi per esso con le salutevoli qualità, ne' polmoni contratte : Per virtù dunque di questa doppia circolazione il sangue è imbevuto, per così dire, di aere, & i due ventricoli del cuore, che sono affatto separati, tutto oprano, e divisamente scompaiono : In uno di essi ritorna tutto il sangue, dopo di aver girato per l' intiero corpo, e dopo, che si è spogliato delle sue particelle aeree, che v' a ripigliare ne' polmoni, dove per forza della contrazione di questo ventricolo è pinto, e fuor di lui lanciato . Quindi ripieno di nuovo aere discende nell' altro ventricolo del cuore, donde per tutto il corpo dividefi .

Ma la Testuggine, che molto poco svapora

e radi lentissimi movimenti essercita, non tien bisogno d' un sangue vivo, dal quale verrebbe piuttosto a sentir danno, via più nel Verno, che passa ella quasi senza nutrimento: Ond' è, che è stato fabricato il di lui cuore in maniera, che 'l sangue contenesse poco aere, per avvivarfi.

Egli è vero, che 'l sudetto cuore ha tre ventricoli, quando quel dell' Uomo non ne ha, che due; ma questi tre Ventricoli, a diritto vedere, non son, che uno, per la comunicazione, che vicendevolesse anno senza verun impedimento: Il sangue perciò ritornato da' Polmoni ricolmo di aere, si mescola col sangue, che da tutte le altre parti del corpo riviene, spogliato di esso; e queste due quantità di liquidi, avendosi fra di loro diviso quell'aere, che da una sola è portato, vengono nell' arterie unitamente spinti; ond' è, che 'l sangue delle Testuggini è meno spiritoso di quello dell' Uomo; e sembra inoltre, che secondo la capacità de' ventricoli del cuore di questo Animale, la terza parte del suo sangue a un da presso vada a mescolarsi coll' aere ne' polmoni.

Un pensiero, che si deve al Signor *Taury*, cade molto in acconcio in questo sistema. Per la respirazione e' bisogna, che la capacità del petto scambievolmente s'ampj, e si restringa, qual moto negli Animali si fa dalle parti salde, come sono le costole, che si scostano, e si avvicinano.

Ma la Testuggine è rinchiusa nel suo guscio, immobile, nè allo 'ncontro ha Diafragma, che servir possa ad una vicendevolesse compressione de' Polmoni: Che è quanto; dire esser molto duro il render conto della respirazione di questo Animale, quale il Signor *Taury* con la solita sua avvedutezza ha creduto farsi dal movimento del camminare istef-

istesso di detto Animale, il quale mentre riposa, rannicchia i piedi, e ritrae la testa sotto la superiore scaglia, aggrinzando l'intera pelle, che dette parti involge; ma quando vuol egli camminare; cava fuori la testa, & i piedi, e la pelle, venendo dalle sudette parti stirata, si slunga, e forma con ciò un interior spazio più largo, dove appunto è costretto di entrar l'aere di fuori.

A buon conto la Testuggine non respira, se non se allora che ella cammina, appunto quando ha bisogno d'un sangue più spiritoso; poichè nello stato di torpore; in cui ella è, l'è sufficiente un sangue spogliato di parti aeree.

Cheche ne sia di questa idea, il Signor *Du-Roi* dimostra, che negli Animali, qual buona parte di tempo, senza viva operazione menano, come appunto i Ranocchi, i Serpenti, le Vipere, le Salamandre, non solo il sangue, che dall'Aorta, e suoi rami, in tutto il corpo è spinto, non è simile a quel degli Uomini, che ritorna da' polmoni ricolmo di aere; ma nè pure a quello, che se n'è spogliato in tutto il rimanente del corpo, donde girando ritorna: Tanto egli è scarico di particelle attive quel loro sangue, che dispensati per tutto il corpo dalle arterie: E perciò ha in detti Animali la Natura formato il cuore di un unico ventricolo, o se pur lo vogliamo dire di tre comunicantisi, perchè il sangue ravyivato dall'aere ivi s'intrida con quello, che n'è spoffato, prima, che si dispartisca per tutto il corpo, venendo con ciò ad indebilirsi, & in alcun modo ad attemperarsi con l'altro.

Egli è vero, che l'cuore de' pesci non abbia più di un ventricolo, e frattanto che l'intera massa del loro sangue si mescoli coll'aere; Ma questo
di-

dipende da una singolarissima Meccanica, di cui il Signor *Du-Verney* comincia a far parola, per poi negl' Anni appresso più profondamente dimostrarla.

SOPRA LA STRAORDINARIA STRUTTURA
DEL CUORE
D' UN FETO UMANO.

Presentandosi per ordinario all' Accademia le cose più singolari, e novelle della natura; il Signor *Cheminéau* Dottor di Medicina si prese la cura, di recare un cuore d' un Feto umano, la di cui straordinaria fabrica molto riferiva alla questione del Doccio ovale, che in detto tempo agitavasi.

Avea questo cuore tre cavità, o Ventricoli, che comunicavano insieme, simili a que' della Testuggine: Il destro ventricolo riceveva la vena cava, il sinistro la polmonare, come sogliono; L' Aorta però non era a questo appiccata, ma con l' arteria polmonare nel terzo ventricolo, ch' e' sopra più, mettean capo.

Le di loro imboccature eran sì disposte; che 'l sangue dal destro ventricolo veniva nel terzo spinto, donde prendea il suo natural cammino per l' arteria del polmone; & il sangue dal sinistro isorgato ancora in questo terzo ventricolo, facilmente intrudevasi per lo tronco dell' Aorta, senza che vi fusse canale di comunicazione come suole esser la polmonare, e l' Aorta inferiore.

L'Ar.

L' Arteria polmonare era picciolissima nel primo uscir dalla terza Cavità; dividevasi indi in due rami, ogn' un de' quali avea un Diametro doppio del Tronco: Locche par n' additi, che 'l sangue, quale usciva dal cuore, per entrar ne' polmoni; non potendo penetrarli, arrestandosi in detti vasi, li dilatasse.

Il Diametro dell' Aorta era doppio di quel dell' Arteria polmonare.

Questi fatti sembrarebbero contrarj all' opinione del Signor *Mery*; se non si avvisassero in un cuore effettivamente mostruoso.

Il Figliuolo visse qualche tempo, ne avvisossi in lui lo stesso, che negli altri suole osservarsi, cioè quel cambiamento, che faffi nel cuore, dopo che son nati, e dopo che 'l sangue ha preso altro corso; poiche la comunicazione de' tre Ventricoli non poteva andarsi; convenendo per necessità, che 'l sangue del destro, e del sinistro accorresse nel terzo, per rinvenir ivi le arterie.

Tutta la differenza era, che dopo il nascimento, essendo il polmone disbrigato, doveva il sangue più agevolmente valicar per esso, e più copiosamente ancora, e l'arteria del polmone più ugualmente dividerlo con l' Aorta.

Ma questo Figliuolo, benché adulto, sempre sarebbe stato Feto, riguardo alla facilità di poter far egli a meno della respirazione; poiche quando il sangue non avesse potuto penetrar i polmoni, se ne sarebbe egli ito quasi che intiero per le antiche vie dell' Aorta, facili sempre a ripigliarsi. Con maraviglia sarebbesi veduto un Uomo, come la Testuggine, qualche di due nature: E se alcun Fisico fusse stato tanto abile ed indovinare, che questi avesse tre ventricoli comunicatinsi; pur non se gli farebbe ciò creduto, SO.

SOPRA LE INJEZIONI NOTOMICHE.

• **P**Oicche i vasi , che portano il sangue , e gli altri liquori s' intricano tra di loro , e si confondono per la moltitudine quasi che infinita nelle parti più picciole di un Animale, ove non sian visibili , o per la loro minutezza , o per l'abbassamento , che dopo morte avvien dell'istessi ; i Notomisti moderni si sono studiati d'introdurvi liquori , che intieri fino all' ultimo lor fine per tutti i rami scorressero , & enfiandoli , rendessero visibili , col ripigliare la prima loro vera figura. Questa operazione però ave seco delle molte difficoltà: Vi bisogna materia , che volentieri scorra, che col calore non bruci i vasi , e che essendosi raffreddata , e fissa , si sostenga senza quelli rompere: Bisogna riparare a' disordini dell' aere , che racchiuso ne' detti vasi , per lo calore della materia, che s' introduce , in istante si dilata , & i teneri Docci indi screpolano , o per lo meno impedisce il libero valico al liquore .

Il Signor *Omberg* avendo meditato sopra di tali inconvenienti , ha pensato al mezzo di ripararvi con una nuova composizione metallica più propria delle altre materie a sciringare ne' vasi , con applicare la machina del voto alla operazione : Nuovo ritrovato , per la maniera almeno , che tiene nel farlo .

Riesce di molto comodo in infinite occasioni
l'aver

* - Vedi le Mem. pag. 220.

l'aver l'aere a piacere, o'l non averlo: Nè credono questa picciola gloria della Fisica, che ne ha ritrovato il segreto.

S U G L' I N S E T T I.

* **S** Preggevoli pajono gl'Insetti al volgo, quale non sà scernere, nè quel che ammirare, nè quel che disprezzar si convenga; Le più volte più vengono riputati animali imperfetti; ma la Filosofia li stima altrettanto più degni dell'attenzione sua; quanto che e' sembrano esser dalla natura formati sù di una affatto particolare idea.

Non vi sono, per cagion di esempio, se non se alcuni, che cambiano spezie, e che dopo di esser iti per terra, levansi all'aere, e nuova vita, e più nobile prendano. Quelche il Signor *Omberg* ave osservato sopra al congiugnimento capriccioso di quello, che dicono Scorpione aquatico, farà comprendere, come la natura sia seconda, & ineshausta nelle invenzioni Mechaniche, per venire al suo intento.

Lo essere di due sessi in uno, e farne le funzioni nello stesso tempo, è cosa ancora riserbata agli Insetti; & il Signor *Poupart* ne ha fatto un ruolo di tutte spezie, nelle quali si è assicurato di una tal particolarità.

I vermi della Terra, quelli con coda ritonda, che ritrovansi nelle intestina degli Uomini, e que che sono in quelle de' Cavalli, le Lumache terrestri, quelle di acqua dolce, e tutte le spezie di Lu-

ma-

* *Ved. le Mem. pag. 185.*

11111 11111

mache , ogni sorta di Mignatte , appunto son talis , e poicche tutti detti Insetti sono rettili , e senza ossa , conchiude il Signor *Poupart* , che verisimilmente gli altri , quali anno questi due caratteri , sian parimente Ermafroditi ; giacche la Natura , che tanto è varia da uno ad un' altro genere di Animali , tien poi molta uniformità tra le spezie di un istesso genere sopra di qualche riguarda al carattere loro principale .

Non è già , che tutti i rettili senz' ossa , sian Ermafroditi ; poiche i Vermi , da' quali formansi le Molche , que' della sera , ed altri Animali , non lo sono : Ma questi lungi da essere Ermafroditi , non anno alcun sesso ; & a dritto parlare , non sono Animali , ma foderi , o maschere , che avvolgono , e nascondono i veri Animali , quali vedransi con le ali uscir fuori . Se questi vermi pajon sensibili , forse che la sensibiltà deve risponderli all' Animal nascosto , e non già a qualche si vede . Che che ne sia , il Verme , che deve cambiarsi in Mosca , o Farfalla , non è Maschio , nè Femina , nè genera , essendo Verme , attendendo la sua metamorfosi .

Per dare un esempio delle osservazioni , che possan farsi sopra gli animali Ermafroditi ; ecco come il Signor *Poupart* ha fatto le sue sopra il congiugnimento de' vermi di terra . Questi serpentelli sdruceiolano a due a due in una buca adattata , e si acconciano sì , che la testa di uno sia rivolta in ver la coda dell' altro , e per linea retta si applicano , intrudendo uno di essi un bottoncello a forma di picciolo cono in una pari picciola fessura dell' altro , e reciprocamente ricevendolo nella sua . Vedesi comodamente l' inserir de' vicendevoli bottoncini , prendendo i due vermi con tutta diligenza , e dilicatezza , & a poco a poco tirando quel-

quella parte, o spazio, che a due bottoncini si frap-
pone, col riguardarli a chiaro lume. Avviene il
loro congiungimento nella Primavera, quando ne'
Prati più umidi, e grassi bisogna cercarli, per aver
di essi i più grandi.

Poicche questi Animali sono maschi in una
estremità del loro corpo, e femine nell'altra, e fa-
cilmente si piegano, il Signor *Omberg* non istima
impossibile, che un Verme di terra li congiunga
con se stesso, e sia Padre, e Madre di un istesso Ani-
male. Sarebbe questa una strana sorte di generazio-
ne; ma quelch'è strano, lo è per nostra ignoranza,
non sapendo i termini della diversità, cou cui ha
piacciuto alla Natura di ornar le sue opere.

S O P R A A' D E N T I.

IL Figlio del Signor *de la Hire* ave osservato, che
negli Adulti l'osso de' denti non cresca più, che
le altre ossa, ma solamente lo smalto: In fatti i
denti di un Uomo attempato cavati dal Alveolo,
non sono più lunghi di quelli, che ave un Uomo
di mediocre età.

Lo smalto de' denti è di una materia affatto
differente dall'osso; Viene egli composto da una
infinità di filetti attaccati con le loro radici all'osso
istesso, quasi come le unghie, o le corna. Facil-
mente divisasi questa composizione in un dente
rotto, in cui si osserva, che tutti i filetti, quali
traggono la loro origine da quella parte dell'osso,
che tocca la gengiva, sono inchinati molto a detto
osso, e quasi gli uni coricati sù gli altri, sicche
sono presso che perpendicolari sopra la base del
den-

dente ; resistono perciò alla forza , che sono costretti in tal parte fare .

Crede detto Signore , che crescano i cennati filetti come le unghie . Se mai per accidente venga a romperli picciola parte dello smalto , sicche l'osso senta l'aere , cioè a dire , che le radici de' filetti dello smalto sian portati via ; l'osso in questa banda intarlerà , e guasterassi il dente senza riparo alcuno ; poicche le ossa de' corpi degli Animal non possono stare allo scoperto .

Vi sono impertanto persone , che anno lo smalto de' denti logoro , per averlo fosse stropicciati con pomate , ne' quali si vede l'osso ignudo , senza corrompersi : Ma in fatti l'osso non lo è , essendovi rimasta una sottil crosta di smalto , che li conserva , la quale per esser molto delicata , volentieri traspare , e si apparire il color giallo dell'osso .

Talvolta i denti si fendono , e l'osso è scoperto , nè frattanto sentesi picciolo male ; perche il dente è ben ferrato , ciò è la radice di esso , dove picciolo nervo s'immette , è affatto chiusa , tagliato avendo con ciò il nervo sudetto , e rotta ogni comunicazione con l'origine sua , e per conseguenza ogni sentita ; qual cosa si osserva nelle persone avanzate , a quali i denti si saldano .

Puol avvenire , che in alcuni denti questi filetti , che formano lo smalto sian fatti a mazzolini , le di cui estremità si uniscono , ma non già così esattamente verso l'osso , locche si avvisa chiaramente nella base de' Mascellari , dove possono distinguersi le separazioni de' mazzocchi : Ma venendosi a logorare a poco a poco l'estremità de' filetti , le la separazione fra due mazzetti cresca molto , sì che possa ricevere qualche parte dura degli alimenti ; e si farà una picciola apritura sù la base del dente .

dente l'osso si scoprirà, & indi necessariamente dovrà perire.

Dassi compenso in qualche modo a questo accidente, turando detta buca col piombo, perche s'impedisca a penetrar fino all'osso gli alimenti acri, e pugnerecci, e cagionar ivi dolore.

* La linea ACFH. determina l'estremità di due Tavole ossee, che contengono i denti, come son le Mascelle.

La parte AEC, & FGH. sono le radici de' denti contenuti nella Tavola ossea.

Le parti ADCB., & TLHI. rappresentano lo smalto formato da piccioli filetti posti in ordinanza uno a lato dell'altro, che copre tutta la parte del dente, quale stà fuori della mascella.

II. Disegnano più filetti, che fanno lo smalto uniti nella parte superiore, e slegati nella inferiore.

MM. buche, per le quali li nervi entrano nelle radici de' denti.

NN. Denti fuggellati.

SOPRA LE PIUMÉ.

DEGLI UCCELLI.

IL più picciolo oggetto, che mai nella natura sia, stanca la sofferente disamina di un Filosofo, anziche intieramente il conosca. Dalle seguenti riflessioni, che le piume degli Uccelli han suggerite al Signor *Poupart*, può farlene giudizio, le quali sarebbero in maggior numero, se egli avesse vo-

luto.

D

luto

* Fig. I. Tav. I.

tuto sino al fine profeguir l'impresa.

Le piume sono dal sangue nutricate; e dalla linfa: Ogn' uno può assicurarfi di ciò, se con poca destrezza notomizzi una del più grosso Uccello, quale ritenga ancora la sua pennamatta, non bisognandovi altro, che per lungo premere detta penna, donde vedrà gemere la linfa, e'l sangue. L'Animale deve esser Giovine, e sempre tal si richiede, quando si voglia osservare, come facciali la nutrizione nelle ossa. Le Piume, e le ossa sono parti, in cui i vasi fuggono la nostra veduta, e la Meccanica di essi è oscura a misura della loro perfezione.

Sù l'estremità del Cannoncello della penna si vede una buca, per dove entrano i vasi del sangue nella maniera stessa, che penetrano il dente per quel forellino, che li ravvisa nella punta della radice di esso. Quella materia secca, e leggiera, che, in tagliando la penna per l'uso di scrivere, si leva da dentro della cannuccia, negli Animali Giovani è un Doccio grande, e carnuto similissimo ad una vena ripiena di linfa, intorno al quale serpono, e diramansi in mille piccioli rami i vasi sanguigni, entrati per detta buca.

Ma se voglia di sapere si abbia, cosa sia questo Doccio carnuto, e grande, non bisogna ricercarlo ne' giovani Uccelli; ma negli adulti; poichè non sempre i punti di veduta sono li stessi.

• SPIEGAMENTO DELLE FIGURE.

* 1 Penna maestra dell'Ala di un grosso, e giovane Uccello, che ancora aveva sua pennamatta, la quale è tutta quasi rinchiusa nella lunga Doccia Car-

2 Tav. V.

cartilaginosa *a, b*, che conserva la barba della penna, quale ancora non è altro, che una specie di pappo.

2 Questa seconda figura rappresenta la stessa fig. 1 col cannellino aperto per lungo, affinché si veggia nella sua Cavità il grosso, e disteso corpo carnuto, cavernoso *c, d*, sopra di cui serpono infiniti vaselletti larghigni, entrati per la buca inferiore della penna *d*, per iscaricar la loro linfa nelle cavernosità di tal corpo, donde per tutte le parti della penna viene ella a dividerli, per nutrirle.

3 Lungo, e grosso corpo carnuto tirato fuori della cavità del Doccio di una grossa giovane penna; perche più facilmente, e più distintamente si veggia.

4 Corpi cavernosi composti d' imbuti verso la parte superiore, e di nappi nel rimanente, come vedesi ne' più grossi cannellini delle penne di giovani Uccelli, quando cominciano a seccarsi, e divenir trasparenti.

5 Sono questi tre imbuti l' uno all' altro incastrati, dal canale *A* della fig. 4. disgiunti, per dimostrare, come i Docci di questi imbuti entrino in fila nella loro Tromba, per deponere la linfa nelle barbe, e nel midollo della penna *a*, alla quale il Canale *E* si attracca verso *C*.

6 Sacchetti, o nappi da quali in gran parte vengon composti i corpi rappresentati nella fig. 4.

Si osserva dunque negli Uccelli adulti, che questo canale è composto di molti piccioli nappi trasparenti, uno su l' altro incastrati, e disposti in maniera, che 'l fondo dell' inferiore è ingionto, & attaccato alla bocca del Superiore, montando così per ordine verso la parte della buca: Quando però si avvicina alle barbe della penna, questi pic-

cioli nappi divengon simili ad imbuto , alme-
no in alcune spezie di Uccelli , come sono i Polli
d' India : Il Doccio dell' imbuto inferiore entra
nella Tromba del Superiore , e si attacca al di lui
fondo , e la Doccia dell' ultimo , entra nel midol-
lo della penna .

I Vasi sanguigni versano la loro linfa in que-
sti piccioli nappi , e quindi si feltra sino alla som-
mità del Doccio , dove entra nel midollo della
penna , il quale, essendo di materja spongiosa , fa-
cilmente se ne imbeve , e scompartisce a destra,
& a sinistra alle barbe .

Ne' Polli d' India questa midolla è formata da
una unione d' infiniti Cannoncelli visibilissimi , e
poicche le parti degli organi di un Animale son
pur esse organizzate , e la complicazione della Me-
canica è infinita ; non vi è luogo a dubbiare , che
negli altri Uccelli , ne' quali i docci della midol-
la delle piume non sono visibili per la loro pic-
ciolezza , che non siano uniformi , per una tal fun-
zione .

Il Signor *Poupart* ave osservato , che una sola
penna d' un Avoltojo giovane con pennamatta an-
cora pesava più , che sei altre penne uguali , qua-
li erano nella loro perfezione , cotanto era ella
piena di succo nutritivo, donde conchiude , che sic-
come le penne sono istrumenti necessarj agli Uccel-
li , per procurarsi il vitto , la natura li studia d'
assolverle , e vi ci lavora con maggior diligenza
di quella , che nelle altre opere non usa .

Sarebbe bastato il conoscere che 'l vano della
Doccia della penna era dalla natura formato , per-
che fusse questa nello stesso tempo forte , arrende-
vole , e leggiera ; ma vedesi di più , che tal voto
serve di magazzino al nutrimento , qual deve di-
stri-

tribuirsi in tutta la piuma, e che uno stesso mezzo soddisfaccia insieme a molti differenti usi.

Egli è ancora molto curioso lo avvertire alla diligenza, che tien le Natura, per conservare le nascenti piume de' giovani Uccelli: Le barbe di questi altro sù le prime non sono, che una specie di pappa, per la loro delicata tenerezza, avvolte in cartoccio, in un lungo doccia cartilaginoso ripieno di umido, affine l' aere non le disseccasse, e strignesse in guisa i loro pori; che non potessero più ricevere nutrimento: Ma quando an preso vigore, sicche non possan temere la forza dell' aere; la guaina, che le involgeva, quale non più loro bisogna, seccasi, & a squame da se stessa cade.

SOPRA LA RABBIA DEL CAN GUASTO, OVVERO IDROFOBIA.

L'Avversione, che si ha per l'acqua, o l'Idrofobia, quale si accompagna con la rabbia, è una delle più stupende circostanze, che a malattia possa unirli. Qual correlazione, qual ligamento frà il veneno entrato nel sangue per la morsicatura di un Can guasto, e l'orrore, che si ave per le cose liquide, la sola vista delle quali non può comportarsi dagl' Infermi, tanto ella li agita, e convelle, fino a renderli furiosi?

Il Signor *Tanury* avendo osservato per qualche tempo un Giovane moricato, di cui ne avea predetta la morte, lo aprì tutto che in fretta, e

cercò di trovar cosa per tal segimento , che potesse da tal male nascere .

Ritrovò la parte interiore dell'esofago infiammata , e l' aspera arteria un qualche poco ancora; nel fondo dello stomaco vi erano da tre cucchiain di moccicaja tinta di un bruno molto oscuro , simile a qualche spesso l' Ammalato vomitava : La Vescica del fiele era pienissima di una bile quasi che nera , nel Pericardio eravi poco siero , e le arterie molto gonfie di un sangue fluidissimo , di cui poco ne conteneano le Vene : In niun Vaso si ritrovò sangue congelato dopo morto , nè questi si rappigliò mai , tutto che esposto all' aere freddo; quando per lo contrario quello , che col salasso pochi giorni prima se li era cavato , facilmente si coagulò : Il Cervello , e quasi che tutte le sue parti erano molto più dell' ordinario secche , come ancora il principio della Spinal midolla , e tutti i muscoli del Corpo .

Le conghietture , che 'l Signor *Taury* prese da tali osservazioni , sono le seguenti : Apparentemente la scialiva , e la bile , sono i primi succhi infettati dal veneno . L' Infermo , nel recere una mescolanza , che avea scorticato , & infiammato l' Esofago , avrà preso dopo l' avversione agli Alimenti così fodi , che liquidi , quali non potevan senza dolore traccannarli , e precise i liquidi , come quelli , che scioglievano i sali nocevoli avvolti nella bile , o nella scialiva .

Ma perchè la difficoltà di prender gli alimenti , comune per altro a diverse malattie , produce, ella questo intensato orrore , e furioso , per lo cibo, e soprattutto per lo bere ?

Egli è molto verisimile , che la natura del veneno sia , di sciogliere le parti balsamiche , e nutritive che.

chevoli del sangue ; ond'è , che i corpi non più si alimentino , e le vene disseccate , per difetto di nutrizione , si ferrino , e non diano più facile il passaggio al sangue , che dalle arterie lor viene : Or questo ritenuto nelle Arterie per lungo tratto , & in gran copia , è , senza rifinar mai , battuto , compresso , e più disciolto , di qualche anzi non era per forza del veneno.

Il Cervello da una parte , e le fibre nervose son poco umettate da tal sangue , che d'altro non è zeppo , se non se di parti spiritose ; e dall'altra questi spiriti con rapida straordinaria folla volano in ver del cervello ; donde facile è il dedurre le ragioni delle convulsioni , e del furore , allorchè la sede dell'anima è vinta dal fuoco.

Palmario , per quel che riferisce il Sig. *Tauvry* , dice , che questi Ammalati non soffrono di rimirare uno specchio , nè simil cosa trasparente : Forse perchè questi oggetti , che per lor natura fanno una viva impressione , la facciano allora sopra di un cerebro troppo teso , & appiccato : Le acque , & i liquori sono trasparenti , & oltre a ciò anno un lor movimento , che aggiugne sprone a mobilissimi organi dello stesso.

Il sistema di un male serve di guida per rinvenire rimedj più azzardosi , che mai sappian darsi , ove la morte dell'Infermo sia certissima , lasciandoli senza cura.

Il Signor *Tauvry* crede , che i medicamenti calorosi , & acri , de' quali per ordinario si fa uso , siano pessimi , trattone il sal marino , che può in alcun modo rattener l'unione delle parti del sangue : Stima ancora molto men proficua per tal malattia l'acqua , donde il suo Infermo peggiorava , dopo di averla bevuta , sicchè il natural

Istinto in questa occasione era salutare. Apparentemente gli Emetici agevolerebbero la guarigione, se potessero per qualche tempo rattenerli nello stomaco, ricevendo detto Animalato un sollievo di qualche durata dopo un copioso recere: Il Mercurio in gran quantità preso, forse che urterebbe in questi ostacoli, che lo strignimento delle vene mette alla circolazione: Sarebbe ancora a proposito l'uso de' precipitanti, quali correggerebbero l'agrezza della scialiva, e della bile; e dopo questi l'uso del latte rifarebbe il sangue delle parti nutritive delle quali è spogliato. Posto questo affare su 'l Tappeto nell' Accademia, molti riferirono riguardevoli curagioni di tal male, venute in loro contezza.

Il Signor *Poupart* disse, che una Donna guasta, essendo stata segnata, fino a svenire, ligata sopra di una sedia per un anno, e nutrita con pane solamente, & acqua, fussene guarita: Il Signor *Berger*, che tra le molte persone morsicate, due ne camparono, a quali egli aveva cavato il sangue dalla fronte, essendosene le altre perite: Il Signor *Dubamel*, che bastasse l'acqua salata su la piaga.

Si addussero ancora esempj di alcuni, a quali si era tolto l'error dell' acqua, inondandoli con gran quantità di essa, e fra gli altri fù riferito di un Uomo, a cui ligato in un Albero, l'avean gittato sopra 200. secchi d'acqua, senz'altro apparecchio.

Ma l'istoria più distinta si fù quella, che recò il Signor *Morin* d'una Giovane Donzella di 20. Anni morsicata nella mano da un Garzone rabbiato: Ebbe questa tutti gli accidenti de' guasti; perlocche sedici giorni dopo la mortificazione si pensò di tuffarla in un bagno grande di acqua di Fiume freddo; piuttosto, che calda, nella quale si disciolse uno stajo di

sa.

fale: Fù ella immersa tutta ignuda, e levata in diverse fiato, e dopo di averla in tal guisa tormentata, così sbalordita, come ella era, li fè sedere nel bagno. Quando rinvenuta cominciò a riguardare l'acqua in cui era, fù tutta sorpresa, come senza orrore la rimirasse. Dopo questo la di lei malattia non fù, che una regular infermità, sendoli sopravvenuta la febre, quale col metodo comune fù curata: Sentiva spesso voglie à recere, & i vomitivi la sollevavano, dando l'ajuto alla natura. Molte altre volte fù rimessa nel bagno, sicchè in fine perfettamente guarì, e tutta la malattia non durò più di un Mese. Il Signor *Morin* ricavò questo rapporto da alcune Memorie, che il Signor *Raoul* Chirurgo dell' *Ospedal di Dio*, assistente all' Inferma, aveva giorno per giorno formate.

E' sembra, che l'immaginazione aizzata con tanto furore contro dell' acqua, e contro tutte le cose liquide, domata che sia una volta, & astretta a soffrir con pazienza questi objecti, sia una gran parte della difficoltà della cura vinta; così perche gli spiriti, non irritandosi più, & infiammandosi a tal veduta, lasciano di mettere tutto il corpo in disordine, come ancora perche gli Ammalati sono più maneggevoli pe' remedi, e più docili a prendere i convenevoli alimenti.



S U L O S C O R B U T O .

* **A** Vendo il Signor *Ponpart* avuta l'occasione di visitare un gran numero di Scorbutici, ne ha formata una esatta Istoria, che nelle Memorie s'inferisce: Ella è piena di circostanze molto particolari, facili a capirli.

D I V E R S E

O S S E R V A Z I O N I

N O T O M I C H E .

I.

I L Signor *Ponpart*, avendo aperto un Uomo morto nell'età di circa cento anni, ritrovò una maravigliosa mescolanza di segni di vecchiezza, e di novella giovinezza.

Le nove vertebre inferiori del Dosso, formavano un osso intero, essendo le cartilagini, che sono fra di esse divenute ossa; & oltre alle Apofisi traverse ordinarie delle Vertebre, vi erano ancora delle traverse anteriori, l'ite per ogni lato sopra l'articolazione di ciascuna vertebra: Quelle del lato destro erano più grandi, rotonde, e ricoverte di un bell'osso bianco, nuovamente vegetato, qual vegetazione sembra, che sia a guisa di un metallo fuso, l'cor-

* *Ved. le Memor. pag. 224.*

6.:

scorsa tra queste Apofisi, per ligarle più forte-
te insieme: Quelle del manco lato erano più corte,
e simigliavano a' capezzoli, quali cominciava
la natura a vestire con bianco osso novello, quasi
che volesse ringiovenir questo Vecchio.

Così appunto vecchio Tronco si rinverde,
quando il secco suo legno si ricopre di nuova cor-
teccia, che alligna, e caccia nuovi rami di più lun-
ga vita.

II.

Il Signor *Mery* disse, che avendo aperta una
Donna morta, senza poter ella sgravarsi, fattale
l'operazione, che dicono Cesare, aveva nelle In-
testina osservato sensibilissimo il moto loro vermi-
culare, e peristaltico, tutto che il Cuore, & i Pol-
moni stassero affatto immobili.

III.

L'istesso Signor *Mery* ha mostrato un apparec-
chio esattissimo della colcia, e del piede di un A-
quila, e ne ha data la descrizione, da riporsi nel re-
gistro: Dipigne egli al naturale il gran numero de'
muscoli diversamente intrecciati gli uni negli al-
tri, la loro grandezza, la inserzione, & i movi-
menti: Vedesi l'origine Mecnica della forza straor-
dinaria degli artigli di tal Animale. Quest' Opera
forse non ha a porzione mossa la curiosit  di buon
numero di gente, quanto ha costata di fatica allo
Autore.


IV.

Pu  dirsi lo stesso della sezione di un Pellicano;
morto in *Varsaglies*, fatta parimente da detto Si-
gnore. Dimostra i differenti muscoli, che servono
al moto del collo di questo uccello, molto lungo
invero, e diviso per mezzo di Vertebre: furono
ancora osservati con diligenza i muscoli, e mem-
brane dell'ale.

Il Padre *Gouge* ha comunicata all' Accademia descrizione notomica di una Tigre vergata, fatta nella China da PP. Gesuiti. In Europa non li conosce altra Tigre, se non se quella, che ha la pelle taccata; ma nella Tartaria, e nella China vi sono ancor di quelle, che l'anno vergata di listre nere, & i Paesani pretendono, che queste siano di due differenti spezie, tutto che non paja, che fuor della divisata altra differenza vi si frapponga. La Tigre listata, che i Gesuiti della China aprirono, e che era stata ammazzata dallo Imperadore nella caccia con quattro altre, non pesava più di 265 libbre, che è quanto dire, non era delle più grandi, ma una delle altre pesava 400. La notomizzata avea la terza parte del ventricolo piena di vermi, senza che egli fusse corrotto; & alcun di coloro, che erano presenti, disse, che l'istessi vermi si erano ravvisati in un'altra Tigre aperta in Macao.

Il Signor *Du-Hamel* antico Segretario ha letto nell'Accademia in più volte stagli di un Analisi, che e' fa del Trattato di *Aristotile de partibus Animalium*, ove con diligenza avverte alla differenza, che vi ha tra l'antica, e la moderna Notomia, & agli errori de' quali è ravveduto il Mondo, & alle incertezze, che non più son tali, & alle ignoranze, che ancor sussistono. L'Istoria de' progressi fatti finora, deve farci sperar molto, & incoraggiare.





CHIMICA.

MISURA DE' SALI

VOLATILI ACIDI

Contenuti ne' Spiriti Acidi.

Quelche nella Chimica dicefi Spirito, altro non è, che un liquore, la di cui virtù confiste in alcune particelle sottili attive, che nuotano in acqua, o flemma inutile, quale per niun arte si è potuta fceverar mai. I spiriti acidi, come quelli del Sale, del Nitro, del Vitriuolo, riconofcono tutto la poſſa loro dal Sale acido, di cui ſon pregni, nè altronde può farſi ſtima del loro vigore: E poichè la meſcolanza de' ſali acidi con la flemma è in varia proporzione ne' differenti ſpiriti acidi, profittevoliffimo farebbe il conoſcimento di tal proporzione, quando che ſi voglian fare operazioni delicate, per le quali ſia neceſſaria un eſattezza precifa. Ma (difetto de' mezzi per giugnere a queſto) una iſteſſa operazione ha diverſe ſorti in differenti Perſone, e talvolta in una medefima.

Il Sig. *Omberg* ſi è ſervito del Metodo, che ſiegue, per conoſcere la quantità de' ſali acidi, tutto che ſtrettamente involti nella lor flemma, & immerſi

• *Vedi le Mem. pag. 68.*

merfi: Il sal di Tartaro è un potente Alkali, che ingolla avidamente i sali acidi; Fa perciò egli, che un'oncia di detto sal di Tartaro s'imbeva a sua posta, per cagion di esempio, dello spirito di Nitro; dal qual nuovo composto ne fa svaporare tutto l'umido, e rimanere asciutto il sal di Tartaro, accresciuto di peso, per la giunta de' sali acidi di detto spirito, quali svaporata la flemma, si ave egli ritenuti: Questo peso accresciuto appunto è la quantità de' sali acidi, che un'oncia, due dramme, e 3 granella di detto spirito di nitro versato su l'oncia del sal di Tartaro, contiene; e vedendo dopo lo svaporamento, aumentato il peso del sal di Tartaro, di 3 dramme, e granella dieci, deduce, che un'oncia di spirito di nitro, contenga due dramme, e 28 granella di sali acidi.

E' quì facile il vedere, che la stessa operazione fatta sopra di un'oncia di sal di Tartaro con altri spiriti acidi, dia ugualmente la proporzione de' sali con la flemma di tali spiriti. Perlocche il Sig. *Omberg* ha formata una Tavola de' principali spiriti acidi, de' quali si fa uso nella Chimica.

Non basta il conoscere, che quantità di sale acido sia contenuta in certo peso di spirito; bisogna spesso ancora sapere con minutezza quanto uno spirito sia più grave dell'altro; ond'è, che'l Signor *Omberg* dà un nuovo strumento Areometro, da preferirsi in molte cose all'antico; Sicche in dissaminando due liquori con questo strumento, non può chichesia, senza tosto avvedersene, fallare della quintesima, o sessagesima parte di una goccia, qual'errore è facilissimo a ripararsi. Lo dilatamento di liquori nel caldo, e'l ristignimento nel freddo, è un comune inconveniente in tutti gli Areometri, & in tutti i Metodi di misurare gli stessi li-
guori

quori in differenti stagioni ; Perlocche il Sig. *Ombert* dà ancora una Tavola delle differenze ultime dell'ampiezze de' principali liquori della Chimica ne' gran caldi, e ne' gran freddi; donde potrà prenderli a un da presso la norma per la temperie dell'aere mezzano .

SOPRA LA MANIERA DI CONOSCERE

IL SOLIMATO CORROSIVO SOFISTICO.

I *Giornali di Lipsia* nel Mese di Dicembre 1698. fan parola di un libro, che ha per titolo *J. C. Barcufen Pyroſophia*., in cui l'Autore riprende alcuni Chimici, quali avevano aſſerito, che per diſtinguere il buon ſolimato corroſivo, da quello, che con l'Aſſenico ſi altera, non biſognava altro, che ſtillarvi ſopra alcune gocce dell'olio di Tartaro per deliquio ; poicche ſe egli diveniva roſſo, ſi era perfetto ; ma ſe anneriva, era viziato : Dice il Signor *Barcufen*, che tal ſaggio ſia falſo ; poicche tutti i Solimati corroſivi, alterati, o nò, che ſiano, ſe vi ſi ſpruzzi l'olio di Tartaro, ingialliſcano, indi arroſſino, & in fine, eſpoſti all'aere per qualche tempo, divengan neri.

Il Sig. *Boulduc* ha riputato tale queſto fatto, che non ha voluto crederlo, ſe non ſe alla propria ſperienza ; giacche nella Chimica molto alle altrui ſi crede : E' vò d'accordo col Sig. *Barcufen*, che ſia inutile il ſaggio, e che l'olio di Tartaro faccia lo ſteſſo eſſetto ſopra di qualunque ſolimato ; niega però, che detto ſolimato, qualunque e' ſia, ſi
anne-

annerisca in fine, avendo dimostrato il contrario all'Accademia.

Confermò nello stesso tempo la critica del suddetto Sig. *Barcufen* contro *Aglafer*, e de *Le-Feure*, quali avevan detto, che lo spirito volatile del succino facesse effervescenza cogli acidi. Il Sig. *Boulduc* avendo ritrovato nella *Farmacopea* dell'ultima edizione del Sig. *Charas* l'istesso fatto, era entrato in sospetto, che non fusse falso; ma se ne ricredè intieramente in tale occasione della critica del Sig. *Barcufen*, e sè vedere all'Adunanza, che 'l sal volatile di succino, lungi dal fare effervescenza cogli acidi, la fa sì con l'olio di Tartaro, Alcali il più forte di tutti; donde siam più che certi, che quello sale sia acido.

Il Sig. *Barcufen* ha fatto bene, a non credere intieramente queste cose a buoni Autori; e 'l Sig. *Boulduc* a non confidarsi in tutto al Sig. *Barcufen*. Gli Autori troppo l'un l'altro credono; ma pur bisogna, che'l birronismo, e la diffidenza buttino le fondamenta delle scienze, e della certezza.

E S A M E

DELLE ACQUE MINERALI.

IL Sig. *Regis* costretto, per riparare alla sua salute, di andare a prender le acque di *Balaruc* nella *Lingadoca*, non volle farne uso da semplice Ammalato; ma da Filosofo la pose in disamina, e col ritorno, che indi fece, accrebbe con sue esperienze, e riflessioni il Tesoro dell'Accademia.

Si servono di dette Acque, e per bagnature,
e per

e per bere ; ma l' uno , e l' altro fassi per quattro volte in quattro giorni consecutivi , liccome la sperimenta ha dimostrato.

Le acque di Balaruc fummano di continuo copiosamente , e l' fummo sente qualche poco del solfo , e nel toccarle sembrano così calde , come le acque presso a bollire : Un tal calore però svanisce in brevissimo tempo , e ti rende soffribile ; nel berla , ugualmente il calor di essa par che scotti , e frattanto ti tracanna senza pena alcuna . Quel che però dimostra , come affatto esse non bruciano ; si è , che le foglie dell' Acetosa conservano per lungo tempo il fresco lor verde , e l' uovo di recente nato , per lo spazio di tre quarti di ora immerso in detta acqua , non si altera punto , come se nella fresca acqua fusse posto.

In bagnandoli , muovono un sì copioso sudore , che non permettono lo starvi dentro più di un quarto di ora.

Rendono la pelle del corpo molle , & un qualche poco untuosa ; locche dimostra contenere esse un solfo dolce , e finissimo , da niun' arte separabile , per la troppo sua volatile natura.

Nel gusto son salite , e quantunque questo falso sembri simile a quello delle acque Marittime ; egli però è molto men potente , e spiacevole.

Il Sig. *Regis* con l' ajuto del Sig. *Didier* Medico di quel Paese volle scoprire , se dette acque racchiudessero un sal volatile acido distrigato dal loro sale Alkali , valevole perciò a risvegliare una fermentazione , e mantenere un continuo calore . Questi Signori rinvennero quel che cercavano : La tintura di Fiori di Malva , che divien rossa cogli acidi , e verde con gli Alkali , arrossò un poco , tosto che se l' infuse l' acqua dalla forgiva intinta :

*Hor.**E**Ma*

Ma questa tintura non viene alterata dalla stessa acqua divenuta fredda, nè meno se ella si riscaldi; locche divisa non solamente un sale acido; ma volatilissimo, che speditamente si disbriga dall'acqua. Questa stessa tintura di Fiori di Malva, qualora con l'acqua del Mare, o fredda, o calda, che sia, si mesce, rischiara solamente un poco nel suo colore, senza divenir rossa.

Dal sal volatile acido si venne alla cognizione del sal fisso Alcalino, come quello, che vi riman sempre, o che le acque si facciano svaporare per mezzo del fuoco, o che sian distillate in bagno Maria.

Il verde, in cui tinge questo sale la cennata tintura di fiori di Malva, la fermentazione cogli spiriti acidi, e la quiete, per così dire, che con altri Alkali, qual si è l'olio di Tartaro, mantiene, non fecero dubitare della di lui natura alcalina.

Non è frattanto egli scevero in tutto da qualche acido; poicche i principj de' Misti non si separano così perfettamente bene gli uni dagli altri. Mezza oncia di questo sale distillato senz' altra giunta in un picciolo fuoco di riverbero, in poco tempo dà fuori quarant'otto granella di uno spirito costantemente acido, tutto che molto dolce.

Il Signor *Boulduc* ha disaminate le acque di S. Amant vicino Tournay, rese celebri da qualche Anno, con gli stessi principj di Chimica.

Essendo si fatti tutti i saggi Chimici di queste Acque, non fanno esse mostra alcuna di contener acidi, o Alkali: Locche darebbe a divedere una molto uguale mescolanza di principj: Rendono sì bene latticinosa l'acqua della calcina, & imbiancano molto lo Aceto di Saturno.

Il Sig. *Boulduc* ave osservato , che svaporate dette Acque col fuoco , per ogni libra , deponevano 12 granella d'una Terra molto biancastra , quale disseccata , scintillava un poco , e da queste istesse 12 granelle di terra , si ebbero tre granella di sale , quali potrebbero ancora scemar di peso , se si risciolgessero , indi filtrassero , e svaporassero in fine.

Per fare però le sperienze sopra di detta Terra , e sopra del sale , vi bisognava maggior quantità di quella , che il Sig. *Boulduc* ne aveva ; e perciò ha egli rimessa ad altra occasione una disamina più ordinata , e più profonda.

DI VARIE OSSERVAZIONI

C H I M I C H E .

IL Sig. *Lessery* disse, di aver conosciuto un'Alchimista così avvezzo all'uso del Mercurio , che mangiava il solimato dolee , come altri il pane : Che egli stesso ne avea veduto masticare , e tranguaggiare quattro oncie in una volta ; assicurandoli l'Alchimista , che di tempo in tempo e' ne prendeva una simigliante quantità , per purgarsi dolcemente , e per purificar il suo sangue.

II.

Su'l proposito de' purganti , che variamente operano , secondo la diversità de' temperamenti , il Sig. *Mery* riferì ancora , che due persone conosciute da lui , essendosi trattenute per cinque , o sei ore in un tempo d'affai caldo in luogo , dove erano molte rose solutive , ebbero eglino per 12 ore soccorrenze , e vomiti così violenti , che crederono di morire ;

Sentivano essi , che dalla testa abbondantemente cadeva loro un umore , e questo forse era una pituita , qual calava allo stomaco , sciolta dalle parti volatili delle rose , penetrate nelle gangole del cervello .

III.

In una delle Adunanze, parlandosi della ruggine del ferro , e degli incomodi , che differenti opere per essa ricevano ; il Sig. *Omberg* comunicò un segreto ritrovato da lui , per riparla.

Prendete otto libre di Scotennato di Porco , toglietene la pelle , e tutta quella carne , che può esservi , tagliatela minutamente , e fondetela su 'l fuoco con tre , o quattro cucchiaj d'acqua in un pignatto nuovo vernicato : Passate per tela il grasso disciolto , e riponetelo nello stesso pignatto sopra lento fuoco , con quattr'once di Canfora sbriciolata , e bollite insieme dolcemente , fintanto che sia la Canfora tutta disciolta : levate allora dal fuoco questa compolizione , e mentre ancora è calda , mescolatevi tanto di Piombagine , quanto bisogna per darle un color di ferro : Con questa radice appunto si tinge la creta a colore ferrigno .

Bisogna servirsi di questo grasso in luogo dell'olio , per istropicciarne il ferro , ovvero l'acciajo , & egli deve esser caldo , sicchè appena possa dalla mano soffrirsi , e quando sarà raffreddato , si asciughi bene con panno lino .

Il Sig. *Lemery* spesso ave intrattenuta la compagnia con la di lui grande opera intrapresa sopra l'Antimonio , studiandosi in essa di cavar da questo minerale tutto ciò , che può averfi , e spollarlo , per così dire , con tutte sorti di operazioni possibili , unendolo con tutte altre materie , dalla qual mescolanza possa sperarsi qualche novella scoperta .

Ha

Ha egli spiegato già, e dimostrato all'Accademia un buon numero di dette operazioni, fatte su di tal mira; ma perche tutte verran comprese in un corpo, che di breve si pubblicherà; si è stimato miglior consiglio di presente, a non detrarre cosa dallo intero di esse, qual sarà più utile, e più aggradevole.

Non farà fuor di proposito, prima di lasciar la materia di Notomia, e di Chimica, rapportare quì un giudizio dall'Accademia formato, che si attiene all'una, & all'altra scienza.

Il Capo Speciale della Città di *Lisle*, avendo sequestrato presso *Michele du Mont* Speciale della stessa Città il Castoreo, qual pretendea, che fusse adulterato, e male; venne condannato il *du Mont*, che sosteneva la bontà di esso, dal *Maggiore*, e dal Consolo di *Lisle*, quali ne avevan preso il parere dal corpo de' Medici, e Speciali della Città, a 28. di Aprile 1698. *Du Mont* allegò a suspetto il Consolo, i Medici, e gli Speciali, appellandone al Parlamento di *Tournay*: Il Parlamento con decreto de' 24. Luglio 1699. ordinò, che l'Accademia Reale delle Scienze consigliasse su la qualità del Castoreo staggito; per esecuzione di tal decreto, fù inviato il Castoreo all'Accademia con tutte le necessarie cautele, perche non fusse egli cambiato. E 'l Signor *Fremin* Avvocato del Consiglio, lo consegnò al Segretario con copia autentica di detto decreto: tosto fu disaminato il Castoreo, particolarmente da Notomisti, e Chimici della Compagnia, e su le loro relazioni, l'Accademia fù di unanime parere, che 'l Castoreo ti fusse ottimo, e lontano da ogni sospetto di essere stato viziato: Il Segretario ne diè le attestazioni al Sig. *Fremin*; e si seppe di poi, che il Parlamento di *Tornay* con

70 *Istoria dell'Accademia Reale*
sentenza definitiva conforme al parere della stessa
Accademia avea giudicato.



BOTANICA.

SOPRA DEL PARALLELISMO DEL CESTO DEGLI ARBORI COL SUOLO, CHE ADOMBRANO.

* **M**oltiplicano le maraviglie a misura, che
si ha l'occhio più proprio, per avvisarle.
In molti Alberi fruttiferi, come sono le Mela, i
Peri, e le Castagne, e generalmente tutti que',
che li simigliano, quali appunto son le Noci, le
Quercie, l'Elce &c. la base del Cesto si osserva qua-
si che sempre parallela al piano, donde sorge il
Tronco, o che sia il piano Orizzontale, o che non
lo sia, & o che i Tronchi siano perpendicolari,
ovvero inchinati sù di detto piano: Questa disposi-
zione è così costante, che se un Albero produca
in luogo, ove da una parte il piano sia orizzonta-
le, e dall'altra declive, la base del cesto si leva in
quella parte, che è orizzontale, e declina nell'
altra a misura del piano.

Questi fatti si son parati dinanzi a molti
oc-

* *Fig. 2. Tav. 1.*

occhi , che pur non l'an veduti ; non sono però essi fuggiti da quelli del Signor *Dodart* , che con ammirazione l' ha ben avvertiti ; perlocchè ne ave egli ricercate le cagioni , e formate delle conghietture.

Avverte primamente , che le ramose radici sieguono la superficie del piano , qualunque e' sia , donde l' *Arbore* surge , camminando tra due terreni , ove la loro sussistenza , e' l' minor ostacolo incontrano , più che se affondassero . Deve perciò il cammino delle radici rimarsi parallelo al piano , ove è piantato l' *Albero* .

Considera di poi le radici , il Tronco , & i Rami , come composti dalle stesse fibre dritte , e tra di loro parallele , quali stendonfi dal fin delle radici per lo Tronco , sino all'estremità de' Rami : In questa supposizione le fibre si piegano due volte , e formano due angoli , uno nello unirsi le radici al Tronco , e l' altro nel dividerfi i Rami : Poichè le radici sono sempre parallele al piano , che produce l' *Albero* , se questi è perpendicolare a tal piano , lo è ancora alle radici ; e se egli è inchinato al piano , è egli ancora inchinato ugualmente alle radici . E' dunque chiaro nel primo caso , che le fibre supposte continue dalle punte delle radici , sino a quelle de' Rami , formino su' l' piè del Tronco nell' una , e nell' altra parte due angoli retti , e nel secondo caso due angoli , uno de' quali è ottuso , e l' altro acuto . La quistione a risolvere è , perchè la base del cesto degli *Alberi* sia sempre parallela alle radici sparnicciate ; e perchè allora , che queste radici fan col Tronco due angoli inequali da una parte , e dall' altra , il cesto con Rami faccia gli angoli istessi col Tronco alternatamente disposti , come è necessario alla formazione delle parallele .

Eccò sopra di ciò quel che il Signor *Dodart* immagina. Da quel lato, dove l'Albero fa un angolo ottuso col suo piano, e per conseguenza con le sue radici, una fibra, che dalla punta della radice vâ alla estremità del Ramo, fa necessariamente lo stesso angolo ottuso a piè del Tronco; se dovesse questa formare un altro angolo ottuso, ovvero retto nel piegamento del ramo di detto albero; egli è chiaro, che li converrebbe allungarsi, e distendersi di molto: Or le fibre del legno possono sì piegarsi, ma non già stendersi; che perciò quella fibra, che ha formato un angolo ottuso a piè dell' Albero, deve, nella division de' Rami dello stesso lato, farne uno acuto, compimento dell' ottuso, non potendo dilungarsi, e per conservar la lunghezza, che tiene, in formando al solito due angoli retti nelle due piegature: Et essendo l'angolo acuto de' Rami compimento dell' ottuso delle radici dello stesso lato, egli è chiaro, che li rami, e le radici son paralleli.

Dall' altro lato, dove questo stesso Albero inchinato fa un angolo acuto col suo piano, e dove una fibra ne forma uno timi e nel collo della radice; egli è certo, per l'osservazione istessa, che faccia un angolo ottuso in su 'l collo de' Rami: Non però è così facile a spiegare, perche questa fibra rallentata in qualche maniera per l'angolo acuto, che fa nel basso della radice, si drizzi poi, & allunghi per farne un ottuso nella division de' Rami: Qual legge l'obbliga a questo? perche non si rimane ella nel medesimo stato di rallentamento, e non fa nel collo della diramazione un secondo angolo acuto?

Il Signor *Dodart*, che si fa questa obiezione, egli stesso risponde, che da quel lato dell' Albero, la
pli-

pliche formate dalle fibre una sù l'altra distese dal centro di detto Albero infino alla sua corteccia, siano altrettanto meno sottili, meno strette, e più ritonde; quanto più le fibre son prossime al centro; e che quelle, che son più da vicino alla scorza, possono in verità essere rallentate; ma le altre, che le cingono, sono distese dalla grossezza del plico, e che in conseguenza cercano esse a raddrizzarsi su 'l collo de' Rami, & a far ivi un angolo ortuso. Bisogna perciò supporre, che le fibre in questa disposizione poste, siano in maggior numero delle altre, sicche attingano queste ad acconciarsi alla loro positura.

S U 'L S A L E .

D E L L E P I A N T E .

* **L**E Piantе anno un loro sale essenziale, cioè un sale, che si tien da esse, senza l'azion del fuoco, cotanto simile negli effetti al salnitro, ovvero al sal comune; che sembra egli essere stato da dette Piantе, qualunque elle siano, fucciato dalla terra, senza alterazione alcuna. Ma come due piante differentissime, l'una all'altra vicina si nutricano ugualmente bene nello stesso terreno, se punto elle non alterano, e non convertiscono ciascheduna di esse a lor proprio uso particolare i succhi, che ne traggono?

Per dilucidar questo dubbio il Signor Omsberg prese da un Giardino buon terreno, che lavò egli

* Vedi le Mem. pag. 98.

egli con molte acque boglienti, per ispogliarlo al possibile da tutti i sali; indi divise 800 libbre di detta terra in quattro testì uguali, seminandovi una ugual quantità di Crescione di Giardino in due di detti testì, e di Finocchio nelle due altre: Innacquò in fine un Vase di Crescione, & una di Finocchio con acqua, in cui avea disciolto il Salnitro, sicchè per ogni testo divisèvi due oncie per lo meno di detto Sale, e le altre due le innaffiò con acqua pura.

Questo era dunque il sicuro mezzo da comparare insieme due Piante molto differenti, che non traessero dalla terra, se non se un' istesso Sale; e nello stesso tempo una, che si nutrisse in terra scipida con altra nutrita in terreno innaffiato col Salnitro.

Ecco l'esito del paragone: le Piante de' quattro vasi sbuciarono ugualmente bene, e quando il Crescione giunse all'altezza di sette, o otto dita, il Signor Omberg lo diradicò, e rinvenne quello, che era nella terra scipida piantato, pesare 25 oncie, e l'altro 27 e mezza.

Al gusto non vi era differenza, ma nell'Analisi Chimica, il Crescione innaffiato col Nitro, diede un poco più di principj attivi: Questa differenza, però era cotanto insensibile, che potea passarli per quella, che suol essere inevitabile tra due Analisi.

Il Signor Omberg fe crescere il Finocchio più lungo tempo del Crescione, e a differenza fù molto più grande fra le due casse di Finocchi di quella, che fra le due di Crescioni era stata. Il Finocchio innaffiato col Nitro era un terzo più alto, e tinto di più bel verde dell'altro, e pesava due libbre, quando questo appena giugneva ad oncie 19.

Spiega egli in una molto verisimile maniera, per:

perche la differenza sia stata senza paragone più grande tra li due testi di Finocchi, che fra quelli del Crescione, e crede, che si debba tutto al tempo più lungo, in cui il Finocchio si è lasciato crescere; poiche quando la picciola impercettibil pianta, benché nel suo seme intieramente formata, comincia a svilupparli, tira ella tutto il suo nutrimento della sostanza stessa del granello, fin a tanto, che avendola consumata, e divenuta più vigorosa, comincia a succiar dalla terra l'alimento. Staffi con quel picciolo provvedimento, donde ella deve sostenersi per qualche tempo, racchiuse, come appunto il Feto con le sue Secondine, che vien nutricato fino al suo nascere dal succo, che di là viene: fintanto che due piante son molto tenere, e giovinette da poter sussistere col solo granello, la loro condizione è uguale; ma quando questo picciolo magazzino è voto, se rinvenzano esse terreni variamente disposti, traggono quindi inegual profitto, e con tanto divario, quanto più in sì fatti differenti terreni si trattengano per nutrirsi. Di per se conosceli ciò nelli due testi di Crescione, e nelli due di Finocchio.

La differenza per l'Analisi Chimica de' principj attivi fra li due testi di Finocchio, è stata ancora più grande di quella, che si avvisò nelle due di Crescione.

Questo, che è di una natura Alcalina, ha dato tutti i suoi principj molto Alcalini; quello ancora, che era stato innaffiato col Nitro, in cui costantemente vi è molto di acido.

Il Finocchio, che pure è di natura Acida, ha dato molto acido in tutti i suoi principj, e quello ancora nato nella terra scipida.

Può quindi facilmente dedursi, e che i terre-

no giammai possa. intieramente spogliarsi de' suoi sali, per semplici lavande; e che la maggior parte de' Sali contenuti nel'e piante, si formi, qualunque e' sia, o da naturali fermenti, che essi ritrovano, o dagli organi differenti, che li feltrano.

O S S E R V A Z I O N I

B O T A N I C H E.


IL Signor *Renoume* ha ritrovato sopra le foglie di quella specie di Acero, detto *Acer Manna-candidum* C. B. P., una umidità viscosa, quale non poteva esser altro, che una sensibile esalazione della pianta; poicche sebbene non fusse ella altrove, che sù le foglie; non era già perciò una ruggiada, per l'ora, che non l'era propria; e perche le foglie più esposte al Sole, erano le più immastriciate di tal umore: Ha questo uua dolcezza più aggradevole della Manna, approssimantesi al Zuccaro. Alcuni Autori han parlato del succo, che geme dalle 'ntaccature dell'Acero nella Primavera, buono a bersi, e di uno sapore, che si accoltava al Zuccaro; non han però fatto motto di questa grassa umidità, che a parer suo li simiglia, quale naturalmente ritrovasi sù le foglie di tal Albero. Detto Signore l'ha ravvisata ancora sopra quelle dell'*Acer campestre*, & *minus* C. B. P.

Il Signor *Tournefort* ha data un Istoria molto ampia del Tamarindo, Albero Africano, di cui finora non avevamo nè figura, nè descrizione esatta.

Il

* Vedi le Mem. pag. 128.

Il Signor *Marchant* ha letto all' Adunanza molte descrizioni di piante fatte con accurata diligenza, le quali son riserbate per un' opera particolare.



MATEMATICA.



ALGEBRA, E GEOMETRIA.

Q U A D R A T U R A

D'UNA INFINITA' DI SEGMENTI, E DI SETTORI DELLA CICLOIDE.

F Ra tutte le linee curve da nuovi Geometri immaginate, e disaminate su le loro proprietà, quella, che ha fatto più rumore, si è la Cicloide, formata dal movimento di un punto della circolare circonferenza, che giri sopra di una linea retta, e successivamente si adatti per tutti i suoi punti, a tutti quelli di detta linea.

Quanto più a fondo si è disaminata, altrettanto più si è scoperto in essa di bello. Se si cerchi, che un pendolo faccia vibrazioni ineguali in tempi esattamente uguali, non bisogna, che e' descriva archi di circolo, ma sì bene archi di Cicloide. Se si sviluppi una mezza Cicloide, cominciando dal-

dalla sommità; forma ella, in ilviluppandosi, un' altra mezza Cicloide simile, & uguale: E' ben li sà qual mirabil uso abbia fatto il Signor *Huygen* di queste due proprietà singolari, per ridurre gli Orologj a perfezione.

Buon tempo è, che 'l Signor *Beynoulli* Professor di Matematica in *Groningue* propose questo Problema a tutti i Geometri d' Europa; *Supposto, che cada un Corpo obliquamente sù l' Orizzonte, qual sarebbe la linea curva, che descriver dovrebbe, per cadere il più presto, che possibil si fusse?* poicche, non deve egli descrivere una linea retta (locche sembra maraviglioso) quantunque più breve di tutte le linee curve terminate fra li stessi punti. Nella soluzione fatta di tal Problema, si ritrovò esser la curva una Cicloide.

Una delle più importanti conoscenze, che sù le curve possa averfi, consiste nella esatta misura de' spazj, che racchiudono, o sole, o con le linee rette; locche dicesi quadratura di esse: Se detto spazio può misurarsi, qualunque mai sia la porzion della curva, che vi entri, e le ordinate, o le parti del diametro, che lo determinano con essa; questa è la quadratura assoluta, ovvero indiffinita, come si ha dalla Parabola. E' però avviene talvolta, che non possono quadrarsi, se non se spazj rinchiusi da certe porzioni della Curva, e da certe ordinate, o da certe parti del diametro determinate.

* Tosto si vidde, che la quadratura indiffinita della Cicloide dipendeva da quella del suo circolo generatore; e che perciò era impossibile, secondo tutte le apparenze: Ma il Signor *Huygen* il primo ritrovò la Quadratura di un certo spazio Cicloida-

* Vedi le Mem. pag. 172.

le determinato: Il Signor *Leibnitz* dipoi ritrovò ancora quella di un altro spazio parimente determinato, e credevasi, che dopo di questi due gran Geometri, non rinverrebbe altro spazio quadrabile nella Cicloide: Frattanto il Signor *Bernoulli* Professore in *Groningue* scoverse nella stessa una infinità di spazj quadrabili, ne' quali son compresi, e per così dire, assorti li due del Signor *Huygen*, e del Signor *Leibnitz*: Donde scorgesi, che la Geometria a misura, che ella è trattata da menti sublimi, va sempre montando dal particolare all'universale, e fino allo 'nfinito ancora.

Non bisogna impertanto credere, che questa infinità di spazj quadrabili, siano altra cosa, se non se una Quadratura particolare; poicche sono egli-
no limitati da certe condizioni. Ella è una specie, che ha un numero infinito d'individui, ma in fine non è, che una specie.

M E T O D O

PER TROVARE CURVE,

Lungo le quali cadendo un corpo si avvicini, o discosti dall' Orizzonte in quella ragion di tempo, che si vorrà.

L'Acceleramento della caduta de' corpi gravi generalmente è ricevuta, secondocche il *Galileo* l'ha stabilito; e secondo questa ipotesi un corpo, che cala, descrivendo una Cicloide, v'impie-

* Vedi le Mem. pag. 1.

piega sempre tempi uguali, abbenche inegualmente si accosti all'orizzonte, o che e' cada più, o meno alto.

Ma (supponendo sempre la progressione di *Galileo* per lo acceleramento delle cadute) se si volesse, che questo istesso corpo si avvicinasse ugualmente all'Orizzonte in tempi uguali; non dovrebbe egli cadere per una Cicloide, ma' per qualche altra curva.

L'altezza, e lo acceleramento delle cadute si misurano sempre sopra di una retta perpendicolare all'orizzonte, che divide l'Asse della curva, le di cui differenti parti corrispondono a differenti archi.

La Cicloide è tale, che se un corpo, che la descrive, cada da una più elevata altezza, & acquisti per conseguenza un certo accrescimento di velocità, secondo l'ipotesi del *Galileo*; l'Arco Cicloidale più grande, che deve descrivere, consumerà precisamente questo accrescimento di velocità, in maniera che il corpo non caderà, nè più presto, per avere acquistato più di velocità, nè più tardi, per aver avuto più cammino a fare, donde nasce l'uguaglianza de' tempi, malgrado l'ineguaglianza degli Archi.

Ma nell'altra curva, che cercasi, e' bisogna, che un corpo, quale da una doppia altezza cade, impieghi un doppio tempo, cioè, che l'arco più grande, che dovrà descrivere, sia tale; che non possa egli esser descritto, se non se in un tempo due volte tanto, quantunque la velocità sia accresciuta.

Egli è chiaro, che più questa Curva si dilunga dall'origine della caduta del corpo, più debba ella inchinarsi, e stendersi ver l'orizzonte; poichè e'

bi-

bisogna, che 'l corpo, la di cui velocità sempre cresce, faccia altrettanto più di cammino; quanto più si approssima all'orizzonte, & impertanto e' bisogna, che non si avvicini, se non se quanto nel cominciamento faceva: Or egli non vi è, che un molto inchinato cammino, e molto obbliquo, per dove possa eg i scorrer molto, e poco avvanzarli.

Il Signor *Leibnitz*, & i Signori *Bernoulli* an ritrovati, che questa curva sia una seconda Parabola cubica: Ave ella una cosa notabile, e si è, che il corpo, quale deve descriverla, per accostarsi ugualmente all'orizzonte in tempi uguali, non la possa descrivere dal principio della tua caduta; e' bisogna, che sù le prime cada per linea dritta, da certa altura, che la natura di questa Parabola determina, nè possa cominciare ad avvicinarsi all'orizzonte in tempi uguali, se non se con la velocità, che per tal caduta acquista. Che si cominci a muovere questo corpo secondo questa Parabola con un grado di velocità uguale a quello, che per detta caduta avrebbe acquistato, è chiaro, che sia l'istessa cosa.

Invece di regolare l'uguagliansa delle cadute di questo corpo, rispetto a l'orizzonte, può assumersi riguardo ad un punto, che sarà nell'Asse della Curva; & allora la Curva piglierà un'altra Curvatura per diriggerli sempre a tal punto, divenendo differente da quella si era. Questo Problema, che contiene nuove difficoltà, è stato ancora sciolto dal Signor *Leibnitz*, e Signor *Bernoulli*.

Ma il Signor *Varignon* ha ritrovati tutti questi scioglimenti molto limitati; perlocchè egli quì li solve in termini infinitamente più generali. La caduta de' corpi, rispetto all'Orizzonte sarà non solamente uguale in tempi uguali, ma proporzio-

nale a tempi, qualunque si vogliano. Di più non è necessario di supporre la progressione del *Galileo* per l'acceleramento, ammettendo qualunque altra progressione, che si vorrà mai immaginare. In fine vien sempre in questo Problema supposto, che la direzione de' corpi gravi, cioè le rette linee, per le quali il peso li mena al centro, siano parallele nella differente loro positura: Locche non è vero, se non se in brevi tratti sensibili; ma non già nel rigor matematico; poicche tutte le direzioni de' corpi gravi vanno al centro della Terra. Detto Signore ha pur dato una soluzione su'l credere, che dette direzioni concorrano.

Tutto ciò ha riguardo solo alla caduta de' corpi rispetto all'orizzonte, ma se si voglia riguardo ad un qualche determinato punto; il Signor *Varignon* non è contento di locar detto punto nell' Asse della Curva, come si era fatto; e' lo mette in tutte altre possibili situazioni, purchè però sia nel piano di detta Curva: Questo punto trasportato in tutti siti, che possano averli, dona molte proposizioni nuove, & altre già conosciute, ugualmente curiose, che le novelle; poicche la mente vede con piacere rinascere antiche verità da' principj affatto nuovi.

Per cagion di esempio, in supponendo, che questo punto, donde il corpo cadente si avvicina sempre ugualmente all'orizzonte, sia infinitamente discosto, secondo una linea orizzontale, vedesi risurgere la Parabola, che *Galileo* fa descrivere alla palla del Cannone tirata orizzontalmente: Il cammino, che *Galileo* ha tenuto, e quello del Signor *Varignon*, sono così differenti; che è una meraviglia, come conducano alla stessa verità.

Questo è'l vantaggio de' Metodi generali; dando

da essi in una fiata tutte le verità di una specie: Quele, che in particolare si eran potute scoprire fino a quel tempo, si ritrovano mischiare in questa moltitudine, ove non altri, che la pena di riconoscerle.

SU L'EQUAZIONI

DEL SECONDO, E DEL TERZO GRADO.

Quelli, che hanno la più leggera tintura di Algebra, conoscono la difficoltà della soluzione dell'Equazioni, quando sono del secondo grado. Il Signor *Varignon* ha ritrovato per queste di tal grado, e di più per quelle del terzo un'istesso Metodo così semplice, e facile; che fa meraviglia, come egli il primo l'abbia rinvenuto.

Quantunque l'estremo bisogno, che si ha dell'Algebra, per tutte le parti della Matematica, sia stata cagione, che i più addestrati Geometri a tutto potere si siano studiati di perfezionarla; conviene però confessare, che pur ella finora sia molto imperfetta, e che abbino a scoprirsi molti Metodi, che si desiderarebbono: Aggiugni, che il Signor *Rolle* pretende, che de' Metodi Algebraici da buoni Autori ricevuti, e che si an per certi, ve ne siano de' molti difettosi, e talvolta falsi. Sarebbe egli un far molto; se e' li facesse ricredere gli Algebraisti, e si prevenissero gli errori, a' quali e' menerebbero: Ma il Signor *Rolle* spera più lungi, e substituire in loro luogo migliori Metodi; e questo fa-

F 2

rà

• Vedi le Mem. pag. 180

sà una parte della gran Opera, che stà meditando, dalla quale non si è stimato a proposito per ora di tagliarne cosa alcuna.

SU LA DUPLICAZIONE

DEL CUBO.

Il Problema di duplicare il Cubo è famoso, per lo inutile sforzo, che vi anno impiegato a scioglierlo. Il Dottor Gio: *Ramonno Conrinius* Maestro della Cappella del Palagio di *Lima*, impresso ivi in *Lima* nel 1696. un picciol libro, nel qual pretende di aver ritrovato lo scioglimento: Essendo stato mandato all' Accademia questo Libro dal Signor *Braynsen* Tesoriere della Città di *Bruges*, con istanza, perche ne dicesse il suo parere; ella diè la carica al Signor *de la Hire* a disaminarlo, il quale ne scoprì l'abbaglio, tutto che molto intricato.



ASTRO

ASTRONOMIA.

SV' L RITORNO

DELLE COMETE.

Quanto più il sistema, che formarono gli Antichi dell' Universo, era, per così dire, picciolo, e ristretto; altrettanto più glorioso ad *Apollonio Mindiano* è, di aver concepita la nobile idea, che le Comete fossero stelle regolari, e di aver osato a presaggiare, che un giorno si scoprirebbero le regole de' loro movimenti.

Questa predizione, che altronde non potè venire, se non se da un genio elevato, e grande, non ancora si è avverata, e può ragionevolmente accaglionarli il poco progresso, che l'Astronomia ha fatto dopo *Apollonio*: Può essere ancora, che questo pensiero, tutto che magnifico, non ha pur vero. Frattanto il Signor *Cassini* v'incontra finora molto del verisimile, e reca tante delle pruove, che s' sembra dover esser quello Astronomo da *Apollonio* predetto.

Suppone dunque, che le Comete descrivano cerchi prodigiosamente Eccentrici alla Terra, e che siano esse in tal punto, che non possiam noi vederle, se non se in una picciolissima parte della le-

* Vedi le Mem. pag. 58.

E 3 10

ro rivoluzione, e che fuor di questa vadano a disperdersi dentro a' spazj immensi, dov's da nostri occhi, e da nostri Cannocchiali s'involano.

Questa picciola parte del loro Circolo, che a noi è la più prossima, il Signor *Cassini* la fa passare tra quel di Venere, e di Marte. Quando egli ha potuto scoprire per mezzo della Parallasse la distanza di qualche Cometa, come quella del 1652., e 1680. l'ha ritrovata in detto spazio di Cielo: Delle Comete più distanti, non avriamo più sensibili Parallassi, durando pur fatica ad avverare quella di Venere, e di Marte.

Sopra di queste supposizioni il Signor *Cassini* pruova per un Paralello di Pianeta, e di Cometa, che questi Astri potrebbero ben esser regolari.

1 Quando si considera la via delle Comete riguardo alle stelle fisse; si vede, che quelle sieguono per lungo tempo un Arco di un circolo massimo della sfera, cioè a dire, di un Circolo, il di cui piano passa per lo centro della Terra, benché travino un poco, principalmente su 'l fine del loro apparimento, e questo traviare divien più sensibile quanto più si accostano a detto fine. Sembrarebbe questo cosa fuor di regola; ma pur i Pianeti fanno lo stesso: La loro orbita sega l'Eclittica sempre in due punti, che diconsi nodi; se questi fossero fissi, & immobili; sarebbero opposti per diametro, e l'orbita di un Pianeta sarebbe un circolo massimo, come lo è quel dell' Eclittica: Ma poichè i nodi continuamente mutano; avviene, che mentre un Pianeta, quale ha trapassato l'Eclittica, per cagion di esempio, nel primo grado di Ariete, e v'è sino a Libra; i suoi nodi abbian cambiati siti, e non più per lo primo grado di Libra ripassi egli l'Eclittica, ma o più in quà, o più in là; ond'è, che
l'or.

l'orbita sua non sia esattamente un circolo massimo della sfera. Questo traviare del Pianeta cagionato realmente dal movimento de' nodi, sembra più grande ancora, & irregolare di quel che in se stesso non è; perciocchè non essendo la Terra centro de' Pianeti, toltone la Luna; quel che in se stesso sarebbe uguale, non lo è a nostri occhi, e quel che è ineguale; l'è molto più, riguardo a noi, & combinandosi differentemente il moto della Terra, con quel de' Pianeti, risultano molte apparenti irregolarità. Con maggior ragione qualche li è detto, può applicarsi alle Comete.

2. Le Comete, come i Pianeti, sembrano di girar più velocemente, quanto più son prossimi alla Terra; e quando sono in eguale distanza dal Perigeo, cioè dal punto, che è il più vicino di essi alla Terra, la loro velocità è presso che l'istessa: Si può togliere dal loro movimento l'ineguaglianza apparente di velocità, cagionata dalla differente distanza, in cui sono, dalla Terra, e ritrovar in tal guisa un loro moto uguale: Ma non siamo sicuri, che tal movimento sia il vero; poichè tali ineguaglianze reali potrebbero non essere sensibili nel picciolo spazio, in cui noi vediamo la rivoluzione di una Cometa: E' ancor verisimile, che 'l vero lor moto, come ancora quel de' Pianeti sia ineguale in se stesso; e così le osservazioni fatte, durante l'apparimento di una Cometa, non saprebbero dirci il tempo dell'intera sua rivoluzione.

3. Due differenti Pianeti non mai segnano coll' orbita loro l'Eclittica ad un istesso angolo, ne anno i nodi nello stesso punto dell' Eclittica; nè la loro velocità apparente nel perigeo è la stessa: E per conseguenza due Comete in differenti tempi vedu-

te, che convenissero in queste tre principali cose, potrebbero ben essere una istessa Cometa.

Tali furono le Comete del 1577., e del 1680., quella del 1652., e del 1698., & è pur molto, che dopo il 1680. sino al 1698. cioè a dire in 18. Anni, sian comparse due Comete, delle quali può sospettarsi, che fossero le stesse con due altre, una del Secolo passato, e l'altra della metà di questo Secolo. L'esatta conformità ne' tre punti di sopra avvisati, non è ella necessaria, perche due Comete non siano, se non se una; è però ben ella necessaria al giudizio, che ne dobbiam noi fare. I nodi d'una Cometa possono variarsi da una rivoluzione all'altra, e può ella tagliar l'Eclittica con differente angolo; come ancora variar l'Eccentricità, & in conseguenza la sua distanza, riguardo alla Terra, e la sua velocità: Il Signor *Cassini* ritrova nella Luna sola esempj di tutte queste irregolarità, quali in'avendole una Cometa, farebbe più che simile ad un Pianeta, ma nello stesso tempo sarebbe molto più difficile a riconoscerla per la stessa nel suo ritorno; & avverrebbe ciò, dopo un gran numero di rivoluzioni, e dopo le sperienze di più Secoli, quando potrebbero rinvenirsi i periodi di tal variazioni, & accertarsi della Cometa.

Ve ne sono alcune perciò, che malgrado delle considerabili differenze, pajono al Signor *Cassini*, che possono essere concedute; ma non è ancora il tempo da pensarvici, e tal cura deve rimettersi a' secoli avvenire.

Evvi ancora una difficoltà nel formar giudizio delle ritornate di una Cometa, e questa si è, che benché regolari, & uniformi quelle si fossero, non possa con tutto ciò esser ella ravvisata, nè riconosciuta per d essa. Può la di lei grandezza, o real-

mente, o in apparenza scemare, come quella del quinto Satellite di Saturno, che si osserva mancare, & in fin si perde di veduta, per una metà di ciascheduna rivoluzione, anche allora, che si avvicina alla Terra; Se lo stesso avvenisse in una Cometa verso il suo Perigeo, noi non la vedriam affatto. Di più, se in venendo da questo Perigeo, rincontri ella il Sole, camminerà di giorno, e verrà oscurata. In fine riconosconsi le Comete dalla coda, che formano; una, che perdesse la sua, per qualunque possibil cagione, non verrebbe nel Cielo. fra le altre ravvisata: Questa Coda che pur è di una tenue consistenza, trasparendovi, le stelle per mezzo di essa, può molto facilmente divenire invisibile, o per la condizion dell' aere, che li si frappone, o per alterazioni reali, che sopravvengano.

Quaunque però sian tutte queste difficoltà: cosa non fa sperare una lunga serie di Osservazioni, e l'ingegnosa pertinacia degli Astronomi?

OSSERVAZIONI DELL' ECLISSI.

• **P**rima che avvenisse l'Eclisse della Luna, quale nella sera de' 15. di Marzo si osservò, il Signor *La Fours* diede all' Accademia il calcolo, che siegue.

Il principio deve essere a

5^h 56' 41"

Il Mezzo a

7 22 7

Il Fine a

8 47 33

La Grandezza di

7 dita 42.

Corr^a

* Vedi le Mem. pag. 31.

Comparando questa predizione con le osservazioni, che furon fatte da Signori *Cassini*, e *de la Hire*, impresse tra le Memorie, si farà giudizio della esattezza dell' Astronomia odierna, e delle Tavole del Signor *La Fevre*.

* Vi fu parimente a 23. Settembre un Eclisse del Sole, osservato con la stessa accuratezza da suddetti Signori Astronomi.

† Ne' registri del Signor *Cassini* scorgerassi l' industria umana, fin dove possa giugnere sù di tal faccenda.

Confidera egli l'ombra, che sù la superficie della Terra venne dalla Luna.

Ne descrive il movimento da Occidente in Oriente, dechinante verso mezzo giorno, e la fa cominciare dalle parti Orientali dell' America settentrionale, e finire nella parte Occidentale della China, dopo di aver trapassata per mezzo l' Africa, e l' Equatore.

Vuol che detta Ombra non si distenda più della metà quasi Settentrionale su 'l nostro Emisfero; cadendone ancora a voto una parte inverso il Polo, per non avervi rincontrata Terra.

Prende egli in detta Ombra la linea di mezzo, che passa per lo centro del Sole, e della Luna, formando l'oscurità più densa; e nell' istessa maniera va rintracciandola sù la superficie della Terra, e determina così tutti i luoghi, che an veduti l'Eclisse centrale: Da due lati di detta linea l'Ombra è più rara, e l'Eclisse non può esser, che delle parti, le quali faranno altrettanto più picciole, e l'ombra più debile; quanto più detti luoghi son vicini alla estremità del recinto oscuro.

De.

* Vedi le Mem. pag. 205.

† Vedi le Mem. pag. 207.

Determina ancora la velocità di quest' ombra, quale scorre su per la Terra, più veloce di una palla da Cannonie sparata.

Ne regola infin la Figura. Quando la linea tirata dal centro del Sole, e della Luna passa per quel della Terra, e l'è perciò perpendicolare, l'Ombra è rotonda; altrimenti ella è bislunga, & altrettanto più irregolare; quanto che i raggi estremi, quali la comprendono, sono più inclinati; e più svariatamente inchinati a differenti parti della Terra, ove cadono. Questa obliquità della proiezion dell' ombra fa, che ella sia più distesa, e che non così rapidamente passi; Potendo ancora i raggi, che sono a' confini dell'ombra, essere scollati, e pinti fuora dalla refrazione, onde l'ombra cresca di vantaggio.

Il Signor *Cassini* avendo ritrovati i luoghi, donde potea vederli l'Eclisse centrale, cerca, se l'abbian potuto veder totale, dipendendo questo dall'uguaglianza de' Diametri apparenti del Sole, e della Luna; poicché se quel del Sole è più grande, l'Eclisse vedrassi a forma di anello, rimanendo una circonferenza luminosa del Sole, quale fa un girello al corpo della Luna oscuro; se poi l'apparente Diametro della Luna sia più grande, l'Eclisse è, per così dire, più che totale, nascondendo intieramente il Sole per qualche momento; ma se li due Diametri siano perfettamente uguali; l'Eclisse è totale per un solo istante.

Nel tempo di tale Eclisse potevano essere i Diametri perfettamente uguali: ma pur bisogna aver mira alle differenti ore del giorno, in cui l'Eclisse centrale sia stato in differenti luoghi veduto. La Luna non è cotanto dalla Terra distante; che la differenza di tali distanze non sia sensibile, al-

allora che ella è nell'orizzonte, o nel mezzo di; in quello, come più lontana, è più picciola; in questo come più vicina, è più grande. Egli è vero, che gli occhi dicono il contrario; ma questo altro non è, che un giudizio dell'animo, di cui i Filosofi conoscono l'errore, quale non cambia cosa nella variazion reale, che le differenti distanze devono produrre. Oltre a questa variazione, bisogna ancora nel calcolo della grandezza del Diametro della Luna scemarvi un secondo per ora: poichè nel tempo dell'Eclisse va ella in ver il suo Apogeo, e si discosta dal centro della Terra: Dimodoche que', che non an veduto altro, se non se il fin dell'Eclisse, anno osservato il Diametro della Luna un poco più picciolo. Può quindi dedursi, quali scrupoli sian necessarij per la perfezion dell'Astronomia, e quanti importanti minuzie si debbano osservare.

O S S E R V A Z I O N E

D I G I O V E.

LE variazioni delle macchie di Giove, le sue Bande, che tosto si slargano, e tosto si restringono, che si sepatano, e poi si confondono, sono cambiamenti appena a migliori Cannocchiali sensibili; considerabili però piucche se l'Oceano innondasse tutta Terra ferma, e lasciasse in suo luogo nuovi continenti. E' bisogna, che la Terra a paragon di Giove, sia in maggior tranquillità, e ben più esente da Fisiche rivoluzioni: Non sono
dunq,

• Vedi le Mem. pag. 136.

dunque tali mutazioni, che si avvifano nella superficie di tal Pianeta piccioli oggetti a Contemplatori della Natura; anzi che un importante studio per gli Aſtronomi, come quelli, che ditterminar poſſono con ſicurezza, in quanto tempo giri egli intorno al ſuo aſſe, dalle Macchie fiſſe, & invariabili, che col ritorno l'additano. Ne' regiftri del Signor *Caffini* potrà vederſi l'iſtoria delle Macchie di Giove, e le conſequence, che indi ne deduce.

OSSE R V A Z I O N I

DI UNA STELLA

SU L' O R B I T A DELLA LUNA.

I L P. *Fevilles* de' Minimi abile Aſtronomo inviò al Signor *Caffini* una ſingolare oſſervazione, quale fù comunicata all'Academia.

A 7. di Marzo 1699. alle ore 9. min. 39. della ſera in *Marseglia* oſſervò egli il Corno Meridionale della Luna, che in paſſando per le Iadi, andava ad oſcurar la ſtella, che ſià nel lato Occidentale di *Aldebaran*, avvertita da *Bayer*.

Quelche vi fù di particolare, ſi è, che la Stella, dopo di aver toccato l'orlo luminoso della Luna, & in conſequence prima di eſſere occupata, non laſciava di farli vedere per alcuni ſecondi ſopra l'orbita luminola di queſto Pianeta, e per detto tempo dimoſtrava, che ſi avvanzaſſe; dopo di che tu-
ta affatto diſparve.

Spie-

• Vedi le *Mémor.* pag. 192.

Spiegherebbesi quest' apparenza molto bene, se un' Atmosfera cingesse la Luna; poicche essendo la Stella veramente occupata, & i suo' raggi non potendo venire a noi per lo diritto; infranti da detta Atmosfera vi sarebbero pervenuti, e ci avrebbero rappresentata la sua Immagine sù l' Orbita della Luna.

Ma allo 'ncontro non pare affatto verisimile, che la Luna abbia Atmosfera; perlocche il Signor *De la Hire* colto il suo tempo de' 19. d' Agosto, per fare la stessa osservazione del *P. Fuiiles*, e successali simile, immaginò un' altra cagione di tal Fenomeno, allà quale tanto più vi fù indotto, quanto, che avea veduto progredir la Stella sempre con movimento uguale verso l' orlo della Luna: Or se la Luna avesse avuto l' Atmosfera; nel giungervi la Stella, i di lei raggi si sarebbero infranti, e venuti agli occhi sotto altri angoli, di quello, che prima della refrazione venivano, & avrebbero cambiata la grandezza apparente del cammino, che la Stella faceva.

L' Obgetti luminosi distanti appajono più grandi di quel che dovriano, perche essendo più facile a raggi di riunirsi per la distanza, lo fanno al di quà della Retina; e dopo di essersi disgiunti, vanno a formare una più grande, ma confusa immagine in essa: I Cannocchiali sminuiscono questo falso accrescimento, in fatti però intieramente nol tolgono; e il Signor *de la Hire* conghiettura, che la Stella si sia veduta sopra l' Orbita della Luna, sin tanto che rincóntrossi col falso accrescimento dell' immagine di detta Luna, dopo del quale, il corpo di questa occupò veramente la Stella.

SOPRA LA
PARALASSE ANNUALE
DELLA STELLA POLARE.

NEl Sistema di *Copernico* l'Asse della Terra, parallelo sempre a se stesso, deve col suo moto Annuale descrivere una specie di Cilindro, che prolungato fino al Cielo delle Stelle fisse, delinei ivi, per sua base, una circonferenza circolare: Ogni punto di questa circonferenza è 'l Polo del Mondo, secondo il giorno dell' Anno, che li corrisponde; & in conseguenza il Polo apparente della Terra, o del Mondo, deve nel corso di un Anno incessantemente variare: Locche non osservandosi; una tale difficoltà proposta su le prime, contro l'ipotesi del moto della Terra, rimane pur ferma.

In altro modo non par che possa sciogliersi questa, se non se supponendo il circolo annuale della Terra così picciolo, rispetto alla distanza di quì alle Stelle fisse; che detta base del Cilindro, a quello uguale, non debba averfi per una circonferenza, ma solamente per un punto, e per un centro.

Questa circonferenza, qual non è altro, che un punto ad un Diametro doppio della distanza dalla Terra al Sole, cioè ad un Diametro di 66. milioni di leghe; per qualunque idea, che si abbia

bia.

? *Ved. le Mensur. pag. 234.*

bia dell' Immensità di questi spazj, pare, che sia sempre una violenta, e sforzata supposizione, col riputarla per nulla; ond' è, che sarebbe più vantaggioso al Sistema di Copernico, se tal circonferenza si rinvenisse per lo meno di qualche picciola ampiezza; e se si scovrisse qualche mutazione ne' Poli, quale non potrebbe certamente ad altri rifonderli, che al movimento dell' Asse della Terra; sarebbe ancora una dimostrazione della verità di tal Sistema.

Il Signor *Flamsteed* insigne Astronomo Inglese avè osservato, che in diverse stagioni dell' Anno la distanza, che tra 'l Polo, e la Stella Polare si frapone, varia; & ha egli creduto, che tal variazione sia appunto quella, che il movimento della Terra deve produrre.

Il Figlio del Signor *Gassini*, che ha disaminato i Scritti del sudetto Signor *Flamsteed* v'è di accordo sù le di lui osservazioni, quali confrontano ancora colle già fatte nell' Accademia; niega però la conseguenza, e sostiene, che le variazioni delle distanze della Stella Polare, e del Polo, non sono tali, quali dovrebbero essere, supposto il moto della Terra. I di lui ragionamenti sono molto Geometrici, e troppo Astronomici; E perciò ci negano l'entrare in essi.

Qual dunque sarà la cagione di tali variazioni, che son pur certe?

Le Stelle fisse potrebbero girare su 'l loro centro, come il Sole, una di esse, gira intorno al suo, & alcune possono avere degli Emisferi inegualmente luminosi; quando esso rivolgono verso noi l' Emisfero più rilucente, appajono più grandi, & in conseguenza più prossime alle loro convicine; inoltre non è ben sicuro, che le Stel-

le fisse sian perfettamente fisse: E come potrebbero non essere fluttuanti in questo gran liquido, che le contiene, e che ita in un continuo moto?

S O P R A D E' P A R E L J .

A 12. di Maggio verso le 9., o 10. del mattino, il Cielo in vaga veduta rappresentò a que' di Marsiglia un circolo bianco, e vivamente distinto di gradi 69. di Diametro, quale passava per lo centro del Sole, distendevasi sopra a nugole, & a' vapori, parallelo all'orizzonte, che avea il suo centro in una linea perpendicolare tirata dal Zenit: Un altro circolo di circa 22. gradi di semidiametro coronava il Sole, & avea l'istesso centro: Ne' due punti, dove questa Corona, e' l Circolo orizzontale si fecavano, il Signor *Chazel* vidde due, benché deboli parelj, e' l *P. Fusillee*, che nella stessa Città osservava; ne ravvisò ancora alcun altro mal formato al di là dell' intersezione, e questo in varie volte. Il Fenomeno non durò in tutto più di due ore, e mezza.


Essendo stata comunicata dal *P. Fusillee*, e dal Signor *Chazel* al Signor *Cassini* questa osservazione, questi la ritrovò perfettamente conforme all' Ipotesi del Signor *Mariotte* nel di lui Trattato de' Colori; ond' è, che sarebbe quì inutile il ripeterlo. In generale basta quì dire, che sian queste un infinità di picciole particelle di ghiaccio fluttuanti nell'aere, che cagionano tali apparenze: Moltiplicano esse il Sole, o infrangendo suoi raggi, e facendolo apparire, dove egli non è; o riflettendoli, come se fossero specchi. Le note leggi delle riflessioni, e re-

ffor.

G

ssa.

frazioni an dato luogo alla Geometria in tal Fenomeno ; il Signor *Mariotte* con calcoli geometrici ha determinato la figura precisa di dette particelle di ghiaccio , e la situazione di esse nell' aere , l'ampiezza delle corone, o de' circoli, che accompagnano i Parelj, & in fine i colori, de' quali talvolta son tinti ; Non è picciola gloria dell' arte, quale ha diffinite tutte queste misure, che la natura le renda sempre tali, qual ella le ha stabilite, sicche sembri di ubidirle in certo modo.



GEOGRAFIA.

Pur troppo e' si sà, che bisogna ricercar nel Cielo le misure della Terra, e che la Geografia dipenda dalle osservazioni Astronomiche. I PP. Gesuiti ne an fatte moltissime in differenti Climì, ne' quali, per la propagazion della Fede, si son essi diffusi, e dove sovente le Matematiche rendono più facile l'adito al Cristianesimo. Il P. *Gouye*, avendo raccolte queste osservazioni, ne ha formato tutti i calcoli, e quindi dedotte le posizioni di molte Città. Ha egli scelte le operazioni meno dubbiose, & ha pur tenuto mira all'errore, che ne' strumenti ha potuto sospettare; e nelle maggiori differenze, che risultavano da varie osservazioni fatte per lo stesso fine, si è servito de' numeri mezzani.

Qui non si porrano le osservazioni de' PP. Gesuiti, nè i calcoli del P. *Gouye*; ma solamente i risultati da essi.

Le longitudini sono state prese sopra l'immer-

sio:

sione, & emersione de' Satelliti di Giove, quali il P. Gouye ha ridotte al Meridiano di Parigi secondo le Tavole del Signor Cassini, e le piu recenti osservazioni, che egli ha ritrovate fatte nell' Accademia.

P O S I Z I O N I

DI ALCUNE CITTA DELLA CHINA.

Pekin.

Latitudine Setten. dalla Casa de' Gesuiti.

39°. 54'.

Longitudine

136. 46. 30.

Bisogna avvertire, che quì si suppone, e che in appresso sempre si supponerà, che la longitudine di Parigi sia di

22°. 3'.

Ning-po, ovvero Liampo
nella Provincia di *Cbekiam*.

Lat. Sett.

29°. 56.

Long.

141. 18.

Il Capo di *Ning-po* è cinque leghe più Orientale di *Ning-po*, quali portano quasi che 15. gradi di longitudine.

Capo Verde è più Occidentale di Parigi

109. 30.

La differenza fra la longitudine di *Capo Verde*, e *Ning-po*, è di

138°. 33'.

Il P. Coronelli però nel suo gran Globo a met-

te

163°. 30.

Kiam Cheu.

Città del primo ordine della Provincia di *Xenfi*.

Lat. Sett.

35°. 37'.

Long.

131. 39. 15.

100 *Istoria dell' Accademia Reale*
Nan Kim.

Lat. Sett. 32°. 4.
Long. 139°.

Kambay.

Città del Terzo Ordine su la costa Orientale della China, e sopra un gran Fiume detto *Hoampou* quattro picciole leghe dal Mare.

Lat. Sett. 31°. 16'.

L'osservazioni, donde si è ricavata questa latitudine, non sono intieramente sicure, potendovi essere due minuti di svaro.

Longit. 141. 41. 45.

Si ngban-fu.

Capitale della Provincia di *Xenfi.*

Latit. Set. 34. 16. 45.

Long. 139. 6. 45.

Nan-cham-fu.

Capitale della Provincia di *Kiamfi.*

Latit. 38°. 40.

Kam chen-fu de Kiamfi.

Latit. 28. 49. 54.

Nan-ghan-fu de Kiamfi.

Latit. 25. 27. 31.

Xoachen.

Latit. 24. 44. 10.

Ella è dubbiosa:

Canton.

Latit. 23. 7. 46.

Long. 133. 13. 15.

Quantunque la latitudine sia differente da tutte quelle, che finora si sono avute di questa Città; può egli però averli maggior fidanza a questa, come quella, che è tirata dalle osservazioni più esatte, e più copiose.

Nella Provincia di Nankim.

Latit. 31. 17. 50.

Long. 140. 16. 15.

Le osservazioni, donde il P. Gouye ha didotte queste latitudini, e longitudini, quali serviranno a regular le Carte della China, si devono a i PP. Fontanay, le Comte, Bouvet, Gerbillon, e Visselom.

L'Accademia ricevè ancora nel Mese di Giugno lettere del P. Fontanay agli 8. di Novembre 1697, scritte da Tchautcheon Città del primo ordine della Provincia di Canton: Rendeva in esse conto alla Compagnia di un'osservazione, che egli avea fatta di Mercurio nel Sole in Tchautcheon a 3. di Novembre 1697; quantunque egli stesso non la credesse interamente esatta; Il P. Gouye ne fé i calcoli per compararla con l'osservazione di Parigi, donde ricavò, che l'uscita totale di Mercurio fuor dell'orbita del Sole, quale fù veduta a Tchautcheon a 3^h. 48'. 44". dopo mezzo giorno, fu veduta a Parigi ad 8^h. 10'. 24". del mattino; sicche la differenza delle Meridiane di Tchautcheon, e di Parigi, è di 7^h. 28'. 20". quali ridotti in gradi, & aggiunti alla longitudine di Parigi, fanno la longitudine di Tchautcheon 137. 5. 30".

Il P. Fontanay da un'altra parte giudica per saggio fatto, che Tchautcheon sia più Orientale di Canton in 3^o. 30.

Donde risultarebbe la longitudine di Canton 133. 35. 30.

Per mezzo de' Satelliti fu la stessa ritrovata 133. 13. 15.

Sicche e' si vede una molto grande conformità per una distanza così sterminata fra operazioni così dillicate.

P O S I Z I O N I

DI ALCUNE CITTA DI TURCHIA, E DI
ARMENIA.*Smyrne.*

Latitudine	38. 12. 30.
------------	-------------

Coronelli la mette di	39. 15.
-----------------------	---------

Trebisonde.

Latitudine	41. 3. 54.
------------	------------

Niccioli la mette di	43. 11.
----------------------	---------

Longitudine	65. 0. 45.
-------------	------------

Coronelli la mette di	71. 30.
-----------------------	---------

Erzeron.

Latitudine	39. 56. 35.
------------	-------------

Longitudine	68. 45. 45.
-------------	-------------

Eruan.

Latitudine	40. 19. 33.
------------	-------------

Il P. *Gouye* ha didotte queste conclusioni dalle
Osservazioni del P. *Bess*.

Il Sig. *Hayer*, che aveva fatto molti lunghi viaggi, e gran numero di Osservazioni per ridurre a perfezione la Geografia, essendo stato inviato dal Rè su l'istesso disegno in *Canada*, ne ha riportata una Carta Marittima secondo la sua diligenza, la qua e comprende il corso del Fiume *S. Laurent* dalla dilui imboccatura infino al Lago *Ontario*. Richiese il Rè del Privilegio per la pubblicazione di questa Carta, e S. M. onorò l'Accademia col dargliela ad esaminare: L'Accademia la stimò molto esatta, e di un sommo utile per la Navigazione di detto Fiume *S. Laurent*.



OTTICA.

S O P R A

LA MOLTIPLICAZIONE DELLE IMMAGINI

NE' VETRI PIANI.

Tutti avranno avvertiti, che nelle vicinanze di uno Specchio, se per una linea molto obliqua alla superficie dello stesso vi si guardi l'immagine di una Candela, che li sia pur così da vicino, si veggia questa più volte moltiplicata; e che si face diverse Immagini, quali alle volte giungono a quattro, o cinque, vadano di passo in passo dopo la prima, e la principale ismorrendo. Se non fossero più di due, non incontrerebbesi difficoltà nell'affare. Ben e' si comprende, che facendosi due differenti riflessioni, una su la prima superficie dello Specchio, e l'altra su lo stagno applicato dietro al Cristallo, debban prodursi due differenti Immagini; poche di tutti i raggi, che cadono su la prima superficie dello Specchio, la minor parte di essi riflette, gli altri si frangono, penetrando la massa del Cristallo, sino a rincontrar lo stagno, che l'è di argente, donde riflettono, & escono fuori del Vetro, per una seconda refrazione; quali ultimi

G 4

ragg.

* Vedi la Mem. p. 105.

P O S I Z I O N I

DI ALCUNE CITTA DI TURCHIA, E DI ARMENIA.

<i>Smyrne.</i>	
Latitudine	38. 12. 30.
Coronelli la mette di	39. 15.
<i>Trebisonde.</i>	
Latitudine	41. 3. 54.
Riccioli la mette di	42. 11.
Longitudine	65. 0. 45.
Coronelli la mette di	71. 30.
<i>Erzeron.</i>	
Latitudine	39. 56. 35.
Longitudine	68. 45. 45.
<i>Ernan.</i>	
Latitudine	40. 19. 33.

Il P. Gouye ha didotte queste conclusioni dalle Osservazioni del P. Besse.

Il Sig. Hayes, che aveva fatto molti lunghi viaggi, e gran numero di Osservazioni per ridurre a perfezione la Geografia, essendo stato inviato dal Rè su l'istesso disegno in *Canada*, ne ha riportata una Carta Marittima secondo la sua diligenza, la qua e comprende il corso del Fiume S. *Laurent* dalla dilui imboccatura infino al Lago *Ontario*. Richiese il Rè del Privilegio per la pubblicazione di questa Carta, e S. M. onorò l'Accademia col dargliela ad esaminare: L'Accademia la stimò molto esatta, e di un sommo utile per la Navigazione di detto Fiume S. *Laurent*.



OTTICA.

S O P R A

LA MOLTIPLICAZIONE DELLE IMMAGINI

NE' VETRI PIANI.

Tutti avranno avvertiti, che nelle vicinanze di uno Specchio, se per una linea molto obliqua alla superficie dello stesso vi si guardi l'immagine di una Candela, che li sia pur così da vicino, si veggia questa più volte moltiplicata; e che si face diverse Immagini, quali alle volte giungono a quattro, o cinque, vadano di passo in passo dopo la prima, e la principale ismorrendo. Se non fossero più di due, non incontrerebbesi difficoltà nell'affare. Ben e' si comprende, che facendosi due differenti riflessioni, una su la prima superficie dello Specchio, e l'altra su lo stagno applicato dietro al Cristallo, debban prodursi due differenti Immagini; poche di tutti i raggi, che cadono su la prima superficie dello Specchio, la minor parte di essi riflette, gli altri si frangono, penetrando la massa del Cristallo, sino a rincontrar lo stagno, che l'è di argente, donde riflettono, & escono fuori del Vetro, per una seconda refrazione; quali ultimi

G 4

ragg.

* Vedi la Memor. p. 109.

raggi essendo in maggior numero, l'Immagine che producono è più viva.

Ma secondo questo spiegamento, non si anno più di due Immagini, quando ne appajono di vaitaggio. Non dispari è questo altro Fenomeno: se nell' oscuro si veda un' oggetto luminoso, come candela, o altro, per traverso di un Vetro piano, e pulito, apparirà egli multiplicato più volte, e o Immagini, che scemano di vivezza per gradi, separate per uguali intervalli, e tutto altrettanto migliore, e con maggior distinzione, quanto a linea, che vien dall' oggetto all' occhio, caderà più obliqua su'l vetro.

Il Sig. *de la Hire* adopera, per ispiegare quest' ultimo Fenomeno, al quale facilmente si riduce il primo, i principj più semplici dell' Ottica.

Un punto luminoso è la sommità di un Cono de' raggi, base del quale è la Pupilla, e questi raggi riuniti dalla refrazione nell' occhio, vanno a pignere la retina in un solo punto, e vi delineano un' unica Immagine del punto luminoso.

Questa Immagine non puol'esser giammai doppia, se non se allora quando per qualunque cagione un secondo Cono de' raggi dallo stesso punto luminoso vegnente, su la Pupilla penetri, e trapassi il primo Cono, e riunisca i suoi raggi in un' altro punto della retina: Egli è chiaro, che allora gli Assi di questi due Coni si seghino. Per non farla più lunga, in appresso parleremo sempre di questi Assi, & in dicendo, differenti raggi, non intendremo per altri, se non se per detti Assi. Diconsi divergenti due raggi, che vengono da un' istesso punto luminoso, e vanno infino all' occhio, dilungandosi sempre l' un dall' altro: Ma poichè la pupilla, base del Cono luminoso, è molto picciola; for-

formerebbero essi un'angolo molto acuto; quando che l'obietto fusse in distanza di tre piedi; onde è, che per essere cotanto acuto, può riputarsi non già angolo, ma assumerli essi due raggi come paralleli.

Così tutti detti raggi, quali da un'istesso punto vanno alla pupilla, vi giungono o Paraleli, o divergenti; e per conseguenza e' bisogna, che straniera cagione, o corpo diafano fraposto li abbia disposti, e fatti convergenti, affine che possano essi tagliarsi, locche assolutamente è necessario per formare molte immagini di un'istesso obietto.

Un raggio, che ha trapassato la prima superficie di un Vetro piano, può su la seconda rifletterfi, e ritornar verso la prima, dove può di nuovo rifletterfi; e rientrare su la seconda, e così saltellare nella densità del Vetro, riflettendosi in essa a sua posta tante volte, quante piacerà supporli; E' però in ciascheduna riflessione sempre più insievolirà, come li avvisa.

Un Vetro, in cui le due superficie saranno perfettamente parallele, non altererà il parallelismo de' due raggi venuti da un'istesso punto per molte riflessioni, che detti raggi abbian sofferti in trapassar detto Vetro, tra la refrazion dello entrare, e quella dell'uscire. Bisogna dunque, perche tal Vetro possa multiplicar gli oggetti, che riceva da un'istesso punto due raggi non paralleli; & allora avverrà, che uno di essi, dopo di alcune riflessioni nella densità del Vetro, uscito fuori rincontrerà, e segnerà l'altro su la Pupilla. Egli è chiaro, che l'obietto debba esser vicinissimo, affine che dallo stesso punto possa mandar due raggi non paralleli.

Ma se le due superficie del Vetro non saranno esattamente parallele in quel verso, dove i raggi,
che

che vengono agli occhi, lo penetrano; guasteranno esse il parallelismo de' raggi, quali in tal direzione avran rincontrati, cioè, nel venir da un'oggetto poco discosto; allora un raggio, che avrà trapassato il Vetro senza rifletterli, sarà segato su la pupilla da un'altro raggio dell'istesso punto, che due volte si farà riflettuto nel Vetro; o da un'altro, che ivi avrà fatto quattro riflessioni: Quanti differenti raggi dell'istesso punto s'incontrino in tal maniera nella pupilla, altrettante immagini di tal punto formeranno: e senza molta pena comprendesi, che queste Immagini debbano perdere di punto in punto la lor vivezza; poichè la prima è formata da un raggio, che non ha sofferta riflessione alcuna, e le altre vengon fatte da raggi, che più, o meno ne an sofferte.

Quindi ancora è, che per tal moltiplicazione l'oggetto debba esser luminoso, e nell'oscuro; altrimenti le seconde immagini sarebbero troppo smorte, e da altri oggetti, che li sono intorno, sfigurate.

Quanto più il sito del Vetro è obliquo alla linea, che dall'occhio vâ all'oggetto, ovvero all'Immagini, tanto più queste sono dilungate una dalle altre, e ben distinte: una situazione dunque meno obliqua le avvicina, & in fine le confonde. Senza Geometria non potrebbesi intenderne la cagione, & entrare in altre particolarità di questo Fenomeno.

Può ben dedursi, che que' Cristalli, la di cui massa sembra molto uguale, se moltiplicano essi gli oggetti, non abbiano le superficie in tutto esattamente parallele, ma ondiate, e piene di grinze; Sicchè un difetto di parallelismo insensibile, divien sensibile, per così dire, da' raggi della luce.

Il Sig. *de la Hire* per mezzo di tale speculazione piugne ad un sicuro modo di riconoscere le picciole ineguaglianze nella grossezza di un Vetro, & a ditterminarle in qual verso, o lato siano: E poichè la difficoltà di ben logare a centro i Vetri de' Cannocchiali consiste, nel saper ritrovare la più grande doppiezza di essi, per situarli precisamente nel centro della figura, quando son lavorati; deduso quindi da principi, che ha stabiliti, un metodo facile per tal'operazione. Ecco come spesso ne conduce ad utilissime pratiche quello che su le prime sembra una semplice Teorica.



DIOTTICA.

EFFETTI DE' VETRI

ARDENTI.

* Il Sig. *Tschirnhaus* ha lavorato Vetri da bruciare, che negli effetti an superati quanti mai finora sianfi veduti. Ecco quel che egli ce ne ha comunicato.

1. Bisogna allogare il Vetro *a*, *b*, in maniera che i raggi del Sole li piombino su, e questo si conoscerà, quando il fuoco, o l'immagine del sole *E* apparirà perfettamente rotonda su la Tavola *c*, di qual

* *Fig. 3. Tav. 1.*

qual dovrà esser parallela al Vetro *a, b*; poicche se tal figura fusse ovale, bisognerà inchinare, e muover il Vetro sin'attanto, che giunga ad essere esattamente rotonda; & allora il legno si accenderà all'istante, fonderassi il piombo, e la pietra diverrà vetro, &c. e questo nella distanza di 12. piedi, essendo il fuoco di un dito, e mezzo di Diametro.

2. Per rendere questo fuoco più vivo, bisogna restringerlo con la giunta di una seconda lente, che deve essere allogata in *f, g*, parallela al primo Vetro *a, b*; & allora il fuoco, che era in *E*, farà in *H*; e come prima avea un dito, e mezzo di diametro; ora lo farà di otto linee; ma la sua forza sarà a dismisura accresciuta, sicche la materia, che affatto non era per fonderfi in *E*, la si fonderà in un momento in *H*.

3. Questo Vetro deve essere rilevato sopra di un Piede simile a quello, che sostiene lo Specchio ardente grande nell'Accademia; e finche si possa volgere per tutti i versi, e mettere in sito acconcio, a ricevere sempre appiombo sopra di esso i raggi del Sole, quali sono più vigorosi così nel Verno, come nella State da dopo le nove ore del mattino insino alle tre della sera: Devesi parimente avvertire, che nel Verno bisogna esporre minor materia, che nella State, essendo gli effetti più lenti in detto tempo. Gli effetti poi sono.

1. Ogni sorta di legno, per molto duro, o verde, che sia, ancorche bagnato con acqua, in un momento si accenderà.

2. L'acqua in un picciol vaso bolirà in un momento.

3. Pezzetti di metallo di una proporzionata grossezza fonderansi, non già in un momento, ma subito che il pezzo intiero del metallo sarà in
cer-

certo grado riscaldato: Per cagion di esempio, un pezzo di piombo, se sia molto grosso, non fonderassi affatto; ma essendo di proporziata grossezza, converrà tenerlo per un poco nel fuoco, poichè quando comincerà a fonderli in una parte, continuerà tutto il rimanente a sciogliersi: Il ferro deve essere in laminette sottilissime; & allora all'istante diverrà rosso, & indi si fonderà.

4. Le Tegole, la pietra di Genova, o Ardosia, la Pomice, la Faenza, il Talco, &c. di qualunque grossezza siano, in un momento arrossano, e divengono Vetro.

5. Il Solfo, la Pece, e tutte le Resine, sotto acqua poste, si liquefanno.

6. Quando nella State sotto l'acqua si ponga un legno tenerissimo, come quello del Pino, al di fuori non pare alterato; ma in fendendosi per mezzo, si ritrova nel di dentro carbone.

7. Se si faccia una buca nel Carbone di legno duro, & in detta buccia s'immetta la materia, che vuol'esporsi al Sole, l'effetto sarà infinitamente più violento.

8. Ogni qualunque metallo posto in detta buccia, fonderli in un momento, il ferro sfavilla, come nelle Fucine; e se vi si trattengano i metalli per qualche tempo fusi, intieri se ne volan via: Locchè particolarmente avviene del piombo, e dello stagno con maggior prontezza.

9. Le ceneri del legno, dell'erbe, della Carta, della Tela, &c. in un momento diventano un bel trasparente Vetro.

10. Se alcune cose non si fondessero in pezzetti, bisognerà ridurle in polvere; e se ne anche in polvere si sciogliessero, converrà aggiugnervi qualche Sale, e liquefaransi uniti.

11. Le materie negre sono le più presto alterate da questo fuoco, le quali dopo di esser fuse rimangono pur nere: le bianche allo 'ncontro sono le più difficili, e fuse divengono nere; ma molto più quelle che son nere, & imbiancano nel fonderfi; & in fine superano tutte le materie bianche, le quali fuse rimangono ancor bianche, come la selce, la creta di Inghilterra, la calcina, &c.

12. Tutti i metalli si convertono in Vetro, se sopra di una piastrina di porcellana ben doppia da non poterfi ella pur fondere, si espongano al fuoco, il quale deve darseli per gradi, affincbe ella non iscoppi.

L'Oro si tinge in un bel color di porpora nel divenir vetro.

13. Se si mettano in un Recipiente grande *a, b, c*, in *c*, materie facili a fonderfi, come sono Erbe, Solfo, Antimonio, Zingo, Bismuto, &c. in applicandovi un sol Vetro, si osserveranno curiosissimi effetti nel Recipiente. Bisogna però avvertire, che la parte di esso *a, b*, per dove i raggi del Sole dovranno passare, non sia così da vicino al fuoco *c*, che il calore faccia rompere il Recipiente.

14. Il Salnitro in una convenevole quantità divien volatile intieramente, e si scioglie in fumo, sicche potrebbesi prontamente far lo Spirito di Nitro in un gran Recipiente.

15. Per fondere in un tratto la maggior quantità di materie, che si potrà, bisogna metterne poca alle prime; e quando questa sarà fusa, aggiugnervi un'altra porzione, e così proseguire: Nella qual maniera quattro oncie d'argento in una volta potran tenerfi fuse.

16. Una materia salda, che facilmente si fonda, potrà servire per altra, che si solve difficilmente.

mente, esponendole insieme al fuoco, quantunque la porzion di quella, che facilmente si scioglie, fusse pochissima.

17. E' da avvertirsi ancora, che due materie, difficili per altro a separatamente fonderli, se siano esposte insieme in una certa quantità, prontissimamente si solvono, come la selce, e la creta d'Inghilterra.

18. Un poco di Rame rosso nel cennato modo fuso, se tosto si butti nell'acqua fredda, produce uno scoppio ivi così violento, che i più fortificati si rompono; e 'l rame sen vola diviso in parti cotanto minute, che non può rinvenirli picciolo granello di esso; Degli altri Metalli non avviene lo stesso.

19. Svaporando i metalli, nel fonderli uno più presto dell'altro, potrebbero purificarsi vicendevolmente: per cagion di esempio, l'argento può depurarsi col piombo ugualmente, che nella coppella ordinaria.

20. In tal guisa potranno ancora farsi tutte sorta di Vetri colorati.

21. In questo fuoco perdono il proprio colore tutti corpi, fuorchè i metalli, e le pietre preziose ne sono prontamente spogliate; sicchè un rubino Orientale fa intiera perdita del suo.

22. Alcuni Corpi divengono all'istante Vetro, e trasparenti, come il Cristallo; raffreddandosi si tingono a color di latte, e perdono la trasparenza.

23. Vi sono allo incontro altri corpi, che fusi, sono Opachi, & in raffreddandosi vagamente traspariscono.

24. Et altre materie sono trasparenti, così fuse, come raffreddate, ma qualche giorno dopo divengono opache.

25. Al-

25. Alcune materie, che dal fuoco riducansi in vetro, che alle prime traspare, e di poi diviene opaco; essendo fuso con altre materie sempre opache, produrranno un bel vetro, che trasparirà sempre.

26. I Corpi, che si mutano in vetro diafano, saran più diafani, e belli, se per qualche tempo si lasceranno nel fuoco.

27. Alcune materie si mutano in Vetro così duro, che tagliate a faccette, segano il vetro ordinario.

28. Quando il Piombo, e lo Stagno si fondono uniti sopra di una piastra doppia di rame, producono molto più di fumo, che essendo un de' due soli su la piastrina, e rimangono sempre le scorie invetriate; poicche non intieramente sen vanno in fumo.

29. I raggi della Luna possono per mezzo di detto Specchio concentrarli; ma essi non producono sensibil calore, quantunque facciano un gran chiarore.

30. In fine con detto Vetro possono farsi delle rappresentazioni ottiche curiose, migliori di quelle, che con gli Specchi concavi si formano, come ancora Cannocchiali, e Microscopj senza paragone più esatti di quanti finora su di tal genere sian veduti.





MECANICA.

PER LA FABRICA DE' VASCELLI.

• **U**N Corpo, che si muove in un liquido immobile, è costretto a separarne le parti, quali pur resistono nel dividerfi. Se non si ha riguardo ad una sorte di viscosità, che quelle ha, varia sempre in differenti liquidi, tutta la forza di tal resistenza dipenderà da quella dell'urto; poichè un corpo spinto, nello stesso tempo respigne. Devesi dunque all'urto perpendicolare, fra tutti il più forte, la resistenza maggiore de' liquidi; ond'è, che bisogna, che 'l corpo, qual per esso deve muoversi, sia di figura, da poter ricever le pinte più obliquamente, che sia possibile. Se fusse triangolare, e che per la sua punta progredisse, è vero, che tutte le sue parti obliquamente ferirebbero il fluido; ma pur tutte l'urtarebbero con la stessa obliquità; quando sarebbe più vantaggioso, che ciascheduna l'urtasse con maggior obliquità della vicina. Egli è certo, che questo accrescimento perpetuo di obliquità non possa rinvenirsi, se non se nelle curve, nelle quali ogni punto è considerato come una linea retta infinitamente picciola, sempre inchinata alle altre picciole rette vicine.

Ma qual mai è questa curva, che per la perpetua mutazione d'obliquità, o d'inchinamento in tutte le sue parti, si renda più propria di tutte le altre a dividere facilmente un liquido?

Istor.

H

Ecco

• Vedi le Memor. p. 141.

Ecco un di que' Problemi, la difficoltà del quale sentono i soli più elevati Geometri, da sciogliersi con la novella Geometria, maneggiata pur essa con infinita destrezza. Il Sig. Marchese dell' *Hopital* l'ha sciolto, e 'l Sig. *Newton* prima di lui, sebbene non ne avesse pubblicata l'Analisi; ne ha però fatto vedere, per così dire, una mostra per una proprietà della sua Curva dichiarata, e dal suddetto Sig. Marchese dell' *Hopital* rincontrata nella sua, quale in conseguenza deve essere la stessa. Il Sig. *Fazio* ha pur egli sciolto questo Problema con una molto lunga, e molto difficile circuizione; sicché all'uno, & all'altro, cioè al Sig. *Fazio*, e Sig. Marchese è costato un'infinito sforzo di mente questo affare; all'uno per ridurlo a fine, dopo un lungo giro, & all'altro per ritrovar le più brevi maniere, & agevoli a solverlo.

Pone egli prima due linee rette infinitamente picciole, e differentemente inchinate, quali diverranno appresso due punti della Curva, che cerca; scopre indi da principj di Mekanica qual debba essere lo sforzo del liquido sopra di dette due linee, rispetto alla differente loro inclinazione: Sprime egli questo sforzo in termini Algebristri; e supposto con l'Algebra, che e' sia il più picciolo di quel che mai possa farsi, diduce quindi una equazione, in cui si comprendono le condizioni essenziali della curva, senza bisognarvi altro, che sviluppare, o seguire detta prima equazione, per tener tutto ciò, che si era proposto.

Egli è certo, che corrispondendo tutte altre cose a dovere, un Vascello da vela nommai sarà il migliore, che allora quando per la sua figura avrà la maggior agevolezza a fendere le acque; né tal figura precisa altronde farebbesi tenuta, se non se dalla

dalla Geometria sublime, e sottile; quale frattanto riputasi inutile per cagion di sua sottigliezza, & elevazione.

E S A M E

DELLA FORZA DELL' UOMO,

Per portare, o per tirare.

LA forza dell'Uomo, e di ogn'altro Animale, che a muover pesi vien impiegata, dipende da muscoli, che nell'azione si adoprano, e dalla positura del Corpo.

La sperienza sola può dimostrarne la forza di tutti i differenti muscoli: Così perche un'Uomo, quale stà ginocchioni, può rilevarsi, appoggiandosi solamente su la punta de' piedi, e che i soli muscoli delle Gambe, e delle Coscie allora levin su tutto 'l suo Corpo, il di cui peso può supporfi esser di 140. libre; il Sig. *de la Hire* conchiude, che questi muscoli anno la forza di 140. libre.

L'istesso Uomo, tenendo le gambe piegate un poco, può raddrizzarsi, benchè caricato di un peso di 150. libre; allora i muscoli delle gambe, e delle coscie rilevano insieme il peso del Corpo, quale è di 140. libre, e la soma di 100., che è quanto dire 290. libre: ma l'elevamento non è, che di due, o di tre dita.

Il Sig. *de la Hire* disamina ancora qual sia la forza de' muscoli de' lombi, quella delle braccia,

H 2

e del.

• Vedi le *Memor.* p. 195.

e delle spalle, considerandoli in una azione molto semplice; e ritrova, che la forza de' primi sia di 170; e quella de' secondi di 160. libbre.

Stabilita la forza assoluta di varj muscoli in queste forti di movimenti, rimane a vederne l'applicazione nelle azioni, ove la Mekanica fa la sua parte, cioè dove si forma una leva, & ove le forze crescono, o diminuiscono, perche anno maggiore, o minor velocità rispetto a quella del peso, che esse alzano.

Per cagion d'esempio, nell'azion del camminare, il peso, che bisogna elevare è il centro della gravità di tutto il corpo; e se l'Uomo è caricato, sarà il centro di gravità del corpo, e del peso uniti insieme, e la forza movente è la gamba di dietro. Spigne questa per davanti detto centro di gravità, e fa sì, che descriva un'Arco di circolo, quale ha il piede di avanti, allora immobile, per centro; & essa stessa ancora descrive un'arco di circolo di ugual distesa. Questo Arco è considerabilmente grande, riguardo alla poca altezza, che ha, cioè alla linea perpendicolare compresa fra l'Arco, e sua corda; in modo che la forza movente, o la gamba di dietro ha molto gran movimento, & una molta velocità rispetto al poco alzamento del peso; donde ricava un vantaggio, che può dirsi Mecanico, qual nasce dalla disposizione delle parti della machina.

I muscoli delle gambe, e delle coscie, che nell'azion del camminare si adoprano, avendo la forza di levar su all'altura di due, o tre dite 290. libbre, fan dedurre, che un'Uomo, quale pesa cento-quaranta libbre, possa camminare carico di 150. altre, pur che non islunghi di molto il passo, che è quanto dire, che non si alzi più di due, o tre dita:

Poicè

Poiche se egli si leva di vantaggio, allora tale altezza è molto grande rispetto all'Arco, che 'l peso descrive, e la forza movente perde il vantaggio Meccanico, che aveva sopra 'l peso. Nasce da questo, che un'Uomo valevole a portare 150. libbre, non potrà salire una scala, i di cui gradini saranno, come per ordinario sono, dell'altezza di cinque dita.

Da simili ragionamenti, ma più Geometrici, e di una più raffinata Meccanica pieni, conchiude il Sig. de la Hire, che tutta la forza di un'Uomo, che tira con direzione Orizzontale, in camminando, e tenendo il Corpo inchinato per d'avanti, si riduce a 27. libbre, locche è molto meno di quel che mai s'arebbe immaginato, che tal forza sarà più grande, se l'Uomo camminerà rinculcando, per qual ragione i Remiganti tirano d'avanti in dietro: E che se i Gondolieri di Vinegia spingono per d'avanti; lo facciano, perche stiman migliore il perdere il vantaggio delle forze, che urtare, col non vedere i luoghi, e le speffe rivolte de' Canali.

Per comune sperienza si sa, che un Cavallo orizzontalmente tiri altrettanto che sette Uomini, & in conseguenza la sua forza sarà di 189. libbre; e perche quell'effetto dipende in parte dal suo peso, e tirerà un poco più essendo caricato.

Il Cavallo, per la forza de' muscoli, e per la general disposizione di tutto'l corpo, vince di molto la forza dell'Uomo nello spignere in davanti, ma l'Uomo lo supera nel montar su, sicche al credere del Sig. de la Hire, tre Uomini carichi ciascheduno di 100. libbre di peso salirebbero un Monte alquanto erto più presto, e più facilmente di quel che farebbe un Cavallo carico di 300. libbre.

SOPRA LE CLESSIDRE.

PER fare un'Orologio ad acqua, o Clessidra, nel quale scolerà in dodeci ore, per cagion di esempio, l'acqua, bisogna conoscere fin dove nel vaso, abbassandosi, ella giunga nel finir di ciascun' ora con la sua superficie, & in tal maniera e' si saprà dividere per gradi la Clessidra.

L'acqua, che vien fuori dal vaso, ha una in eguale celerità, la quale dal principio dello scolo fino al fine sminu-sce sempre; e comunemente con *Galileo* si suppone, che manchi, secondo la proporzione da lui stabilita su l'accrescimento di velocità de' corpi, che cadono. Per graduar dunque una Clessidra di 12. ore, essendo ella da per tutto di uguale larghezza, non bisogna altro, che dividere l'altezza del Vase in 144. parti uguali, e di prenderne 27. di queste per la prima ora dello scolo, 21. per la seconda, 19. per la terza, & in fine 1. per la dodicesima, sempre secondo l'ordine naturale de' numeri impari.

Ma se la Clessidra non sia a forma di Cilintro, ma più larga sopra, che a basso; chiaro è, che farà quì necessario un'altro compartimento: Poicche, sebbene la velocità dell'acqua nell'uscire sia la stessa; essendo maggior quantità di acqua nell'alto del vaso, la superficie superiore perciò calerà meno di quello, che in tempi eguali si era abbassata nel Vase Cilintrico dell'istessa altezza, e dell'istessa capacità; & allo 'ncontro nel basso di detto Vaso la

super-

* Vedi la Mem. pag. 76.

superficie dell'acqua calerà molto più fra l'istesso termine di un'ora.

Se si supponesse un' altra proporzione da quella , che 'l *Galileo* ha stabilita su l'ineguaglianza delle velocità di detto scolo ; sarebbe tutto vario , e mutato.

Per graduar dunque la Cleffidra , ovvero per ritrovar , (che è lo stesso) i punti , dove la superficie dell'acqua giugnerà in continuamente descendendo in certi tempi ; bisogna conoscere la figura del vaso , e dterminare una proporzione per la velocità dell' acqua.

Il Signor *Varignon* rende questo Problema infinitamente generale con una formola geometrica , che e' dà : sicche stabilita a discrezione la figura del vaso , e la velocità dell' acqua ; necessariamente indi ne verrà la graduazione della Cleffidra .

Se poi sappiasi , come detta Cleffidra sia graduata , e qual sia la velocità dell' acqua , l'istessa formola reciprocamente darà la figura del vaso ; come ancora si conoscerà la velocità dell' acqua , quando sarà nota la figura del vaso , e la graduazione della Cleffidra.

L'Arte di simiglianti formole consiste nel prendere la cosa per suo' principj , e nella essenza propria , per cui sussiste sempre , qualunque mai siano le differenze , che possano altronde sopraggiungere . Inalzata una volta la quistione a suoi termini più universali , non bisogna poi altro , che dedurla ne' casi particolari . Si ritrova una equazione algebrica , che non contiene cosa dterminata , fuorchè una fissa , & invariabil ragione ; tutto 'l rimanente , che dipende dalla diversità infinita di svariate applicazioni , non vi è espresso ,

se non se indeterminatamente, alla quale può sostituirsi una tale espressione particolare, e determinata, che più pacerà.

Spesso que' Problemi, che molto anno affannati insigni Geometri, divengono brevi Cordlarj facilissimi di tali formole generali: Per cagion d'esempio, sù di questa materia, se si ricerchi la figura di un vaso, in cui, supposta la proporzione del *Galileo*, per la celerità dello scolo, la superficie dell' acqua discenda ugualmente in tempi uguali; la formola del Signor *Varignon* a primi veduta determina detta figura, non potuta rinvenire dal *Torricelli*, e ritrovata dal *Mariotte*, per metodo limitato a questo particolar caso.

M O D O

DI SERVIRSI DEL FUOCO

PER FAR MUOVERE LE MACHINE.

GLi antichi non facevano, nè avrebbero potuto fare ciocche noi oggi con infinita agevolezza facciamo col mezzo di varie sorti di Mulini, se non se a dura forza di braccia, come quelli, che non avevano la destrezza di adoperar l'acqua, e l'aere, in luogo degli Uomini, e de' Cavalli. Rimane a noi ancora a domare un Elemento, qual si è il fuoco, simile in certa parte a quegli *Indiani*, che *Spagnoli* non an potuto ancora ridurre a lavorare nelle loro miniere.

II

• Vedi le Mem. pag. 154.

Il Signor *Amonton* non dispera, che in fine non si possa tirare da lui altrettanto servizio di quel che dall' aere, e dall' acqua si riceve. Ha egli immaginato, per questo fare, una sorta di Mulino, di cui cercherem noi di darne qualche idea.

Il calore agita con infinito vigore, e prontezza l'aere: se questi abbia una intiera libertà distendersi, quello non fa altro, che rarefarlo, & accrescerne l'ampiezza; ma se possa infino a certo grado solamente dilatarsi; allora la forza della sua molla è altrettanto minore; Allo 'ncontro il freddo restringe l'aere, e scema detta sua molla.

L'aere, la di cui molla sia accresciuta dal calore, può sostenere, o innalzare un peso più grande di 28. dita di Mercurio, o di 32. piedi di acqua, che per ordinario sostiene.

Sù di tali principj, ecco a staglio qual sia la Machina, che fabbrica il Signor *Amonton*.

Una Ruota, il di cui asse è orizzontale, ha due ordini di Cellette concentriche di ugual numero. Le Celle dell' ordine esteriore, le quali sono molto più grandi, vengon ripiene di solo aere; ma quelle dell' interior ordine, che compiono per un lato un quarto di circolo sù la metà inferiore della ruota, son ripiene di acqua: e poicche il peso in questo lato è maggior, che nell' altro; la Ruota girerà fin tanto che la detta acqua sarà distribuita ugualmente per li due lati del Djámetro verticale: Per far sì, che la Ruota giri sempre, e' bisogna adoprarli in modo, che l'acqua, qual di sua natura v' a cadere, sostenuta da qualche forza, e rispinta in alto, occupi sempre l'istesso suo quarto di circolo; poicche il peso maggiore di questo lato darà sempre il crollo alla Ruota: & eccone la maniera: Passando le Cellette esteriori tutte, e ciascheduna in giro sopra

pra di un fuoco disposto ad uno de' lati della Ruota; l'aere di quella, che 'l tragitta, viene a rarefarsi, ma non già con intiera libertà; Egli per una doccia di comunicazione v' a presumere l'acqua contenuta nella Cella, che li corrisponde, e per l'accrescimento della sua molla fa rimontar questa in una Cella superiore a misura, che le stesse Celle discendono per quel verso col movimento della Ruota. Quella delle Celle esteriori, che è passata su'l fuoco, perche si rarefaceffe l'aere, che conteneva, e cresceffe la molla, con ordine passa per una conserva d'acqua, acciocche il suo aere, in raffreddandosi, ripigliasse la sua estenzion primiera, e si ritrovasse in istato di riprodurre lo stesso effetto, col ripassar di nuovo su'l fuoco. Rimane a saperli.

1. Quanto tempo una Celletta deve trattenerli su'l fuoco, perche bastantemente l'aere in lei racchiuso si rarefaccia; donde vien poi a determinarsi il tempo dell'intiera revoluzione della Ruota; giacche ogni Cella fra lo stesso spazio di tempo prenderà un bastante calore.

2. Se l'aere di questa Celletta riscaldata avrà tempo di ritornare nella sua primiera ampiezza, mentre il rimanente della Ruota girerà; e se l'acqua per cui dovrà ella passare bastantemente solleciterà un tal effetto.

3. Conosciuta la grandezza de' spazj, ne quali potrà l'aere distendersi, come si rarefarà egli meno di qualche avrebbe potuto rarefarsi, & in conseguenza qual accrescimento di molla li rimarrà, e qual altezza di acqua potrà sostenere, e levar su, oltre a 32. piedi, che naturalmente sostiene: Par che sia a proposito, che le Celle piene di acqua occupino un pressochè quarto della Ruota.

ta, locche porta una certa altura perpendicolare d'acqua; se questa altezza d'etermini a un da presso il diametro della Ruota.

Il Signor *Amontons* con varie sperienze ha regolate tutte queste cose, alcuna delle quali sono affatto nuove, e curiose; perlocche tutti l'anno assicurati dalla possibilità della sua Machina.

Ha egli, per cagion di esemplo, scoperto, che il calor dell' acqua bogliente accresca l'ampiezza dell' aere, o la forza della sua molla nella terza parte, o poco più di quello, che ordinariamente tien egli sù la superficie della Terra; e che l'acqua, quale comincia a svaporare, sia quella, che raffreddi, e restringa più l'aere.

Per far indi giudizio dell' effetto di questa Machina, e della forza resistente, che potrà superare; bisogna d'eterminare la quantità, o 'l peso dell'acqua, che si porrà nelle Celle, quale darà il crollo alla Ruota; e di poi aver mira al tempo, che impiegherà questa a fare un giro, e la direzion obliqua del peso dell'acqua, riguardo al circolo meno vantaggiosa della forza resistente, che opra- rà perpendicolarmente. Avendo calcolato tutto ritrova il Signor *Amontons*, che la Machina per lo meno si uguaglia negli effetti alla forza di 39. Cavalli, e che siccome un Cavallo per tutto l'Anno, impiegato per lavorj ne' giorni leciti dà 40. soldi in ciascun giorno di guadagno; l'utile di questa machina sarà altrettanto maggiore; quanto che la spesa delle legna da bruciarli fra lo spazio di 24. ore, sarà minore di 78. lire; tanto più che l'istesso fuoco può servire ancora per altre opere, & a piacere possiam della di lui forza valerci, o nò, come quella che non è soggetta a tempi, & a luoghi.

SU 'L FREGAMENTO

DELLE MACHINE.

NEl discorso, che il Signor *Amontons* fece su 'l suo Mulino a fuoco, si avanzò di passaggio a dire, che fusse errore il credere, come pur comunemente fassi, che lo sfregamento di due corpi, quali si muovono l'un contro l'altro, adattandosi, sia proporzionale alla superficie de' corpi stessi, che si fregano; poicche e' per esperienza avea conosciuto, che lo sfregamento fusse maggiore, quanto più i corpi l'un contro l'altro si premessero, caricati di un peso maggiore.

Questa novità sorprese l' Accademia, sicche il Signor *de la Hire* volle con le sperienze ricredersi. Pose egli sopra di una Tavola di legno rozzo molti pezzi di legno nè pur essi asciati, di varia grandezza, carichi ugualmente di un ugual peso; e vide, che, per farli sdruciolare sù per detta Tavola, avendo loro attaccato un peso, qual passava, per una picciola carrucola, e' bisognava a tutti i detti pezzi un istesso peso, quantunque le superficie, che fregavansi, fossero ineguali. Avvenne lo stesso ne' pezzi di marmo rozzi, e non puliti, che sdruciolavano sopra una simigliante Tavola, che aveva la stessa ruvida superficie. A questi fatti ben avverati il Signor *de la Hire* aggiunse ragionamento Fisico.

Le resistenze, che sperimentano l' un l' altro due corpi, quali scambievolmente si fregghino, nascono dalle parti, che rendono ispida la loro
su-

superficie , le quali se sono arrendevoli , convien, che si pieghino , & inchininino ; e se son dure bisogna che si scommettano , e disbrighino l' una dal dentro dell' altra .

Nel primo caso , tutta la difficoltà del movimento si riduce ad incurvar le molli , o che uno stesso peso venga sostenuto da una sola molla , o da due tra di loro uguali , sarà la stessa cosa ; poichè se egli ne ha a superar due , incurverà ciascheduna un poco meno ; e se una , l'incurverà un poco di più . Supposto perciò , che nelle parti uguali della superficie di un corpo vi sia ugual numero di queste parti arrendevoli a molla , un' altra superficie , che le scorrerà per di sopra , il di cui peso farà sempre lo stesso , non sperimenterà se non la stessa resistenza ; poichè se egli ha da piegare un numero maggiore di molle , così le piegherà meno ; ma se fusse il di lui peso più grande , dovrebbe piegarle molto più , & incontrerebbe perciò maggior difficoltà .

Nel secondo caso , ove trattasi di scommettere parti dure , l'une intrigate nell'altre , se dette parti sian tali , che non possano sgrettolarsi , nè essere smuffate ; egli è chiaro , che per disbrigare le due superficie , bisogna innalzar una , alla qual azione , non già l'ampiezza della superficie , ma il solo peso contrasta ,

Ma se queste parti dure possano smuffarsi , e sgrettolarsi , in ilcorrendo l' una sù l' a' tra ; allora il numero di esse produce la difficoltà ; supponendosi perciò maggiore in una più grande superficie ; i fregamenti saran proporzionali a quest' istessa .

Il Signor *de la Hire* ritrova un altro caso , in cui lo sfregamento deve essere in questa istessa porzione .

E' si sà, che se due lastre di marmo estremamente lisce si adattino una contro l'altra, sia difficilissimo a svellerle, non vi essendo tra di esse aere alcuno, che con l'azion continua della sua molla rilevi la superior lastra, bilichi la colonna di aere, che preme di sopra, e soccorra alla potenza, che la cerca innalzare: Allora la lastra incaricata di una colonna di aere non bilanciata da altro aere è altrettanto più premuta, quanto ella è più grande, divenendo così più ampia base di detta colonna di aere; la quale con tutte le altre colonne, avendo una uguale altezza, il peso di esse, e le masse sono proporzionali alle basi.

Nella maggior parte delle Machine adoprasì l'olio, o 'l sangue dolce fra que'pezzi, che devono sfregarsi insieme, e questi allo'ncontro son premute scambievolmente da pesi considerabili; avvien da ciò, che tutto l'aere, quale è fra di esse, ne sia rimosso, poicche le parti di questo sono più grossolane, nè così minutamente divisibili, e lubriche, come quelle dell'olio, e dell'acqua; Ond'è, che non s'insinuino in valichi, & interstizj così stretti. Le parti delle Machine unte sostengono dunque tutto 'l peso dell' Atmosfera, e più lo sentono, quanto che anno maggior superficie, & i sfregamenti di esse sono proporzionali presso a poco alla superficie.

Essendosi sempre considerato l'effetto de' sfregamenti nelle Machine, dove effettivamente importa molto il saperli, si è creduto, come avverte il Signor *de la Hire*, che si fusse ella una regola generale, che i sfregamenti seguissero la proporzione della superficie; Nè si era ancora fatta riflessione alla ragion particolare, che bisognava avere per la maggior parte delle Machine.

* Il Signor *Amonrons*, che in certo modo aveva un dritto particolare sù di questa materia, come quello, che primo l'aveva disaminata, e scoperto l'errore; trattò più ampiamente di essa, e diè un metodo di calcolar con esattezza il valore de' fregamenti, e 'l calo, che cagionano ad una *Machina*; locche sinora nemeno all'ingrosso era stato divisato.

Dalle sue sperienze ritrovò, che nel legno, nel ferro, nel piombo, nel rame, principali materie, donde le *Machine* si formano, la resistenza dal fregamento cagionata, era pressò che la stessa, ancorche dette materie fossero immastriciate con vecchio unto, qualunque e' si fusse, vario in diverse di esse.

E che tal resistenza, come quella che affatto non dipende dalla grandezza delle superficie, sia pressò che uguale al terzo del peso, che li preme, ovvero al terzo della forza, (a parlar con più esattezza) donde l'una contro l'altra vengon premute.

Le sperienze della Fisica sono talvolta molto equivoche, se per lo minuto ben non si riguardino; & egli è facile di prendere per cagion di un effetto qualche non lo è in fatti. Così, se molti piani di fogli di carta siano tra loro intrigati, in maniera che alternatamente di due in due gli uni siano immobili, e gli altri possano tutti in una volta esser tirati; di più se sopra a tutti questi si aggiunga picciolo peso a piacere, e che si vogliano tirare que' piani, che possano esser tirati; si sperimenterà una somma resistenza niente affatto proporzionale alla pressione di tal peso; ma alla quan-

* Ved. le *Memor.* pag. 243.

quantità delle superficie, che vicondevolmente si sfregano.

Il Signor *Amontons* oppone a se stesso questa esperienza, quale sembra definitiva contro di lui, e vi risponde in modo, che diviene una nuova dimostrazione del suo sentimento. Se non vi fossero altri, che due fogli di carta gravati da questo picciolo peso; e' bisognerebbe levarlo in una certa altezza, per tirar un foglio, rimanendo l'altro immobile; se vi si aggiungano due altri fogli, sicche da quattro se ne abbino a tirar due, allora i sfregamenti saranno tre, essendo il peso sempre rilevato ad una certa uguale altezza in ogni sfregamento; sarà dunque sollevato tre volte più alto con quattro fogli, e 99. volte più con 100.; Or egli è ugualmente difficile lo alzare un peso di una libra a 100. piedi di altezza, che un peso di 100. libbre a quella di un sol piede; il peso dunque di una libra sopra cento fogli di carta disposti, come si è detto, è altrettanto difficile ad esser rilevato, che un peso di 100. libbre sopra di due fogli. E questa è appunto la resistenza, che si sperimenta. Una tale esperienza era propriissima a far cader nello errore chichesia; perciocche l'accrescimento del peso, vera cagione della gran resistenza, diveniva, e facevasi una stessa ragione colla moltiplicazione delle superficie, quale non la era affatto; e siccome questa moltiplicazione di superficie era visibile; così l'accrescimento del peso, nè lo era, nè poteva scoprirsi, che per forza di raziocinj.

Oltre alla pressione, dalla di cui grandezza nasce quella dello sfregamento, bisogna considerare una circostanza, che l'accresce, o sminuisce. Quanto più le parti, che si sfregano an celerità maggiore, altrettanto egli è più grande, e più dif-

difficile a superarsi ; Ond è , che bisogna comparar questa celerità con quella della Potenza , che deve muovere la Machina , e vincere detto sfregamento . Se la Potenza in un tempo uguale fa doppio cammino delle parti , che sfregansi ; acquista ella quindi un doppio vantaggio , o (locche sente lo stesso) scema per metà la forza opposta dello sfregamento , e la riduce ad essere la seltesima della pressione , quando che naturalmente ne era la terza .

Se , per cagion d'esempio , un Uomo sostiene un peso di 30. libre attaccato ad una fune , qual passi sopra di un Cilindro , e che questo possi girare in una cassa di ugual diametro ; quest' Uomo adatta , e preme dal canto suo la corda contro del Cilindro con altrettanta forza , con quanta il peso n' adopra dal suo ; e poicche il peso non può fare , se non se una ugual pressione a se stesso , cioè di 30. libre ; la pression totale cagionata dalla potenza , e dal peso sarà di 60. libre , e 'l valore , e lo sfregamento del Cilindro contro la cassa sarà di 20. libre , come si è supposto , non essendo in questo caso la celerità della Potenza maggiore di quella del peso : Bisogna dunque accrescere la Potenza di 12. libre , e renderla di 50. , perche sia valevole a rilevare il peso di 30. libre , e vincere lo sfregamento del Cilindro contro della Cassa ; ma accresciuta la Potenza , s'augmenta ancora la pressione del Cilindro contro la Cassa , da essa cagionata : la nuova pressione è di 20. libre , e 'l suo terzo , cioè 6. libre $\frac{2}{3}$ è la quantità dello sfregamento accresciuto , perche la Potenza pur ella è aumentata . Per vincere questo nuovo sfregamento , conviene di più accrescer la Potenza di sei libre , e $\frac{2}{3}$, le quali aggiunte alla pressione del

Ist.

I

fre-

fregamento, formano 2. libre, e picciola altra cosa.

Per la stessa ragione, che in queste 2. altre libre si accresce la Potenza, lo sfregamento aumenterà di poco più di 10. oncie; e così di mano in mano, finche non meriterà attenzione.

Raccogliendo in tal guisa tutti questi accrescimenti, lo sfregamento solo del Cilindro contro della sua Cassa sarà qualche di 30. libre, e poco men che uguale allo stesso peso; e per rilevarne uno di 30. libre, vi bisognerebbe una Potenza di 60.

Può questo effetto del solo fregamento sembrare egli stupendo, e molto al di sù di quello, che ad occhio e croce, si sarebbe immaginato. Di là è facile il conoscere, quanto si erri nel calcolo di una Machina, quando non si consideri in esso altro, che la ragione della Potenza, e del peso, e delle distanze del punto di appoggio, senza curare i sfregamenti, come per ordinario fassi, su'l credere, che montin poco. Facilmente può avvenire, che la Potenza per detti sfregamenti perda tutto'l vantaggio, che aveva dalla situazione favorevole procurata, e che malgrado a tutto ciò divenga molto inferiore al peso.



DELL'INTIRIZZIMENTO

DELLE FUNI,

Che s'impiegano nelle Machine.

LA durezza delle corde, che devono impiegarsi per lo moto di una Machina, consuevemente finora conosciuta, ne a quanto il preciso valor monti divisato, è un'altro intoppo sommo per l'effetto di esse, quale si uguaglia allo sfregamento.

Stando il Sig. *Amontons* su'l cammino di tali scoperte, intraprese la disamina a fondo di questa materia, come aveva fatto di quella dello sfregamento.

Una corda è altrettanto più difficile a piegarsi.

1. Quanto è più rigida, e più distesa dal peso, che la tira.

2. Quanto è più grossa.

3. Quanto, in piegandosi, deve rincurvarsi di vantaggio, cioè ravvolgersi, per cagion di esempio, intorno ad un picciolo curro, o girella.

Il Sig. *Amontons* immaginò il modo da rilevare in qual proporzione crescessero sì fatte differenti resistenze.

Quella, che nasce dalla rigidezza cagionata da peti, che tiran le corde, cresce a proporzione del peso.

Quella, che viene dalla grossezza della Fune,

1 2
• Vedi le Mem. pag. 247.

s'au-

s'augmenta a proporzione del loro diametro: E' ben, quì avvertire, che non avvenga questo, perche una corda più grossa contenga più di materia, per cui resista di vantaggio; poicche allora la sua resistenza crescerebbe secondo la maggior capacità di un circolo di una fune più grossa, cioè secondo il quadrato de' diametri, locche è falso; ma ella si augmenta, secondo la semplice proporzione de' diametri; a cagion che un punto della circonferenza del curro, intorno al quale la corda deve avvolgersi, è una spezie di punto fisso, rispetto a cui il diametro della fune deve muoversi; & in conseguenza quanto più questo diametro è lungo, più la corda è distante dal punto fisso del movimento, e più vantaggio ave ella contro la potenza opposta.

In fine la resistenza, cagionata dalla picciolezza de' curri, carrucole, &c. intorno alle quali le funi devon girare, è ben più grande, quanto più picciole sono le circonferenze di esse; ma ella non cresce più della proporzione di tali circonferenze.

E' chiaro, che la resistenza cagionata dalla durezza delle corde, sarà altrettanto maggiore, quanto che le corde, malgrado'l loro intirizzimento saranno astrette a più velocemente piegarli; ond'è, che bisogna, in calculando, aver mira alle resistenze di differenti corde di una istessa Machina, ovvero alle varie parti della stessa corda, quali si piegheranno con differenti celerità.

Per conoscere l'effetto della durezza di una corda in una Machina, bisogna vedere nelle Memorie del Sig. *Amontons* come e' si serva di una prima sperienza, donde per fondamento diduce tutti i suo' calcoli.

Per

Per questo mezzo il calo, che reca ad una Machina la rigidezza della fune, valutato per libbre, è come si aggiugnasse questa quantità di libbre al peso, che convien rilevare con la Machina.

Questo accrescimento di peso renderebbe ancor le corde più rigide, ond'è, che facendo l'istesso calcolo di prima, si rinverrà quanto le saran di vantaggio.

Bisogna sommare queste differenti quantità sempre menomanti, come si è veduto nell'articolo dello sfregamento, e con istupore vedrassi dove montino.

Quando si adoprano funi in una Machina, convien mettere insieme tutte le resistenze cagionate dalle loro rigidezze, e tutte quelle dello sfregamento, quali unite producono così strano accrescimento alla difficoltà del movimento; che una potenza, quale per levare un peso di 3000. libbre per mezzo di una Taglia, non avrebbe dovuta essere, secondo i semplici principj di Mecanica, che in 1500. libbre, deve essere di 3942., secondo il Sig. *Amontons*, a cagion dello sfregamento, e della rigidezza delle corde, delle quali non si teneva conto.

S U L L A V I T E.

LI Matematici, e que' fra gli altri, che han trattato delle Matematiche miste, come è la Mecanica, si son dati a considerare per ordinario i soli casi più semplici; o perche ne han creduto l'uso più frequente; o piuttosto per la soluzione

I 3

più

* Vedi le Mem. pag. 123.

più facile. Per cagion d'esempio, tutti an dimostrato, che due pesi ad una lieva appiccati, siano in equilibrio, quando le distanze dal punto di appoggio sono nella ragione inversa delle loro Masse, qual proposizione è divenuta una spezie di assioma: Non bisogna impertanto credere, che ella sia generalmente vera; la è sì nel caso, che i due pesi tirino paralleli l'un l'altro, locche è molto nella pratica raro. Convien dunque, fuor di questo, ritrovar l'equilibrio in altre proporzioni; siccome tutte altre proposizioni di Meccanica, le più costanti, e più conosciute su le carrucole, e su 'l piano inclinato; &c. limitate tra certi casi particolari più ordinarj, e ristrette in picciol numero, bisogna renderle applicabili ad infiniti altri casi possibili, a quali non possono stenderli.

Il Sig. *Varignon* nel 1687., non essendo egli ancora dell'Accademia, fece imprimere un disegno di Meccanica, in cui, dopo di esser montato sino ad un principio nuovo, e semplicissimo dell'equilibrio delle forze, non li rimaneva altro, che lasciarsi condurre dal natural corso delle conseguenze, per dimostrare con ugua facilità tutti i differenti casi possibili in Meccanica, e rinvenire ne' semplici Corollarj le proposizioni credute sin'allora universali. Frattanto la Vite non era nel cennato suo disegno: Si era egli contentato di rimetterla nell'idea generale, sotto di cui comprendeva tutte le Machine; Ma egli non la prendeva, che per quel verso solito a considerarsi, cioè in certe circostanze particolari, che rendean facile la disamina.

I Vendematori, da quali vidde spremere l'ova colla Vite, li fecero avvertire, che quel che si supponeva, per rendere la soluzione geometrica più semplice, e più facile, non era l'istesso di quello, che

che praticavasi in tale occasione; e che si sarebbe errato, se la forza di questi Vendemiatori si fusse per le regole ordinarie calcolata. Benchè la dimostrazion della Vite di venne più difficile; e' però intraprese di renderla tale, che comprendesse tutte le maniere, nelle quali potesse detta Machina impiegarsi; e ciò secondo i principj stabiliti da lui nel suo disegno di Mecanica, de' quali, questa novella pruova ne dimostra l'ampiezza.

SOPRA DI UNA LIVELLA.

* **L**A Geometria pratica non ha operazioni più difficili di quelle del livellare: E' in fatti cosa da far istordire, come presi due punti su la superficie della Terra, per buon numero di leghe distanti, si possa ditterminare precisamente, se sian' esse in ugual distanza dal centro della Terra, o quanto uno lo sia più dell'altro. Devesi questo di fresco ritrovato all'Accademia de le Scienze Reali, che dopo lo stabilimento, è venuta a capo di tale pretisa scoperta. Gli Antichi non an potuti esser senza delle livelle per i grandi Acquidocci, e sommi Canali di acqua, che di essi osserviamo; essendo però la loro livella molto imperfetta, e niente comoda, venivano costretti a prendere pendii per detti loro Condotti, maggiori del bisogno; poichè se fossero essi stati giusti, non avrebbero osati di avventurar l'impresa. Oggi, mercè alle Livelle inventate da' Signori *Picard, Huygen, Roemer, de la Hire*, tutti Accademici, e' li sa derivar le acque

1 4

donde

* Vedi le *Mem.* pag. 164.

donde mai si possa, e si son veduti miracoli di questi strumenti nel livel ar luoghi distantissimi, e fatidicissimi, come son que' sopra di tutti altri, che di ordine del Rè sono stati livellati per *Versailles*: Seppesi ditterminare una tanto picciola differenza di elevazione, quant'è quella di 6. pertiche, tra 'l piano rasente del Castello di *Versailles*, e lo Stagno della gran Valle della Foresta di *Orleans*, per tradurne quindi da sì sterminata distanza, che si frapone, le acque per ornamento di detta Villa.

Ma questi Strumenti cotanto perfetti, per la loro stessa perfezione, sono molto incomodi, non potendosi mettere in opera, nè esser racconciati, che da Artefici molto abili, difficili a incontrarsi fuor di Parigi, e quì ancora molto pochi; che però sebben la Livella, che si descrive ne le Memorie sotto il nome del Signor *Couplet* sia quella stessa in fatti, che 'l Sig. *de la Hire* nel suo Trattato del livellare, impresso nel 1684. dimostrò; il Sig. *Couplet* però l'ha resa in qualche maniera sua propria, agevolandone l'uso in maniera, che i più semplici Artefici possano adoperarla: Locche sembra un vero dono, che si fa al Pubblico, il quale avendola prima; pur non l'avea.



DI

DI ALCUNE MACHINE IMPIEGATE IN UNA NUOVA NAVIGAZIONE DELLA SENNA.

* I Fiumi non solamente conferiscono alla natural dovizia delle Campagne con irrigarle; giovan ancora alle ricchezze, che l'arte dona alle Provincie, facilitando il trasporto delle Mercanzie. Quanto più il corso loro si distende in uno Stato; più comunicano tra loro, e viepiù le parti, che lo formano, sono unite; e disposte a scambievolmente arricchire. Se la Natura, come tutto di avviene, non ha fatto per gli Uomini qualche di maggior vantaggio poteva a loro beneficio fare; l'ha rimasto ad essi, perchè lo compissero. Gli Ollandesi, o per dar un' esempio più riguardevole, i Chinesi, quali anno un Paese di un'ampiezza senza paragone più grande, ne dimostrano fin dove possa giungere l'industria umana, e qual compenfame e' si abbia dalla Navigazione per Canali.

La più grande, e più maravigliosa opera di tal forte, e nello stesso tempo la più profittevole, che'n Francia sia, è l'unione de' due Mari. Abbiamo ancora i Canali di Briarre, e di Orleans. Ma, per bisogna confessare, che non abbiain noi tanto numero di tali opere, quanto ne dovriamo avere, per l'interesse del Commercio, & a proporzione quante ne anno gli Olandesi, e li Chinesi.

La

• • • • • *Vedi le Mem. p. 92.*

La Senna comincia ad esser navigabile fin da *Nogent*; e poicche dilungando tal navigazione più in là, si aprirebbero nuove comunicazioni, e più distese tra Parigi, e le Province di *Bourgogne*, di *Champagne*, di *Lorraine*, di *Franche Comte*; sin da tempi di *Filippo il Bello* caddero questi pensieri a Franzesi, quantunque allora la mira di essi non girasse intorno al Commercio, o che non fossero eglino addati a quelle sorti di travagli, o che Parigi allora si era una molto picciola Città; non ebbe l'affare esecuzione alcuna, tanto più che si ritrovò la Senna impraticabile al di sopra di *Nogent*, o perche que', che si erano inviati non fossero de' migliori Ingegneri; o perche volessero favorire gli Abitanti di *Nogent*, a quali era sempre riuscito comodo, che la loro Città fusse il primo Porto della Senna.

Il Sig. *Colbert* ripigliò un tal disegno senza veran'effetto, forse per la stessa ragione, come ancora il Sig. *Marisciallo Du Pleffis*; Ma il fu Sig. *Duca di Rohan*, Cavaliere di alte idee, e nell'eseguirlo proprio, menato dal suo sublime natural genio, non senza l'ajuto di qualche Amico intendentissimo di *Mecanica*, rimise in piè tale impresa, e ne tenne dal Rè nel 1676. le Patenti.

A mal pena si era dato principio all'opera, che gli Abitanti di *Nogent* la fecero sospendere per le liti, che mossero, delle quali non si vide il fine, che nell'Anno 1685.

I dispendj per dette liti, le rovine de' materiali in tempo sì lungo, & i salarj de' Sostituti, che correvan sempre, cagionarono perdita così grande agl'Intraprenditori, che sarebbero stati costretti ad abbandonar tutto, senza il riparo, che loro diede la perizia delle *Mecaniche* nell'invenzione di nuove

Porte

Porte di chiuse, e nuovi modi per tirar le acque dalle cave, quali sì fatti ajuti rimisero sì l'affare, che poterono continuare i loro lavorj con molta minore spesa.

Nuove liti, e straordinarj inondamenti della Senna ridussero gli stessi a nuovi simili spedienti. Tutte le disavventure, & affanni, che ebbero a sperimentare, ridondaron a beneficio della Meccanica; Et appunto queste sono alcune delle Machine inventate dal Sig. Duca di *Rovanoz*, o da suoi socj, dello qual il Sig. *Des Billettes* fa la descrizione nelle Memorie. Gli Ollandesi, che ben'anno avvertiti all'importanza di tali Machine, sono stati curiosi di vederne i disegni, quali presentemente si pubblicano, affino che tutto quello, che nell'Arti, o nelle scienze si scuopre, sia un Tesoro comune a tutte le Nazionj culte.

SOPRA DI UNA MACHINA FATTA PER ESPERIMENTARE LA PROPORZIONE DELLA CADUTA DE' CORPI.

L'Ingegnosa Ipotesi del *Galileo* su la proporzione, nella quale cresce la celerità de' corpi, che cadono, è oggimai stabilita nella Fisica: Dividendo i tempi, ne' quali detti corpi cadono, in parti uguali, si fa, che nel secondo momento questi scorrono tre volte più di spazio del primo, nel terzo 5. volte più, e così di mano in mano, secondo i numeri impari. Ma questa Ipotesi così comoda per lo calcolo, e veritabile al ragionamento, nel

• Vedi la Mem. pag. 337.

nel fondo poi non è buona, se non quanto, che si conformi alla sperienza, difficile a farsi con tutta la precisa diligenza.

Il P. *Sebastiano* ha immaginato perciò, e con tutta esattezza lavorata una Machina, quale egli ha creduta la più propria a provare il sistema di *Galileo* delle altre sperienze, che sù lo stesso disegno si son fatte.

Questa Machina è composta da due, o da quattro Parabole uguali, che nella loro sommità si segano ad angoli uguali, & anno un'Asse comune perpendicolare all' Orizzonte. Forman queste una Paraboloide, intorno alla quale si aggira una spirale fatta da due fili di ottone paralleli, quali anno un Piano inclinato molto stretto, e disposto sì, che 'l primo giro della spirale, avendo un dito di Diametro; il secondo ne abbia tre, il terzo cinque, il quarto sette, &c. Questi giri di spirale, che fra di loro sono come i Diametri, sono appunto i spazj ineguali, che nel cadere i corpi devono scorrere in tempi uguali. Lasciando dunque cadere dalla sommità della Paraboloide una picciola palla di Avorio di 6. linee di Diametro, si vede, che scorre tutto il piano spirale inclinato, quale gira intiero nello stesso tempo: Locche si vedrà migliore, se intorno a detta Paraboloide si faran muovere due palle uguali in un medesimo tempo, & in qualche distanza l'una dall'altra; poicche allora quando si son vedute passare nello stesso istante su di un'istesso Arco di detta Paraboloide; si vedranno continuare, a gire insieme, e ritrovarsi nell'istante medesimo sopra di un'altro qualunque Arco, sebbene in differenti altezze, scorrendo giri ineguali di detta spirale.

SU LA DESCRIZIONE DELLE ARTI.

IL travaglio per l'Invenzione, riesce molto piacevole, e nello stesso tempo sommamente glorioso; sicche ogn'uno di sua natura sarebbe mosso a non intraprenderne di altra sorte: Ma poiche l'Accademia riguarda più l'utile del Pubblico, che 'l dilettevole impiego, o la fama; ha ella volentieri abbracciata una fatica coranto secca, e spinosa, e per niun verso famola, quanto si è quella della descrizione delle Arti, tali appunto, che oggi giorno si esercitano in Francia.

Questa descrizione verrà sino alle ultime minuzie, tuttoche spesso e' sia difficilissimo, o d'appararle dagli Artigiani, o di spiegarle; e rappresenterà, o con discorsi, o con figure tutte le Materie, che vi s'impiegano, tutti gli Strumenti, e tutte le operazioni degli Operaj.

Saran poste nella loro luce per questo mezzo una infinità di pratiche ripiene di spirito, e d'invenzione, generalmente sconosciute.

La posterità sarà pur sicura, malgrado a cambiamenti, e vicende, di tali arti, per lo meno, come tra noi presentemente sono, che ritroverà sempre in questa raccolta: E se noi ne abbiampersuta alcuna delle più importanti, che presso gli Antichi era; è advenuto, perche non si sono essi di similgiante mezzo serviti, per trasmettercele.

Gli Uomini abili, che non potran prenderse la pena, o non abbian l'agio di andare agli Artigiani, per apprendere le Arti; le vedranno in una

occhiata quì, e saran dalla facilità sollecitati a perfezionarli. L'Accademia non lascerà d'avvertire, quando porterà il bisogno, ciorche ella stimerà, che vi si possa aggiugnere, o per lo meno qualche vi si desiderebbe.

Sarà più agevole ancora in ciascun'Arte di confrontar la pratica, che si tiene in Franza, con quella di un'altro Paese; e così i Franzesi, come gli Stranieri potranno ugualmente ricavar profitto da un tal paragone.

Si è cominciato dall'Arte, che conserverà tutte le altre, cioè dalle Stampe. Il Sig. *Jaugeon*, il quale ha intrapresa la descrizione di una parte di esse, ha prima fatto ammasso degli Alfabeti delle lingue, così morte, che vive, come de' supplementi delle lettere, cioè di que' caratteri particolari a certe Scienze, com'è l'Astronomia, la Chimica, l'Algebra, la Musica: Indi, non rimanendosi tra limiti di una semplice descrizione, ave egli fatto vedere all'Accademia nuove lettere Franzesi, quali si è studiato di rendere oltremodo vaghe all'occhio. Egli è certo, che la bellezza di una impressione dipenda, quasi che intieramente, da queste, ma stenterassi forse a credere la cura, che vi ha bisognata, per regolar la proporzione della grandezza, e della grossezza, i contorni, gl'intervali di parti differenti, che compongono la figura di ciascuna lettera: Egli, dopo di aver riandati gli Autori, che anno scritti su di questa materia, riputata fin dalle prime degna, che di lei si trattasse; si è in fine ridotto a consigliarli co' proprj occhi, sovrani giudici, ma incerti nella decisione. Il P. *Sebastiani*, il Sig. *Billettes*, & il Sig. *Jaugeon* li sono per qualche tempo impiegati ad una tal fatica; Finche ha egli ritrovato un Metodo Geometrico, col

col quale gli Operaj possino, sino alla precisa minutezza lavorar le figure delle lettere, tali, come l'an già travagliate. Il Pubblico, a chi si appartiene il giudizio di questa lor opera, ne vedrà un saggio, fu di cui potrà diffinire, stando su 'l punto di comparire l'Istoria del Rè in Medaglie fatta dall'Accademia delle Iscrizioni, impressa con detto nuovo carattere.

Si è ancora nell'Accademia trattato di molte altre materie di Mecnica.

Il Sig. *Jaugou* ha fatta la descrizione di un Mortajo di Bronzo immaginato da lui, quale con la sua cassa, e suo carico puol'esser portato da un Uomo, e Squadrato, senza istrumento di Matematica, scagliando in un gettito 12. granate sino a 400. passi, alle quali si dà il fuoco in un tempo istesso. Più Anni sono se ne fè la pruova per ordine del Rè in presenza del fu Sig. *Louvois*, e'l Mortajo fu rimesso nel Magazzino di Brest.

Il Sig. *Parent* ha proposta l'idea di una Macchina, da rilevare i Vascelli; & ha dimostrato con una formula generale di Algebra, qual debba essere l'elevazione nelle acque, nelle Trombe succianti ad ogni tratto di stantuffo, di qualunque figura sian le buccie, & in qualunque sistema, che si voglia.

Avendo il Rè onorata l'Accademia, con inviar le Machine a disaminare, qualora veniva supplicata per i Privilegj dagl'Inventeri; non farà fuor di proposito di tessere quì il Catalogo di quelle, che sono state approvate dalla Società, sì per cominciar a dare agli Autori parte di quella gloria, che e' si meritano; sì per tenere il Pubblico avvisato di queste nuove dovizie.

La disamina, che ne fa l'Accademia si aggira sopra due principali punti.

1. Avverte ella prima, se la Machina proposta sia effettivamente nuova; locche richiede una somma cognizione istorica. Taluno spesso si fa Inventore non con altra fatica, che con quella di prendere da un libro una Machina posta in dimenticanza: Sicche alcune, le quali per la loro novità sono state chiare, si son poi ritrovate nel Gabinetto, dove l'Accademia raccoglie differenti Modelli: Egli è vero, che possa alcuno per vigor di mente, o di travaglio esser Inventore di cose prima ritrovate; ma in fine si attiene al Pubblico quel che è stato pubblicato, e sarebbe un farle comprare le sue proprie robbe, in concedendoli il Privileggio.

2. Bisogna ancora, che una Machina sia utile, e di un uso comodo; ond'è, che su di tal punto vi si adopera, nel discuterla, tutta la scienza Meccanica. Non può saperli, quanto siali facile l'esser ingannato intorno all'effetto, che si attende da una Machina, se non se dopo moltissime sperienze, quantunque da occhi sgombri di passione si guardino. Talvolta in facendo ricredere gl'Inventori di un pensiero, che lusingavali, risparmia un Privileggio, che avrebbero potuto ottenere, donde sarebbero rovinati.



MACHINE, OVVERO INVENZIONI

APPROVATE DALL' ACCADEMIA

Nell' Anno 1699.

1. **M**achina per innalzare fino alle più alte Case l'Acqua ad estinguere gl'Incendi inventata da Armajuolo di *Samur* nell' *Anxois*.
2. Machina per incidere le Lime del Sig. *D^e Verger Falegname*.
3. Volta piana con un fondo di pietra particolare del Sig. *Abeille* Ingegniere.

Oltre di queste Machine, per le quali veniva l'Accademia richiesta di leale approvazione già loro fatta, abbenche alcune con restrizioni, che qui si tralasciano; ve ne sono delle altre nuove parimente, & ingegnose presentate dagli Autori all' Accademia, solamente per farle vedere, o per dimandarne il parere: come per cagion di esempio.

Una Machina per muovere in un'istesso tempo 6. o 7. seghe da tagliar Marmi, e pietre dure con celerità uguale a quella de' Segatori, inventata dal Sig. di *Guez* Ingegniere.

Remi, che si girino, pur dello stesso Autore, utilissimi in molte occasioni a Vascelli da Guerra, per camminare nelle calme, facendo una lega per ora, con la sola metà della Ciurma, per entrare in un Porto, o per uscirne, senza l'ajuto del vento; per soccorrere alle vele, ancorche per queste in ogni

ogni ora si corressero tre leghe, giovevoli perciò ad abbordare, o schivare, quandoche si volesse, il Nemico, e per ritirarsi dalla zuffa, &c.

Il *Misurasuono* del Sig. *Loulié*, per mezzo del quale ogn'uno, che non mai avesse accordato Cembali, purché abbia buon'orecchio da mettere una corda all'unifono, & all'ottava di un'altra, potrebbe alla prima accordare un Cembalo con quella facilità, e maggior destrezza, che i migliori Maestri sogliono.

L'Istoria dell'Accademia deve essere ancora al possibile Istoria degli Accademici; perlocche non si lascerà, secondo i meriti di qualcheduno, di celebrare i Funerali in un'Articolo separato, nel quale si raccoglieranno i fatti più particolari, e più considerabile della di lui vita. Il Sig. *Bourdelin* morto nell'Anno stesso, di cui scriviamo l'Istoria presentemente, farà 'l primo, verso di cui l'Accademia compie al suo dovere.

E L O G I O

DEL SIG. BOURDELIN.

Claudio Bourdelin nato da onesti Parenti in Villa Franca prossima a Lione nel 1621., perdè Padre, e Madre, mentre era ancor tenero Figliuolo: Fu egli trasportato in Parigi, & abbandonato a fortuna, & alla propria condotta in una età; & in un Paese molto pericoloso: Apprese di per se il Greco, e 'l Latino, su la mira di appigliarsi alla
Far-

Farmacia, & alla Chimica, quali divennero poi l'unica sua applicazione per lo spazio di 56. Anni.

Acquistossi in molto breve tempo una somma riputazione, non solamente per l'apparecchio esatto, e fedele de' remedj, che a tutti per un prezzo uguale, e più che mediocre distribuiva; ma ancora per la notizia delle malattie, per le quali, senza verun compensame, dava egli i suoi consigli modesti, e sovente felici: E quantunque giammai promettesse con franchezza salute agl'Infermi; pure aveasi in lui una estrema fidanza. Riprnuovava affatto il Salasso, fuorchè nell'Apoplessia sanguigna; e senza di un tale ajto, si viddo guarir quantità di mali acuti con infiammamenti, come sono le punte, le flussioni di petto, le squinanzie, &c.

Quando fu formata dal Sig. *Colbert* l'Accademia Reale delle Scienze nel 1666., per cui impiegò tutta la maggior diligenza nella scelta de' soggetti, il Sig. *Bourdelin* fu tra Chimici annoverato, e tosto egli col Sig. *Du Clos* li diedero a disaminare le Acque minerali del Regno. Fece di poi grandissimo numero di sperienze, mescolando i Succhi delle Pianta, ovvero Spiriti, e Sali minerali col Sangue delle Arterie, e delle Vene, come ancora con la bile, e con la linfa degli Animali: Fè pur egli con tutta la possibil cura, & esattezza l'Analisi di tutte le Pianta, che potè mai tenere, contribuendo molto alla perfezione di tal metodo, che a fin fondo l'Accademia ha voluto divisare. Ha procurato l'Analisi dell'Olio con maniere intente da lui, le quali conferiscono molto per la cognizione di questa parte de' Misti. Ha in fine dimostrarato all'Accademia pressocchè a due mila Analisi di svariati corpi di ogni genere, & inventata, e regolata la più gran parte delle operazioni Chimiche, che


148 *Istor. dell' Accad. Reale delle Scienze.*
che in questa Compagnia per lo spazio di 32. Anni
si son fatte.

Morì egli a 15. di Ottobre 1699. in età di poco men di 80. Anni, e ricevè la morte, con tutta la costanza d'Uomo dabbene.

Ha di se lasciato due Figli, tutte e due Accademici, uno dell'Accademia delle Scienze, e l'altro delle Iscrizioni.

Il di lui luogo d'Accademico Pensionario Chimico è stato occupato dal Sig. *Lemery* Associato. Il Sig. *Geoffroy* Allievo del Sig. *Homborg* ha tenuto il luogo del Sig. *Lemery*, e 'l Sig. *Homborg* ha per Allievo avuto il Sig. *Berger*, il quale era prima del Sig. *Tournefort*, al quale si è dato per Allievo il Sig. *Lemery* Dottor di Medicina, Figlio del Sig. *Lemery* Pensionario.

F I N E.





MEMORIE
DELL'
ACCADEMIA
REALE
DELLE SCIENZE.

Dell' Anno M. DC. XCIX.



IN NAPOLI M. DCC. XXXIX:
Ampite di Berardino Gessari:
Nella Stamperia di Felice-Carlo Mosca:
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

TAVOLA

P E R L E

M E M O R I E.

M Etodo per ritrovar curve, lungo le quali cadendo un corpo si avvicini, o discosti dall'orizzonte in quella ragion di tempo, che si vorrà, & in qualunque ipotesi di celerità &c. Del Signor Varignon.	pag. 1.
Giunta alla precedente Memoria, dell' Istesso.	17
Osservazione dell' Eclisse della Luna avvenuto a 15. di Marzo 1699. del Signor Cassini.	31
Osservazioni dell' istesso Eclisse del Signor de la Hire.	37
Riflessione sù'l lume, e colori, e sopra la generazione del Fuoco del P. Mallebranche.	42
Del ritorno delle Comete del Signor Cassini.	58
Osservazioni sopra l'esatta quantità de' sali volatili acidi, contenuti da differenti spiriti acidi del Signor Homberg.	68
Modo Geometrico, e Generale da fare Clessidre, ovvero Orologgi ad Acqua con tutte sorti di vasi, ove si vogliano forati con qualunque picciola apertura, donde l'acqua scorra, secondo qualunque ipotesi di velocità: E reciprocamente da ritrovare detti vasi per tutte sorti d'ipotesi di tali velocità, e di tempi, secondo i quali debbanfi regolare gli abbassamenti della superficie dell'acqua, che scola del Signor Varignon.	76

De

T A V O L A.

<i>Descrizione d'una novella foggia di Porta di Chiuse posta in uso per la novella Navigazione della Sen- na, letta nell' Accademia dal Signor Des Billec- tes.</i>	92
<i>Saggi per esaminare i Sali delle Piante del Signor Homberg.</i>	98
<i>Spiegamento di alcuni singolari effetti, che avvengo- no ne' Vetri piani, come sono i Cristalli de' specchi del Signor de la Hire.</i>	105
<i>Per impedire, che l'umido dell'aere nella notte non si attacchi a' Cristalli obiettivi de' Cannocchiali del Signor de la Hire.</i>	112
<i>Aggion Generale delle forze, che bisogna impiegare nell'uso della Vite del Signor Varignon.</i>	122
<i>Istoria de' Tamarindi del Signor Tournefort.</i>	128
<i>Osservazioni di tre novelle Macchie di Giove del Si- gnor Cassini.</i>	136
<i>Metodo facile per ritrovare un solido rotondo, quale mosso in un fluido stagnante Paralello al suo asse incontri minor resistenza, che ogn'altro solido; qua- le avendo la stessa lunghezza, e larghezza si muove con ugual velocità secondo la stessa direzione del Signor Marchese dell'Hopital.</i>	141
<i>Maniera di commodamente sostituire l'azion del fuo- co alla forza degli Uomini, e de' Cavalli per muo- vere le machine del Signor Amontons.</i>	148
<i>Descrizione della Livella del Signor Couplet.</i>	164
<i>Quadratura d'una infinità di segmenti di Settori, e di altri spazi nella Cicloide volgare del Signor Bernoulli Professor di Matematica in Groningue.</i>	172
<i>Metodo per ridurre a centro i Cristalli de' Cannoc- chiali nel lavorarli del Signor de la Hire.</i>	177
<i>Metodo comune all' equazioni del secondo, e terzo grado.</i>	

TAVOLA.

<i>grado per averne la soluzione con una semplice trasformazione del primo lor termine fat a secondo l'ordinario del Signor Varignon.</i>	180
<i>Osservazioni sopra quella sorta d'Insetti, che comunemente chiamano Scorpion marino del Signor Homberg.</i>	185
<i>Osservazione d'un Eclisse dell' Occhio del Toro Aldebaran, ovvero Pallicium del Signor de la Hire.</i>	192
<i>Disamina della forza dell' Uomo per muovere pesi, o con levarli, o portandoli, o tirandoli, considerata assolutamente, o comparata con quella degli Animali, che portano, e tirano, come i Cavalli del Signor De la Hire.</i>	195
<i>Osservazione dell' Eclisse del Sole a 23. Settembre 1699. Del Signor Cassini.</i>	205
<i>Riflessione su questo Eclisse del Signor Cassini.</i>	207
<i>Osservazione dell' istesso Eclisse del Signor De la Hire nell'Osservatorio.</i>	217
<i>Jaggi sopra le Iniezioni Notomiche del Signor Homberg.</i>	220
<i>Strani effetti dello Scorbuto avvenuto in Parigi nel 1699. del Signor Poupert.</i>	224
<i>Riflessioni su di una lettera del Signor Flamsteed al Signor Wallis intorno alla Parallasse annuale della Stella Polare del Signor Cathin Figlio.</i>	234
<i>Due Modelli di Ruote da votar l'acqua del Signor Billettes.</i>	240
<i>Della resistenza, che incontrasi nelle Machine, sì per lo fregamento delle parti, che le compongono, come per l'indirizzamento delle corde, che vi si adoperano, col modo da calcolare l'uno, e l'altro del Signor Amontons.</i>	242
	242

TAVOLA:

*Tavola della resistenza cagionata nelle macchine del
Signor Amontons.* 263

*Osservazioni sulla circolazione del sangue nel Feto;
e descrizione della Testuggine, e di alcuni altri
animali del Signor Du-Verney.* 267



MEMORIÈ DI MATEMATICA, E DI FISICA,

Da Registri dell' Accademia ritratte.

M E T O D O

*Per ritrovare Curve, lungo le quali cadendo un
Corpo, si avvicini, o discosti dall' Orizzonte
in quella ragion di tempo, che si vorrà,
& in qualunque Ipotesi di
celerità, &c.*

DEL SIGNOR VARIGNON.



Olto tempo è, che'l Sig. Leib-
nitz, & i Signori Bernoulli ri-
trovaron le Curve, lungo le
quali cadendo un corpo, se-
condo l'Ipotesi dell'accelera-
mento stabilita da Galileo, si
avvicinasse egli ugualmente
all'Orizzonte, o a qualunque
punto in tempi uguali. Ancor io nel 1695. diedi
all'Accademia una nuova soluzione del primo di
questi

Δ

7. Marzo 1699.

questi Problemi , senza l'ajuto del calcolo degl'Infiniti : Ecco ora qualche tal calcolo mi ha dato su l'istessa materia, con l'occasione di detto scritto , il quale distendendosi solamente intorno alle accessioni uguali all'Orizzonte in tempi uguali secondo l'Ipotesi sola di *Galileo* ; mi ha fatto pensare agli accostamenti , che farebbero in quella ragion di tempo , che si volesse , e secondo quella Ipotesi di acceleramento , che pur piaceffe.

Io ritrovai prima le Curve richieste nella Ipotesi ordinaria delle direzioni de' gravi fra di loro paralleli ; indi mi si presentarono quelle , che tali Corpi descriverebbero nell'Ipotesi delle loro direzioni concorrenti al centro della Terra ; ripigliando quindi le direzioni parallele, ritrovai ancora in tutte le Ipotesi immaginabili di acceleramento ne' Corpi cadenti l'espression generale delle Curve , che dovriano così descrivere, per accostarsi, o ugualmente scostarsi in tempi uguali da uno tutt'altro qualunque punto preso nel Piano di dette Curve : E nelle particolarità delle differenti posituro di tal punto mi si son presentate molto curiosissime formole.

Per cagion di esemplo (non appartandomi quì dalla Ipotesi del *Galileo*) immaginando questo punto nell'Asse verticale della Curva in tal caso ricercata ; ho veduto quindi nascere tutte l'equazioni , che finora ho dato . In riguardandolo come infinitamente allontanato per una direzione verticale ; ho veduto nascere parimente il luogo della seconda Parabola Cubica , che era la Curva, lungo la quale in tal caso un Corpo si avvicinerrebbe ugualmente all'Orizzonte in tempi uguali : E considerando ancora detto punto come infinitamente dilungato per una direzione Orizzontale , ho ritrovato , che
la

la Parabola ordinaria era la Curva, per la di cui convessità cadendo un Corpo, si discostarebbe dal suo Asse verticale ugualmente in tempi uguali; loche propriamente è quello, che *Galileo* avea supposto, per provare esser questa Curva quella, che descriverebbero i Corpi gravi scagliati Orizzontalmente nel voto. Quanto al caso di questo punto infinitamente discostato per una qualunque obliqua all'Orizzonte; io determino, quando la curva richiesta debba pur essere una tal Parabola, e quando che nò nell'Ipotesi stessa del *Galileo*. Ecco tutto per ordine, siccome mi è caduto in pensiero.

I. Cominciamo dunque dalla ricerca della linea BC tale, che, supposte le direzioni de' gravi parallele fra di loro, cadendo un Corpo da A lungo questa Curva, si allontani dall'Orizzonte AD in quella ragion di tempi, che si vorrà, & in qualunque Ipotesi delle celerità de' Corpi cadenti.

Dopo di aver tirata la verticale AL, e le orizzontali BH, *bb* l'una all'altra vicine indefinitamente: Sian prese le ordinate EH, *eb* di una qualunque Curva AHG, per la velocità acquistata nel cadere da A in B, ovvero in E: Siano parimente i tempi nel cadere da A in B espressi dalle ordinate EF di un'altra qualunque Curva AFK: Siano in fine $AE=x$, $EB=y$, $EH=u$, & $EF=z$.

II. Posto questo, si avrà $\frac{Bb}{HE}$ per lo tempo impiegato a scorrere *Bb*, il quale non essendó, che un'istante (*dz*) darà $dz = \frac{Bb}{HE} = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{u}$, ovvero, (in prendendo $a=1$) $a\sqrt{ax^2 + dy^2} = u dz$, nella quale equazione non bisogna altro, che sostituire il valore di *u*, e di *dz*, che risulteranno in *x*, & in *dx*, equa-

A 2

* Tab. I. Fig. 1.

4 *Memoria dell'Accademia Reale*

equazioni delle Curve date AHG, & AFK, e diver-
rà essa quella della Curva ricercata BC.

III. Per applicar questa all'Ipotesi del *Galilei*,
bisogna considerare, che in tale Ipotesi le veloci-
tà HE (v) de' Corpi, che cadono, sono come le ra-
dici dell'altezza AE (x): dimodoche AHG sia un a
Parabola ordinaria, in cui il luogo sia $v = \sqrt{ax}$;
quale introdotto nell'equazion precedente (art. 2.)
 $a \sqrt{ax^2 + dy^2} = v da$, la cambierà in $a \sqrt{ax^2 + dy^2}$
 $= da \sqrt{ax^2 + dy^2}$, ovvero $\frac{a \sqrt{ax^2 + dy^2}}{\sqrt{ax}} = da$ per quella ra-

gion di tempi, che si vorrà, secondo l'Ipotesi del
Galileo.

IV. Se si voglia inoltre, che la Curva BC sia
tale, che cadendo un Corpo da A lung'h'essa, si
discosti ugualmente dall'Orizzonte AD, cioè si di-
lunghi in guisa, che i tempi FE siano come le al-
tezze AE, o che AFK sia una linea retta, e si vo-
glia LK = LA; allora avrassi parimente FE (z)
= AEx, & in conseguenza $\frac{dz}{dx} = dx$: locche cambierà

quì ancora l'equazione $\frac{a \sqrt{ax^2 + dy^2}}{\sqrt{ax}} = da$ dell'art. 2.
in $\frac{a \sqrt{ax^2 + dy^2}}{\sqrt{ax}} = dx$, la quale si riduce a, $dy = dx$

$\sqrt{\frac{ax}{x-a}}$, ovvero $andy = adx \sqrt{\frac{ax}{x-a}}$, l'integral del-
la quale è $ay = \frac{2ax - 2aa}{2x - 2a} \sqrt{\frac{ax}{x-a}}$, ovvero $ay =$
 $\frac{2}{2x - 2a} \sqrt{\frac{ax}{x-a}}$, di maniera che prendendo $t = x - a$,
questo luogo farà $ay = \frac{2}{2t} \sqrt{\frac{at}{t}}$, ovvero $any = \frac{2at}{2t}$, o
in fine $ay = t$: locche fa conoscere, che la cur-
va

Fig. 2.

va richiesta BC deve quì essere una seconda Parabola cubica, che deve cominciare dal punto O del suo Asse, sì che AO sia $=a$; locche farà OE $=t$, potche (per ipotesi) AE $=x$. Donde si vede, che 'l Corpo, qual deve lungo la detta Curva cadere, debba cominciare nella sua sommità O con una celerità tale, qual si avrebbe acquistata da A in O: locche concorda con le soluzioni del Sig. *Libnitz*, e de' Signori *Bernoulli*.

V. Questo è quando le direzioni de' gravi si credano tra di loro Parallele; ma se si voglia, che concorrano in alcun punto, come nel centro della Terra; e che dopo di aver preso ancora x per l'altezza de' spazj scorsi dal principio della caduta fino al punto della Curva ricercata, dove ritrovasi il Corpo, per li tempi impiegati a scorrerla z , per la celerità acquistata in detto punto v : Si prenda inoltre c , per la distanza del centro della Terra dal punto, donde detto Corpo comincia a cadere, & y per l'Arco dell'Orizzonte compreso tra detto punto, e la retta tirata dal centro della Terra per detto Corpo; si avrà quì con simile raziocinto, & ugualmente semplice, come quello dell' *art. 2.* $dz = \sqrt{cdx^2 + c - x^2} x dy$.

———— per l'equazion della Curva;

lungo la quale detto Corpo cadendo, si discosterebbe dall'Orizzonte, o si avvicinerrebbe al centro della Terra in tal ragione di tempi, che si volesse: Dimodochè se si richiedesse detto allontanamento, o avvicinamento, come i tempi dell'Ipotesi della celerità acquistati in ragion delle radici dell'altezza; si avrebbe allora (in prendendo $a=1$) $a dy = c dx \sqrt{ax - aa}$.

———— per equazione di tal curva.

cx^2

A 3

VI. Qui

VI. Qui non occorre altro, che far c infinito per lo caso delle direzioni de' gravi parallele fra di loro, e queste due equazioni daranno ancora quelle

degli *art. 2. e 4.* cioè $dz = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{v}$ ovvero (perche $a = 1$) $vdz = a \sqrt{dx^2 + dy^2}$, come nell'*art. 2.* & $ady = dx \sqrt{ax - aa}$, ovvero $dy = dx \sqrt{\frac{x-a}{a}}$, come nell'*art. 4.*

* VII. Per costruire presentemente l'equazione $cdx \sqrt{ax - aa}$ dell' *art. 5.*, e descrivere la

Curva CB, che ella esprime; immaginiamoci una retta RA tirata dal centro R della Terra per lo punto A, donde si suppone, che cada il Corpo nel caso presente: Sù di questo Asse AR sia una Curva Geometrica ST, le di cui Ascisse essendo $AE = x$, le ordinate SE, perpendicolari a detto Asse, il luogo sia

$SE = \frac{c\sqrt{ax - aa}}{c-x}$, qual Curva rincontrisi in conseguenza con AR. in O, sicche lasci $AO = a$, & RT

perpendicolare sopra AR sia la di lei Assimptota: Sia indi presa $AP = AO$ sopra di RA prolungata, sù di cui siano drizzate le perpendicolari AQ, sia inoltre l'arco circolare AMD. dal centro R descritto.

Posto ciò, e supposte le quadrature dell' Iperbole, e del circolo; sia preso il rettangolo PL uguale allo spazio OES, indi l'Arco $AM = AL$: sia inoltre la retta MR. rincontrata in B dall'Arco EB. descritto dal centro R. E' chiaro, che questo punto B. sarà uno di quelli, che formano la ricercata curva; come ancora, che detta Curva BC. non cominci, se

non

* Fig. 3.

non da O; donde si avvisa, che quindi il Corpo, quale lungo detta Curva dovrà cadere, debba cominciare a muoversi con quella velocità, che ave da A in O acquistata, per discostarsi dall'Orizzonte, e per appressarsi ugualmente al centro R della Terra in tempi uguali.

E' ancor egli chiaro, che supponendo $dr =$ alla parte dell'Arco EB. compresa tra RBM, & un'altra RBM indiffinitamente prossima, & $x = a$ (OE) $= s$, si avrà parimente $ds \sqrt{r} = dr \sqrt{a}$ per l'equazione della Curva OBC. Donde si vede, che deve ella toccare il suo Asse AR in O, e ritornare indi a rincontrarlo in R sotto un'angolo con la minore RB, il di cui seno sia a quel di compimento :: $\sqrt{OR}$. $\sqrt{AO}$, di maniera che avrà un punto d'inclinamento, che sarà B: se si prende $EO = -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}ac + \frac{1}{16}aa}$, ella avrà parimente la sua lunghezza

$OB = \frac{2}{3} AE \times \frac{\sqrt{AE}}{AO} - \frac{2}{3} AO$, e per conseguenza ancora $OBCR = \frac{2}{3} AR \times \frac{\sqrt{AR}}{AO} - \frac{2}{3} AO$, perciocche in O, AE diviene AO, OB uguale a zero, & il trilineo ORBO $\frac{5}{15} OR \times OE - \frac{2}{15} OE \times OE \frac{\sqrt{OE}}{AO}$, cioè lo spazio intiero ORCBO, che'l racchiude $= \frac{2}{15} OR \times OR \times \frac{\sqrt{OR}}{AO}$.

* VIII. Se si concepisca, che'l punto R. sia indiffinitamente distante; AR, & MR, divenendo allora parallele, l'Arco AMD drizzandosi in AQ, e la Curva OST cambiandosi in Parabola di Apollonio, sommità della quale è O, e la concavità si giri verso

A 4

OR,

Fig. 4.

CR; la Curva OBC. diverrà parimente la stessa parabola cubica nell'*art. 4.* descritta; e la costruzione precedente si riduce qui a prendere lo spazio Parabolico $OES = \text{rect. } AN$; essendo il punto B, ove le rette SE, NM si ricontrano, in questa seconda Parabola cubica.

IX. Giova qui l'avvertire, che le velocità supposte (nell'*articolo 5.*) come le radici dell'altezze, non ostante il continuo cambiamento delle direzioni del peso de' corpi in quistione, non convengano a gravi di costante peso, e di variante direzione, se non se nel caso di tali direzioni parallele; e che per aver tali celerità in un continuo cambiamento delle loro direzioni concorrenti in un'istesso punto, bisognerebbero variabili pesi di essi. Ma non è questo luogo per ragionar di ciò; quantunque in tutte ipotesi di celerità l'equazion generale dell'*art. 5.* ugualmente sempre li converrebbe. Passiam dunque ad alcune osservazioni sù l'istesso affare.

OSSERVAZIONI.

X. * Per dire alcuna cosa ancora della Curva QLM, lungo la quale cadendo un corpo del punto A ugualmente in tempi uguali, si avvicini ad un' altro qualunque punto T preso a piacere su 'l piano di detta Curva, supposte le direzioni de' gravi fra di loro parallele: siano la verticale AB, e l'Orizzontale TB, che s'incontrino in B, alle quali le coordinate LO, & LH siano parallele tirate da un qualunque punto L di detta Curva: Dal centro T si descriva parimente l'Arco SI, che tagli LA indifinitamente picciola: Sia ancora $v =$ alla celerità de' corpi in L. Per tutte posizioni di T, si avrà in genera-

* Fig. 5.

nerale $v = \frac{z}{SL}$, locche dà $\sqrt{vv-1} = \frac{SL}{SL}$, e da questo (supponendo quì $AB = a$, $BT = b$, $AH = x$, & $HL = z$) nasce $\sqrt{vv-1} = \frac{xdx - bdx + adz - xdz}{xdx - adx + zdz - bdz}$ per l'equazione di detta curva QLM in qualunque ipotesi di celerità v .

XI. Donde vedesi, che qualora T si ritrovi al di sopra della curva QLM., cioè

1. Quando T sia fra detta curva, e l'orizzontale AG, l'equazione anzidetta rimane la stessa, non occorrendovi altro divario, se non se, che $AB (a)$ rimane più picciola a misura che T, ovvero BQ, è più prossima ad AG.

2. Ma quando T incontrasi nell'orizzontale AG; allora $AB (a) = 0$ cambia l'equazione su-

detta in $\sqrt{vv-1} = \frac{zdx - bdx - xdz}{xdx - bdx + zdz}$.

3. E se T si ritrovi di là di AG verso N dalla parte di G; allora AB divenuta negativa darà

$\sqrt{vv-1} = \frac{zdx - bdx - adz - xdz}{xdx + adx + zdz - bdz}$.

XII. Quando T ritrovasi dall'altro lato dell'asse AB verso XE, allora BT (b) divenuta negativa, darà.

1. Sopra, BX $\sqrt{vv-1} = \frac{zdx + bdx + adz - xdz}{xdx - adx + zdz + bdz}$.

sempre così fin sopra AE.

2. Ma quando T sarà sopra AE; allora oltre BT (b) negativa, avendo ancora AB (a) = 0, si

avrà $\sqrt{vv-1} = \frac{zdx + bdx - xdz}{adx + zdz + bdz}$.

3. E se

20 *Memoria dell' Accademia Reale*

3. E se T, dal lato di E si ritrovi al di sopra di AE verso N; allora AB (a) negativa egualmente,

che BT (b), darà $\sqrt{vv-1} = \frac{zdx + bdx - adz - xdz}{x dx + adx + zdx + bdx}$.

XIII. Se in fine T ritrovasi sopra di AB; allora BT (b) = 0 darà.

1. $\sqrt{vv-1} = \frac{zdx + adx + xdz}{x dx - adx + zdx}$ tanto se T sarà al

di sotto di A verso C, quanto se in B &c.

2. Qualora T sarà in A, avendo allora AB (a)

= 0, si terrà $\sqrt{vv-1} = \frac{zdx - xdz}{x dx + zdx}$.

3. Ma quando T sopra AB prolungata, si troverà di là verso N; allora oltre BT (b) = 0, avendo

ancora AB(a) negativa, si avrà $\sqrt{vv-1} = \frac{zdx - adz - xdz}{x dx + adx + zdx}$.

XIV. Se inoltre si suppone il punto T infinitamente dilungato, cioè LT infinita.

1. Se LT infinita ritrovasi verticale a qualche lato di AB, che rincontri XO; allora AB (a) ritro-

vandosi pure infinita, si avrà $\sqrt{vv-1} = \frac{adx - dz}{-adx - adz - dz}$,

se T è dal lato di CC, ovvero $\sqrt{vv-1} = \frac{-adx - adz - dz}{adx - dz}$,

s'egli è della parte di N, ch'è lo stesso.

2. Se LT infinita ritrovasi orizzontale; allora BT (b) nell' infinito giro darà parimente

$\sqrt{vv-1} = \frac{dx}{dz}$, in qualunque parte di AB si ritrovi

il punto T.

3. In fine se LT infinita sia obliqua all' orizzonte, allora AB (a) & BT (b) tutte due infinite dar

$$\text{daranno } \sqrt{vv-1} = \frac{-b dx + a dz}{-b dx - a dz} = \frac{b dx - a dz}{b dx + a dz}$$

(sia $p : q :: a : b$) $= \frac{q dx - p dz}{q dx + p dz}$, in cui varieranno i segni secondo i lati della obliquità.

XV. * Deve qui avvertirsi, che il caso del num. 1. dell' art. 13. espresso nella Fig. 6. è quello, che il Signori *Leibnitz*, e *Bernoulli* anno sciolti, ciascheduno con maniere proprie negli *Atti di Lipsia* del

$$1694. \text{L'equazione } \sqrt{vv-1} = \frac{z dx + a dz - x dz}{x dz - a dz + z dx} \text{ ritro-$$

vata per tal caso, è l'istessa. Perciocche dando $TH = x - a$, in tal caso, dopo di aver descritto dal centro T un qualunque semicircolo TEK, che rincontri VL in E, e da questo punto E l'ordinata EF, si faccia $TF = y$, $TE = c$, & $TL = b$, avrassi.

$$1. TE (c) TL (t) :: TF (y) TH (x-a) = \frac{y}{c}$$

Locche dà $x = \frac{y}{c} + a$, & $dx = \frac{1 dy}{c}$.

$$2. TE (c) TL (t) :: FE (\sqrt{cc-yy}) HL (z) = \frac{ccz - yyz - t y dz}{ccz - yyz - t y dz}$$

In sostituendo dunque il valore di x , dx , & dz nell' equazione anzidetta, si avrà $\sqrt{vv-1} = \frac{c \sqrt{cc-yy}}{1 dy}$

$$dz \sqrt{cc-yy}$$

Ma prendendo qui, come per ordinario la velocità (v) in L, come $\sqrt{AH}$, cioè $v = \sqrt{x}$ (num. 1.)

$$= \sqrt{\frac{y}{c}} + a, \text{ \& } a = 1; \text{ si avrà } \frac{1 dy}{c}$$

* Fig. 6.

$$\frac{dt \sqrt{cc-yy}}{(\sqrt{vv-1})}$$

$$(\sqrt{vv-1}) = \sqrt{\frac{1}{c}} + a - 1 = \sqrt{\frac{1}{c}} \text{ locche dà l'e-}$$

$$\text{quazione } \frac{dy \sqrt{\frac{1}{c}}}{\sqrt{ax-y^2}} = \frac{dt}{\sqrt{t}} , \text{ ovvero (in facendo}$$

passare per A il circolo arbitrario DEK , come ha fatto il Signor *Bernoulli* , cioè prendendo il suo rag-

$$\text{gio } c = a = 1) \frac{dy}{\sqrt{axy-y^2}} = \frac{dt}{\sqrt{t}} \text{ come l'ha egli}$$

per tal caso ritrovata dicendo x qualche noi diciamo t , e 'l Signor *Leibnitz* ancora , nominando x qualche noi diciamo y .

XVI. E' pur da avvertire , che nel caso dell' art. 13 , se invece di AH (x) si prenda TH , ovvero BH = r per ascisse ; e che in luogo di x , e di dx , si ponga $r + a$, dr , di ugual valore nell' equazione

$$\sqrt{vv-1} = \frac{xdx - adx + xdz}{zdr - zdz} \text{ di tal caso ; questa equa-}$$

zione si cambierà quì in $\sqrt{vv-1} = \frac{zdr - zdz}{rdr + ruz}$: Sic-

chè nell'ipotesi ordinaria , avendo la velocità $v =$

$\sqrt{AH} = \sqrt{r} + a$, se si faccia $a = 1$; si avrà pari-

mente $\frac{zdr - zdz}{rdr + ruz} (\sqrt{vv-1}) = \sqrt{r} + a - 1 =$
 $\sqrt{r}$, o $zdr - rds \times \sqrt{r} = rdr + ruz \times \sqrt{r}$ per l'equazione di questo stesso caso.

XVII. Questa equazione comparata con la rinvenuta nell' art. 15 , fa conoscere , che se si cambino le indeterminate r (TH) & z (HL) in due altre y (TF) & t (TL) ; e che si consideri , che K in A , ovvero TD = TA dia

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{TF } (y) \cdot \text{TH } (r) = \frac{1}{y} \\ \text{TE } (a) \cdot \text{TL } (t) :: \left\{ \begin{array}{l} \text{FE } (\sqrt{aa - yy}) \cdot \text{HL } (z) = \\ \frac{1}{a} \sqrt{aa - yy} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Si avranno due altri valori di r , e di z , quali
 fuffituiti nel di loro luogo in queſta equazione
 $zdr - r dz \sqrt{a} = r dr + z dz \sqrt{r}$, dell' art. 16,
 la cambieranno nella precedente $\frac{dz}{\sqrt{aa - yy}} = \frac{dz}{\sqrt{r}}$

dell' art. 15., in cui le indeterminatè non ſono più
 meſcolate, ma diviſe in modo, che rendefi facile
 la coſtruzione per quadrature, o rettificazioni di
 curve.

XVIII. * L' equazione $\sqrt{vv - 1} = \frac{dx}{-dx}$ del
 num. 1. dell' art. 14. per quel caſo, nel quale cadendo
 il corpo da AG lungo la curva ricercata, deve av-
 vicinarſi, o diſcoſtarſi egualmente dall' orizzonte,
 dà parimente la parabola quadratocubica, come
 ſopra ſi è ritrovata nell' art. 4. & 8. ſecondo l'ipoteſi
 ordinaria delle velocità de' corpi cadenti: Poicchè
 dando tal ipoteſi la celerità $v = \sqrt{AH} = \sqrt{x}$, ſi
 avrà $\frac{dz}{-dx} (\sqrt{vv - 1}) = \sqrt{x - 1}$, ovvero (aſſu-

mendo quì $p = 1$.) $dz \sqrt{p} = -dx \sqrt{x - p}$, la
 di cui integrale è $-z \sqrt{p} = \frac{2}{3} (x - p)^{3/2}$, o più pro-
 priamente $z p^{3/2} = x - p^3$ (ſia $x - p = n$) $= n^3$,
 ficcome ſinora ſi è ritrovato, ſenz' altro divario,
 che quì le ordinate (z) faran negative.

Ma ſe fuſſe indifferente il punto dell' orizzonta-
 le AG, donde debba cadere il corpo, e che la di-
 ſtan-

* Fig. 5.

Ranza arbitraria da questo punto al punto A fusse $= e$ costante; l'integrale di $-dz\sqrt{p} = dx\sqrt{x}$ — p si ritroverebbe essere ancora $e \rightarrow x\sqrt{p} = \frac{1}{2} x^2 - p^2$, cioè (facendo ancora $x - p = n$, & $e = z = m$) $m\sqrt{p} = \frac{1}{2} n^2$, ovvero $2pm = n^2$, che sprirebbe ancora la stessa parabola quadrato cubica situata solamente sopra di un asse verticale distante da AB del valore di e ; di modo che queste due parabole alligate similmente sopra de' loro assi paralleli, farebbero ancora tra di loro parallele, e le sommità ugualmente distanti (p) nell'orizzontale AG; qual distanza dividerebbe l'altezza delle cadute, proprie a dare quelle velocità a' corpi, che si suppongono muoversi lungo le curve, con le quali dovriano cominciare dalle sommità loro, per egualmente accostarsi in tempi eguali all'orizzonte XO.

XIX. Per quel che si attiene all' equazione

$\sqrt{vv-1} = \frac{dx}{dz}$ del num. 2. art. 14. se si sostituisca,

come per ordinario $\sqrt{x-1}$, per $\sqrt{vv-1}$; si avrà

$\sqrt{x-1} = \frac{dx}{dz}$, ovvero $dz = \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$, integral di cui

è $z = 2\sqrt{x-1}$, ovvero $zz = 4x - 4$, cioè (prendendo ancora $p = 1$) $zz = 4px - 4pp$ (sia ancora $n = x - p = 4pn$, quale è luogo ordinario alla parabola: Donde si vede, che un corpo, qual cadesse lungo la convessità di questa curva, cominciando dalla sua sommità con una velocità uguale a quella, che, in cadendo dal quarto dell' altezza del parametro di detta curva, acquisterebbe, egli ugualmente in tempi uguali si discosterebbe dal suo asse verticale: Appunto quello, che Galileo avea supposto, per provare, che questa curva sarebbe quella,

la, che i corpi gravi scagliati orizzontalmente nel vuoto, descriverebbero.

XX. Devesi in fine avvertire, che questa ultima parabola, non si ritrovi esser la curva richiesta, se non se in questo, che i tempi presi in ragione alle distanze dal punto T al corpo, che la descrive, sono quì, come i dilungamenti di detto corpo all'asse di tal curva: Locche fa, che qualora nell'infinito allontanamento di tal punto, LT si ritrova obliqua all'orizzonte; l'equazione di sopra (num. 3. art. 14.) $\propto$ riguardo all' avvicinamenti a questo stesso punto, non si atterrebbe alla parabola, benché ridotta all'ipotesi del Galileo; Bisognerebbe perciò prendere i tempi sopra LT *, come i scostamenti del suo asse a' corpi, che le descrivessero. Per cagion di esempio (oltre al LS perpendicolare sopra LT sia LZ parallela ad AB) invece degl'istanti $dt = LS$ sinora presi, converrebbe prendere $dz = LZ$; ed allora la curva QLM farebbe qui ancora una vera parabola conica, o del primo genere.

In fatti (rimanendo tutto, come quì sopra con RIV parallela ad AG) la ragione costante di LR (dx) ad RV , per cagion d'esempio: $: p . q$, darebbe $RV = \frac{qdx}{p}$, e così per $LV = \frac{p}{q} \sqrt{pp + qq}$ (sia $nn = pp + qq$) $= \frac{p}{q} \sqrt{nn}$. Ma $RV \left(\frac{qdx}{p} \right) . Rl (dt) :: LV \left(\frac{p}{q} \sqrt{nn} \right) . Lz (dz) = \frac{p}{q} \sqrt{nn} dz$. Di più $Ll = \sqrt{dx^2 + dz^2}$. Dunque, avendo in generale la velocità $\frac{Ll}{dt} = \frac{q \sqrt{dx^2 + dz^2}}{ndt}$, si avrà parimente $v = \frac{q \sqrt{dx^2 + dz^2}}{ndt}$ per tutte le ipotesi immaginabili di velocità; Siccho
fa.

* Fig. 7.

facendo $v = \sqrt{x}$ secondo Galileo, si avrebbe in

fine $\sqrt{x} = \frac{q\sqrt{dx^2 + 4x^2}}{ndx}$. Quale equazione si ridu-

ce ad $ds = \frac{ndx}{adx}$, di cui l' integrale è $z = \frac{2q}{nn} \sqrt{mx - 4q} \left(\text{sia } y = x - \frac{4q}{nn} \right) = \frac{2q}{n} \sqrt{y}$, ov-

vero $z = \frac{pp + 4q}{nn}$: qual ancora è un luo-

go della parabola ordinaria. Questo pur si accorda con la dottrina del Galileo intorno alla curva, che descriverebbero i corpi gravi obliquamente scagliati nel vuoto, donde deducesi ancora l'art. 19, per lo caso delle proiezioni orizzontali, nel quale q si ritroverebbe infinita.



* G I U N T A

ALLA MEMORIA PRECEDENTE,

Intorno alla maniera di ritrovar le curve, lungo le quali cadendo un corpo si avvicini, o discosti dall'orizzonte, o da qualunque punto dato in quella ragion di tempi, & ipotesi di velocità, che si vorrà mai.

† **A** Llòrache io diedi il Metodo contenuto nella prima Memoria dell'Accademia dell'anno 1699. per ritrovar le curve lungo le quali cadendo un corpo, si avvicinasse, o discostasse dall'orizzonte, o da qualunque punto dato in quella ragion di tempi, & ipotesi di velocità, che si vorrebbe mai, egli mi parve tanto più generale, quanto che fino a quel tempo si erano scoverte tali sortì di curve solamente nel caso degli accostamenti uguali in tempi pur uguali ad un punto preso nell'asse di ciascuna di dette curve, secondo la sola ipotesi del Galileo sù l'acceleramento de' corpi, che cadono; quandocchè per detto Metodo io le dava nelle Memorie, non solamente per tali ipotesi di velocità, e di tempi a piacer presi; ma per quegli accostamenti ancora del mobile ad un tal punto a voglia assunto nel piano di detta curva: Frattanto, come che generale questo sia, egli è chiaro, che molto più lo sarebbe, se si prendesse detto punto fuori del piano dell'istessa curva; perciocchè annullando sua distanza da questo piano; tutto ciò che nella

* Quest'aggiunta si ritrova nell'edizione di Parigi alla pag. 140. delle Mem. del 1701.

† 1703. 30. Giugno. B

le Memorie del 1699. contienfi, didurrebbesi in Corollarj. Eccovi dunque questo ancora generale, e come se ne deduca il già detto nelle Memorie.

P R O B L E M A.

Ritrovare una curva QLM, lungo la quale cadendo un corpo da qualunque punto A dell' arco circolare EAG descritto dal centro C su'l piano di questa curva, si avvicini in tal ragione di tempi, che avverrà, al punto T preso a piacere, anche fuori di detto piano per maggior generalità; qualunque siano le velocità di tali corpi, in cadendo, ed in qualunque punto C di detto piano, concorrano le direzioni, non potendo altroue.

* I. Sol. Dal punto T al punto A, donde e' si suppone, che cada il corpo, si tiri la retta AT, e la retta TL per tal punto L della ricercata curva QLM, che si vorrà; indi dal centro T per L sia l'arco LK, che determini (sopra AT) gli avvicinamenti AK del mobile L al punto T, in cadendo da A lungo questa curva: In oltre dopo di aver tirata TD perpendicolare in D al piano di detta curva, con due ordinate CG, Cg, l'una all'altra infinitamente prossime, le quali incontrino la curva QLM, in L, l, e l'arco circolare EAG in G, g; siano parimente DF, Df perpendicolari sopra di dette ordinate CG, Cg: In fine dopo di aver tirata la retta DL, siano dal centro C gli archi DOBX, LH, lR, e dal centro T per l, gli archi lS, & lk, li quali rincontrino TL, e TA in S, & in k.

II. Fatto ciò: si dichino AB, *a*, DOB, *b*, AC, ovvero GC, *c*, AT, *f*, TD, *h* costanti; sian chiamate ancora CF, *m*, DF, *n*, LF, *p*,
AK

* Fig. I.

AK, r , AG, z , AH, ovvero GL, x , CH, ovvero CL, y , i tempi, che s'impiegano dal mobile nel cadere da A in L, t , la velocità in L, v , e queste tutte variabili. Quindi $C - x = y$, $y - m = p$, e conseguentemente ancora $-dz = dy$, $dy - dm = dp$.

III. Secondo questi art. 1. e 2. si avrà $\overline{TK}^2 = \overline{TL}^2 = \overline{TD}^2 + \overline{DL}^2 = \overline{TD}^2 + \overline{DF}^2 + \overline{FL}^2 = bb + mm + pp$. Dunque AK (r) = $f - \sqrt{bb + mm + pp}$, & Kk, ovvero LS

$$(dr) = \frac{ndn + pdd}{\sqrt{bb + mm + pp}} \quad (\text{dando l'art. 2. } dp = dy - dm)$$

$ndn + pdy - pdm$ positive, poiche AK, e TK, ovvero $\sqrt{bb + mm + pp}$

TL alternatamente crescono: Di modo che se (per abbreviare) si prenda $q = \sqrt{bb + mm + pp}$, si avrà

$$r = f - q, \text{ e } dr = \frac{-ndn + pdy - pdm}{q}$$

Ma GC (c) : FC (m) :: Gg (dz). FZ ($-dn$) = $\frac{g}{m} dz$, ed FC (m) . Df.

$$(n) :: FZ (-dn) . fZ (dm) = \frac{-ndn}{m} = \frac{ndz}{c}, \text{ pren:}$$

dendo dall'una, e dall'altra parte dn negative, perocche AG (z), e CP. (m) crescono, mentre FD (n) diminuisce; dunque sostituendo i valori di dn , e di dm , in dz , nel valor precedente di dr , si avrà

$$\text{parimente } dr \text{ (Kk ovvero LS)} = \frac{-mndz + cpdy - pndz}{\sqrt{bb + mm + pp}}$$

$$(\text{dando l'art. 2. } p = y - m) = \frac{cpdy - nydz}{\sqrt{bb + mm + pp}}$$

IV. Avendo inolre RL = $\frac{dy}{ydz}$, e Cg (c) . Cl (y) :: Gg (dz) . Rl = $\frac{c}{y}$. Si avrà ancora

B a L l

$Ll = \frac{\sqrt{ay^2 + xz^2}}{v} = \frac{\sqrt{ccdy^2 + xz^2}}{v}$: Ma secondo l' art. 2., avendo v per la velocità del mobile per Ll , e dt per l'istante impiegato a scorrere questo elemento ; si avrà in generale $dt = \frac{Ll}{v} = \frac{\sqrt{ccdy^2 + xz^2}}{v}$.

Dunque secondo qualunque proporzione di tempi (t), che si regolino gli accostamenti $AK(r)$ del mobile L al punto T , ovunque si vorrà sito, il valore di dt in r , ed in dr , risultante da tal supposizione, sarà $= \frac{\sqrt{ccdy^2 + xz^2}}{v}$; Sostituendo perciò i precedenti va-

lori (art. 3.) di r , e di dr in questo di dt , ne risulterà un' altro $= \frac{\sqrt{ccdy^2 + xz^2}}{v}$. Equazione,

che diverrà quella della Curva QLM propria a tal effetto, col sostituir solamente il valore di v , secondo il quale si vorrà regolare la velocità de' corpi, che si suppongono cadere lungo tal Curva . *Lo che*
è c.

E S E M P J.

V. Per venire al particolare : si richiegga (se e' si voglia) che gli accostamenti $AK(r)$ del mobile L al punto T , siano nella ragione de' quadrati de' tempi (t) , cioè $r = tt$, ovvero $t = \sqrt{r}$; in questo caso avendo $dt = \frac{dr}{2\sqrt{r}}$ (art. 3.) $= \frac{cdy - xdz}{2\sqrt{r}}$; si avrà parimente (art. 4.) $= \frac{2cdy\sqrt{1-q}}{\sqrt{ccdy^2 + xz^2}}$

$$\frac{c p d y = n y d z}{2 c \sqrt{f-y}}, \text{ ovvero } v = \frac{2 q \sqrt{f-y} \times \sqrt{c c d y^2 + y y d z^2}}{c p d y - n y d z} \text{ per}$$

l'equazione della Curva QLM richiesta nell'ipotesi di $r = e e$, sostituendoli il valore v , cioè i valori delle velocità prese ancora ad arbitrio: Sicche in supponendo, che le velocità (v) sianò, se così piaccia, come le radici delle altezze AH, ovvero GL ($c - y$) delle cadute, cioè $v = \sqrt{c - y}$, non bisognerà altro, che sostituire questo valore di v dell'equazione precedente, per renderla quella della Curva QLM, che in uno soddisfa a dette due ipotesi. Così delle altre all' infinito, senz' alcuna differenza, se non se nella difficoltà del calcolo.

Si avverta, che se sian prese le velocità (v) nella ragion de' tempi (t), cioè $v = t = \sqrt{r}$; allora

$$\text{tolto ne verrà (art. 4) } \frac{\sqrt{c c d y^2 + y y d z^2}}{e v} = d t = \frac{d r}{2 \sqrt{r}}$$

$$= \frac{d r}{2 v} \text{ (art. 3.)} = \frac{c p d y - n y d z}{2 c v q}, \text{ cioè } \sqrt{c c d y^2 + y y d z^2}$$

$= \frac{c p d y - n y d z}{2 q}$, per l'equazion della Curva QLM, lungo la quale cadendo un corpo L dal punto A, gli avvicinamenti (AK) di tal corpo al punto T, non solamente saranno come i quadrati de' tempi (t) impiegati a cadere da A fino ad L; ma ancora come i quadrati delle velocità (v), che avrà in L, secondo L.

VI. Supponiamo ora, e per tutto quel che siegue, che gli accostamenti AK del mobile L al punto T, in cadendo lungo la curva ricercata QLM, debbano all'Intutto essere secondo i tempi, cioè uguali in tempi uguali, secondo l'ipotesi ordinaria: e

si tratta di ritrovare detta Curva QLM per tutte le possibili ipotesi di acceleramento delle cadute, o delle velocità (v) del corpo L, in qualunque punto C del piano di detta Curva le direzioni sue concorrano, e qualunque siano le posizioni di detto piano, e del punto T rispetto a questo istesso piano.

Questa ipotesi degli accostamenti AK (r) in ragion de' tempi (t), dando dr (Kk, ovvero LS)

$$= dt, \text{ si avrà parimente (art. 3. e 4.) } \frac{cpdy - nydz}{\sqrt{ccdy^2 + yydz^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{ccdy^2 + yydz^2}}{cq}, \text{ ovvero } v = \frac{q\sqrt{ccdy^2 + yydz^2}}{cpdy - nydz} \text{ (l'art. 3.)}$$

$$3. \text{ da } q = \sqrt{bb + mm + pp} = \frac{\sqrt{bb + mm + pp} \times \sqrt{ccdy^2 + yydz^2}}{cpdy - nydz}$$

per l'equazione della Curva richiesta QLM, la quale tutto che particolare ella sia, riguardo a quella dell' artic. 4., pur si diversificherà, secondo le differenti posizioni de' punti C, T, e secondo la infinita varietà delle velocità, che possono supporfi nel corpo L, in cadendo lungo la cennata curva, quale seguitando, deve egli avvicinarsi sempre ugualmente al punto T in tempi uguali. Sicche tutta la precedente Memoria, generale che ella sia, non è, se non se un caso di questo articolo, a riserva dell' equazioni degl'articoli 2. e 5. di detta prima Memoria, che riducesi a quella dell' articolo 4. di questa.

VII. Se si voglia, che T sia in C; allora il punto D ritrovandosi ancora in C, le rette TD (b), DF, (n), CF (m), si ritroveranno tutte $= 0$, e per conseguenza $p(y - m) = y$: l'equazione precedente

$$\text{(art. 6.) si ridurrà quì ad } v = \frac{y\sqrt{ccdy^2 + yydz^2}}{cydy} =$$

$$= \frac{\sqrt{ccdy^2 + y^2u^2}}{cdy}, \text{ ovvero a } dy = \frac{\sqrt{ccdy^2 + y^2dz^2}}{cv}$$

(art.2.) = $\frac{cv}{\sqrt{ccdx^2 + c-x \wedge dz^2}}$. Ma l'art.4. darebbe

$$dt = \frac{cv}{\sqrt{ccdx^2 + c-x \wedge dz^2}} \text{ senza fissare } dt, \text{ quale equa-}$$

zione è l'istessa, che quella dell'art.5. pag.5. della Memoria precedente, col divario, che qui si dice t , e z , quello, che ivi si chiama z , & y .

VIII. Se si voglia, che il punto T sia pur nel piano della richiesta Curva QLM, ma in tal punto D, a piacere determinato in detto piano, che'l concorso C delle ordinate LC, IC &c. di tal Curva sia infinitamente distante, cioè, che dette ordinate sian tra di loro parallele; allora avendo pure TD (b), = o , di più CL (y) infinita, come AC (c); l'ultima equazione dell'artic.6. si cambierà quì in

$$v = \frac{\sqrt{nm + pp} \times \sqrt{dy^2 + dz^2}}{pdy - ndz}; \text{ locche da } vv - 1 = \frac{mndy^2 + ppdz^2 + npdydz}{pdy - ndz}, \text{ ovvero } \sqrt{vv - 1} = \frac{ndy + pdz}{pdy - ndz}.$$

Ma questo caso del punto infinitamente dilungato, rendendo gli Archi EAG, HL, DOBX linee rette perpendicolari alle ordinate parallele AC, LC &c.; e cambiando in tal guisa la Fig.1. di questa giunta con quella dell'artic.10. pag.8. e della Memoria precedente, si ritrova BO=HL=AG= z , & DF (n) confusa con DO, & LF parimente con LO; locche fa (art.2.) $n=b-z$, $p=a-x$, & $dy=-dx$.

Sostituendo dunque questi valori di n , p , e dy ,

nell'ultima delle precedenti equazioni; si avrà ancora $\sqrt{uv} = \frac{(ndy + pdz)}{(pdz - ndz)} = \frac{-dx \times b - z + dz \times a - x}{-dx \times a - x + dz \times b - z}$

$zdx = bdx + ndz - xdz$, quale precisamente è la stessa $zdx = adx - bdx + zdx$

di quella dell'art. 10. pag. 8. della suddetta Memoria. Donde per conseguenza didurrassi ciocche n'è stato didotto in essa Memoria, qual si vede nascere dall'art. 4. della soluzione del precedente Problema.

OSSERVAZIONI.

IX. Si avverta, che in tutto ciò il valore arbitrario di v permette, che non si ponga mente alla direzione del peso del mobile; e che nell'art. 5. pag. 5. della precedente Memoria, ove l'ho supposto sempre drizzarsi in C, come ancora nell'art. 10. pag. 8. dell'istessa Memoria, dove l'ho supposto tendere secondo le direzioni parallele AC, poteva io non avere alcun riguardo a dette direzioni; non bisognandomi quì altro, che le velocità (v), quali si presuppongono.

X. Si avverta ancora, rispetto al caso dell'articolo 7., che in facendo $v = \sqrt{x}$, si avrà parimente

$$\frac{\sqrt{ccdx^2 + c - x^2} \times dx^2}{c\sqrt{x}} = dy \text{ (art. 2.)} = -dx, \text{ ovve-}$$

ro $ccdx^2 + c - x^2 \times dx^2 = ccxdx^2$: donde resul-

$$ta dz = \frac{cdx\sqrt{x}}{c-x} x, \text{ ovvero (in supponendo}$$

$$a = 1) adz = \frac{cdx\sqrt{ax-aa}}{c-x}, \text{ come nell'art. 5.}$$

pag. 5. della Memoria precedente; eccetto che qui diceli dz , quel che ivi si dice dy .

Nella costruzione data della Curva, che sprime questa equazione nello stesso luogo delle Memorie, io mi era contentato di ricercare l'inclinamento, e sotto qual'angolo incontrisi col suo Asse: Ma il Sig. Bernoulli Professore in Groninga avendomi scritto, di avere egli osservato di più, che questa Curva facesse un'infinità di rivoluzioni prima di giugnere al suo centro; io ancora l'ho ritrovata col di lui * Metodo per integrare le frazioni ragionevoli, presentato all'Accademia a 12. Dicembre 1702, e con altro metodo ancora, che da molto tempo io ho, per descrivere tutte sorti di spirali in infinito.

XI. Comincio dalla soluzione, che col metodo del Sig. Bernoulli, venutomi prima, ho fatta.

1. Sia $s = \sqrt{ax - a^2}$, ovvero $x = \frac{s^2 + a^2}{a}$; e per conseguenza $dx = \frac{2s}{a} ds$. Egli è chiaro, che la sostituzione de' valori di x , e di dx nella precedente equazione $a dz = \frac{cdx \sqrt{ax - a^2}}{2s + ds}$; la cambierà in $a dz = \frac{c ds}{c - s}$. Ma per rendere $ac - aa = 1$, bisogna considerare, che la grandezza a , quì sopra (art. 10.) presa per unità, essendo arbitraria; Puol'essere ancora assunta per $\frac{1}{2}c$; Nel qual caso avrassi $\frac{1}{2}c = a = 1$, locche rende in fatti $ac - aa = 2 - 1 = 1$, &c; $c dz = \frac{2cds}{2 - s}$. Dunque in tal caso si

avrà

* Vedi nelle Memor. del 1702. la solut. di un Problema intorno al calcolo integrale del Sig. Bernoulli.

avrà ancora $dz = \frac{4ssds}{3-s} = -4ds + \frac{2ds}{1+s} + \frac{2ds}{1-s}$; Et integrando $z = -4s + 2l \frac{1+s}{1+s} - 2l \frac{1-s}{1-s} = -4s + 2l$, ovvero $z + 4s = 2l = 2l^{\frac{1}{2}c+s}$ per una nuova equazione della Curva ricercata, prendendo sempre $\frac{1}{2}c$ per unità, il di cui logaritmo è zero, dinotando quì la lettera l *logaritmo*, siccome d significa *differentiale*.

2. Per ritrarre presentemente una equazione scorrente della stessa Curva; sia n numero, l'unità del quale (s , ovvero $\frac{1}{2}c$) è il costante logaritmo, e per conseguenza $ln = 1$; avendo allora $z = s \times ln$, & $4s = 4s \times ln$, si avrà parimente (num. 1.) $z \times ln +$

$$4s \times ln = 2l^{\frac{1}{2}c+s}, \text{ ovvero } l^{\frac{1}{2}c+s} = ln^z + ln^{4s} = ln^{z+4s}, \text{ ovvero } \frac{1}{\frac{1}{2}c-s} = n^{z+4s}, \text{ o in fine } \frac{1}{\frac{1}{2}c-s} = n^{\frac{1}{2}z+2s} \text{ per l'equazione corrente della Curva richiesta.}$$

3. * Quindi si vede, che nel caso di $s=0$, cambiando equazione in $1=n^{\frac{1}{2}z}$, fa ancora z ($AG=0$), in vece di $n^{\frac{1}{2}z}=1$, e per conseguenza questa Curva QLM deve incontrare la retta AC nel punto O, nel quale confondendosi il punto H con L, deve ancora dare $AO(x) = b = \frac{1}{2}c = \frac{1}{2}AC$, poicche allora

$$(\text{num. 1.}) x = \frac{ss+aa}{e} = a \frac{aa}{e} = a = \frac{1}{2}c, \text{ siccome si è}$$

detto

detto nell'art.7. pag.6. delle Memorie del 1699.

4. Ma se suppongasi $s = \frac{1}{2}c$; & in conseguenza

$$(\text{num.1.}) x = \frac{\frac{1}{2}cc + aa}{a} = \frac{\frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}cc}{\frac{1}{2}c} = c, \text{ cioè H in C;}$$

allora la precedente equazione scorrente $\frac{c}{\frac{1}{2}c+s} =$

$$n^{\frac{1}{2}z+2s} \text{ del num.2. , cambiandosi in } \frac{c}{\frac{1}{2}c-s} = n^{\frac{1}{2}z+c}, \text{ e}$$

rendendo quindi $n^{\frac{1}{2}z+c}$ infinita, tuttoche n , & c siano finite (per ipotesi); bisogna, che la variabile z (AG) sia allora effettivamente infinita, e che la Curva QLM faccia quì un'infinità di rivoluzioni, prima di giugnere in C, & incontri il suo Asse sotto l'angolo con l'ultima CL, che io ho divisato nell'art.7. pag.8. della Memoria cennata, ove leggasi :: $\sqrt{OR}:\sqrt{AO}$ in vece di :: $\sqrt{AO}:\sqrt{OR}$, * e con l'ultima RB, che quì deve dirsi :: $\sqrt{OC}:\sqrt{AO}$ qualunque sia la ragione di OC ($c-a$) ad AG (a).

5. L'ultima equazione $z + 4s = 2l \frac{\frac{1}{2}c+s}{\frac{1}{2}c-s}$ del

num.1. pruova ancora, che l'origine della Curva QLM, che ella esprime, deve ritrovarsi su la retta AC in alcun punto O, che quì dona $AO = \frac{1}{2} AC$, e che questa istessa Curva non deve giungere in C, se non dopo di aver fatta una infinità di rivoluzioni intorno a tal punto.

In fatti, se primieramente suppongasi $s=0$, quest'ultima equazione del num.1. cambiandosi in $z = 2l \frac{\frac{1}{2}c}{\frac{1}{2}c} = 2l \frac{1}{2} c - 2l \frac{1}{2} c = 0$ AG (a) deve esser zero.

10,

* Questo errore è corretto in questa edizione.

ro, & in conseguenza la Curva QLM deve allora incontrare la retta AC in qualche punto O, che dona $AO = \frac{1}{2} AC$, come nel num. 3.

Allo 'ncontro, se supponghasi $s = \frac{1}{2}c$, cambiando la stessa equazione del num. 1. in $z + 2c = 2l - \frac{c}{z}$ infinita, per allora avrà z (AG) infinita, essendo tutto il di più finito (*ipotesi*); locche pruova, che la Curva QLM (num. 4.) deve fare una infinità di rivoluzioni, prima di giugnere in C.

6. Oltre a ciò l'equazione $z + 4s = 2l - \frac{c}{z}$ del num. 1. suggerisce ancora una maniera di descrivere questa stessa Curva, altrettanto facile; quanto si è il cambiare questa equazione in $z = -4s + \frac{2l}{\frac{1}{2}c + s}$ (num. 1.) $= -4\sqrt{ax - aa} + 2l \frac{\frac{1}{2}c + \sqrt{ax - aa}}{\frac{1}{2}c - \sqrt{ax - aa}}$

$= -4\sqrt{\frac{1}{2}cx - \frac{1}{4}cc} + 2l \frac{\frac{1}{2}c + \sqrt{\frac{1}{2}cx - \frac{1}{4}cc}}{\frac{1}{2}c - \sqrt{\frac{1}{2}cx - \frac{1}{4}cc}}$; di

qualunque grandezza, che si prenda AH (x) fra c , & $\frac{1}{2}c$; nè occorre altro, che far l'Arco AG (z) $= -4\sqrt{\frac{1}{2}cx - \frac{1}{4}cc} + 2l \frac{\frac{1}{2}c + \sqrt{\frac{1}{2}cx - \frac{1}{4}cc}}{\frac{1}{2}c - \sqrt{\frac{1}{2}cx - \frac{1}{4}cc}}$; & il pun-

to L, ove la retta CG farà dall'Arco HL descritto dal centro C per H, rincontrata, farà uno de' punti della Curva QLM, e così degli altri all'infinito.

XII. Ecco presentemente l'altra maniera di costruire la stessa Paracentrica QLM, e di far vedere, che debba ella effettivamente fare infinite rivoluzioni, prima di giugnere in C.

1. Immaginiamo perciò un'altra Curva KV, sopra

sopra l'Asse AC, le di cui coordinate siano le variabili $HK=k$, & $CH=y$ (art. 2.) $=c-x$, li nomi di $AC=c$, di $AH=x$, come ancora, che l'Arco della rivoluzione AG, ovvero AG + tal numero di rivoluzioni compiute, che si vorrà $=z$ &c., rimanendo il di più, come nell'art. 2. Siano inoltre le costanti e al circuito intiero del circolo AGEA, & $g=$

alla retta arbitraria AP; & in fine $dk = \frac{cgdx \sqrt{ax-aa}}{acc-ax}$

sia l'equazione della Curva KV, quale si vede, che in C deve avere la sua ordinata k (CV) per asintota, $x=c$ rendendo lvi questa ordinata infinita, & esser toccata in O dalla retta AO= a , avendo dx infinita riguardo a dk in questo punto O della retta AC.

2. Sia dopo di ciò preso l'Arco AG (z) AGEA(e); HK (k). AP. (g) cioè z (AG) $= \frac{ek}{g}$; sia indi il raggio

CG rincontrato in L dall'Arco HL descritto del centro C per H. Posto ciò, dico, che'l punto L ritrovato in questa maniera, sia uno di que' della Paracentrica richiesta; o, (che è lo stesso), che la Curva QLM, quale passerà pur tutti i punti L, che differenti ordinate HK (k) della Curva OKV possono dare, sarà la Paracentrica stessa, che bisognava costruire.

In fatti avendo quì $z = \frac{ek}{g}$, è chiaro, che si avrà parimente $\frac{gdx}{e} = dk$ (num. 1.) $= \frac{cgdx \sqrt{ax-aa}}{acc-ax}$;

ovvero $dz = \frac{cdx \sqrt{ax-aa}}{ac-ax}$ per l'equazione della Curva QLM così descritta, quale equazione è parimente (art. 10.) quella della Paracentrica desiderata.

rata. Dunque la Curva QLM è la stessa Paracentrica, che si doveva descrivere.

3. Essendò così, è egli ancor chiaro, che questa Paracentrica debba essere una spirale, che non giugnerà in C, se non se dopo di una infinità di rivoluzioni; poicche l'ordinata CV (k) infinita (num. 1.) in questo punto C deve rendere ancora infinito l'Arco della rivoluzione AG (z) corrispondente, quale (num. 2.) l'è sempre proporzionale.

4. Si vede ancora (num. 1.), che HK annullandosi in O, deve detta spirale cominciare da tal punto O, & avere $AO=a$ per tangente, avendo la sua equazione (num. 2.) dx infinita, riguardo a dz in detto punto, cioè dz nulla in questo punto riguardo a dx .

Accorda tutto ciò con l'Artic. 11., locche rimaneva a dimostrarsi.



O S S E R V A Z I O N I

DELL' ECLISSE DELLA LUNA

Avvenuta a' 15. di Marzo 1699.

DEL SIGNOR CASSINI.

* **S**U' l Terrapieno del luogo destinato alle osservazioni astronomiche, si erano apparecchiati i necessarj strumenti, per osservare l'Eclisse della Luna de' 15. Marzo di quest'anno 1699., perche potevasi indi vedere il Sole, & la Luna nell'orizzonte: Questo apparecchio però fu inutile; poiche l'orizzonte era ingombro da nugole, che impedivano la veduta del Sole nel tramontare, & della Luna nel suo sorgere. Osservammo dunque la Luna dalla Torre orientale, mentre era già innalzata un grado, & mezzo sù l'orizzonte, & uscita da dette nugole, quale avea la sesta parte della sua circonferenza orientale, oscurata, quantunque a gran pena potessero dividersi i termini dell'ombra nell'orbita della stessa, cadendo questa sù la gran macchia, qual sembrava, che la dilungasse di vantaggio.

Passavano ancora oscure nugole per davanti, che in parte l'ascondevano, & impedivano la veduta distinta delle macchie, se si avessero pur voluto paragonar con l'ombra.

Non vi essendo cosa più notabile, quantoche i punti dell'Eclisse, si cominciò a riscontrar questi tra essi, e col diametro della Luna, quale secondo

a. 18. Marzo 1699.

do il suo movimento cadeva ver l'occidente; e ciò si eseguì, facendo passare l'estremità della Luna, & i punti dell' Eclisse per i fili verticale, ed orizzontale del cannocchiale, assestato su'l quadrante; Avendo prima registrato un pen dolo, di cui distintamente si contavan i secondi, per misurare il tempo di tal passaggio.

In questo modo si determinarono molte fasi con la maggior prestezza, che si potè, per compararle con quelle, che prima del finir dell' Eclisse, si potrebbero mai osservare, e ricercar con ciò il tempo medio, che tra le fasi eguali in ugual distanza si frapone, e più esattamente si determina col confronto di quelle, che in poco tempo più sensibilmente variano; come appunto avviene di quelle, che son prossime al cominciare, e finire di detta Eclisse.

Si raccolsero dunque moltissime di queste osservazioni, per quali riscontrare insieme, e ridurre, vi abbisogna del tempo. Questo metodo, qual per altro è 'l più alla mano nelle osservazioni, e più lungo nell' uso, parve il più confacevole, mentre che la Luna era prossima all' orizzonte, dove ella è trasfigurata dalle refrazioni, che non han vigor di cambiare così alcun obietto verticale, con tutto che siano le stesse nel medesimo circolo orizzontale, ove tutte le parti della Luna impiegano lo stesso tempo a passarle, che vi porrebbero, se non vi fossero refrazioni: Questo non avviene nel traggitar la Luna pe' fili obliqui, ne' quali, essendo diverse parti in differenti altezze, soffrono differenti refrazioni, e sminuiscono le differenze dell' altezza.

Non ci ristettimo però dall' osservare le differenze de' passaggi per lo circolo orario con un can-

nocchiale affettato sopra la Machina Parallattica, e precisamente nella più grande altezza, dove noi più fiate osservammo, che la Luna trapassava in 2'. 10". presso quasi un secondo a quello, che impiegava il Sole a passarvi lo stesso giorno, e l'altro appressa: Locche non dà la stessa grandezza apparente, quantunque i tempi di tali passaggi del Sole, e della Luna fossero perfettamente uguali; poicche il tempo del passaggio della Luna ha minor proporzione al tempo del suo ritorno al meridiano, quale in detto giorno era di 24^h. 48'. ; che 'l passaggio del Sole al suo ritorno nel meridiano, quale è di 24^h.

Il tempo dunque della rivoluzione diaria della Luna da oriente ad occidente in tal' giorno era al tempo della rivoluzione del Sole, come 31. a 30., e li diametri apparenti dell'uno, e dell'altro misurati sù le loro parallele in ragion reciproca.

La Luna si eclissò fino ad otto dita, e mezzo, o poco meno, come più precisamente si vide dal passaggio, verso il tempo medio osservato, prima del quale non ben si distinguevano le macchie della Luna. Ecco qualche osservammo noi più distintamente con cannocchiale di 17. piedi; giacche i più corti di questi non distinguevano bene le macchie.

A 7^h. 5'. vedevansi nell'orlo dell'ombra al di fuori le macchie distinte, che sono nell'imboccatura del *Mare humorum*, dopo *Gassendi*, che non ben distinguevali. *Fràcastoro* era distante dall'ombra quanto portava il suo diametro.

Si notaron l'ore nell'orologio, che andava tardi in 46"., e si rimise a pelo.

6^h. 54'. 46". L'ombra nel *Promontorio acuto*.

7. 9. 57. L'orlo di *Langreno* sù l'orlo dell'ombra.

C

7^h.

34 *Memoria dell' Accademia Reale*

- 7^h. 13. 46. L'orlo Meridionale di *Grimaldo* cominciava ad uscire dall'ombra.
7. 13. 46. *Fracastore* era ancora distante dall'ombra, quanto il suo diametro portava.
7. 18. 20. La metà di *Grimaldo* fuori dell'ombra.
7. 18. 46. L'orlo chiaro di *Fracastore* tocca l'ombra.
7. 23. 25. *Petavio* all' orlo dell' ombra, questa non era così oscura, che non si distinguessero al di dentro le macchie eclissate molto distanti dal suo orlo.
7. 28. 17. *Fracastore* comincia ad uscir dall'ombra.
7. 31. 46. L'orlo di *Ticone* più vicino al centro, era distante dall' ombra altrettanto, che dall' orlo più prossimo della Luna.
7. 34. 46. *Langreno* comincia a comparire.
7. 36. 47. *Galileo* esce dall' ombra, e 'l *Promontorio Meridionale* dell' Isola di *Keplero*.
7. 42. 48. Tutto l'orlo Meridionale dell' *Isola* di *Keplero* è fuori dell'ombra.
7. 43. 48. *Langreno* è ancora all' orlo dell' ombra. *Keplero* comincia a comparire.
7. 44. 48. *Keplero* esce dall' ombra.
7. 49. 48. *Reinaldo* è uscito dall' ombra.
7. 50. 48. Si vede chiaramente *Aristarco*, che ancora è intero immerso nell' ombra.
7. 51. 23. Si vede nell' istessa maniera *Copernico* nell'ombra distante dall' orlo per la lunghezza di tutto il suo diametro.

- 7h.51'.46". *Aristarco* comincia ad uscir fuori dall'ombra.
7. 52. 3. E' tutto fuori dall'ombra.
- 7 53. 33. *Fracastoro* è ancora all' orlo dell' ombra.
7. 55. 0. La Macchia chiara vicino ad *Aristarco* esce dall' ombra.
7. 55. 0. *Copernico* si scuopre.
7. 56. 8. Il centro di *Copernico* esce dall'ombra.
7. 56. 48. *Copernico* è qualche tutto scoperto.
7. 57. 12. *Copernico* è uscito intieramente.
7. 57. 48. *Fracastoro* è ancora all' orlo dell' ombra.
8. 3. 48. Si vede all' orlo dell' ombra una picciola macchia chiara più australe, che *Manilio*, che è ancora molto immersa nell' ombra.
8. 9. 18. *Eraclide* esce dall' ombra.
8. 9. 18. *Snellio* esce dall' ombra.
8. 14. 18. *Élicone* esce dall' ombra.
8. 14. 58. La metà di *Élicone* all' orlo dell' ombra.
8. 15. 8. *Manilio* comincia ad uscir dall' ombra.
8. 17. 5. La metà di *Manilio* all' orlo dell' ombra. *Dionisio* è distante dall' ombra quanto il diametro di *Manilio*.
8. 20. 33. *Menelao* comincia ad uscir dall' ombra.
8. 21. 18. *Menelao* è uscito intieramente.
8. 21. 45. *Platone* comincia ad uscir dall'ombra.
8. 22. 48. *Platone* è uscito intieramente.
8. 23. 8. *Promontorio* acuto esce dall'ombra.
8. 24. 18. *Plinio* esce dall'ombra.
8. 24. 28. *Plinio* è uscito intieramente.

34 *Memoria dell' Accademia Reale*

- 7^h. 13. 46. L'orlo Meridionale di *Grimaldo* cominciava ad uscire dall'ombra.
7. 13. 46. *Fracastore* era ancora distante dall'ombra, quanto il suo diametro portava.
7. 18. 20. La metà di *Grimaldo* fuori dell'ombra.
7. 18. 46. L'orlo chiaro di *Fracastore* tocca l'ombra.
7. 23. 25. *Petavia* all' orlo dell' ombra, questa non era così oscura, che non si distinguessero al di dentro le macchie eclissate molto distanti dal suo orlo.
7. 28. 17. *Fracastore* comincia ad uscir dall'ombra.
7. 31. 46. L'orlo di *Ticone* più vicino al centro, era distante dall' ombra altrettanto, che dall' orlo più prossimo della Luna.
7. 34. 46. *Langreno* comincia a comparire.
7. 36. 47. *Galileo* esce dall' ombra, e l' *Promontorio Meridionale* dell' Isola di *Keplero*.
7. 42. 48. Tutto l'orlo Meridionale dell' *Isola* di *Keplero* è fuori dell'ombra.
7. 43. 48. *Langreno* è ancora all' orlo dell' ombra. *Keplero* comincia a comparire.
7. 44. 48. *Keplero* esce dall' ombra.
7. 49. 48. *Reinaldo* è uscito dall' ombra.
7. 50. 48. Si vede chiaramente *Aristarco*, che ancora è intero immerso nell' ombra.
7. 51. 23. Si vede nell' istessa maniera *Copernico* nell'ombra distante dall' orlo per la lunghezza di tutto il suo diametro.

- 7h. 51'. 46". *Aristarco* comincia ad uscir fuori dall'ombra.
7. 53. 3. E' tutto fuori dall'ombra.
7. 53. 23. *Fracastoro* è ancora all' orlo dell' ombra.
7. 55. 0. La Macchia chiara vicino ad *Aristarco* esce dall' ombra.
7. 55. 0. *Copernico* si scuopre.
7. 56. 8. Il centro di *Copernico* esce dall'ombra.
7. 56. 48. *Copernico* è quasi che tutto scoperto.
7. 57. 12. *Copernico* è uscito intieramente.
7. 57. 48. *Fracastoro* è ancora all' orlo dell' ombra.
8. 3. 48. Si vede all' orlo dell' ombra una picciola macchia chiara più australe, che *Manilio*, che è ancora molto immersa nell' ombra.
8. 9. 18. *Eracleide* esce dall' ombra.
8. 9. 18. *Snellio* esce dall' ombra.
8. 14. 18. *Élicone* esce dall' ombra.
8. 14. 58. La metà di *Élicone* all' orlo dell' ombra.
8. 15. 8. *Manilio* comincia ad uscir dall' ombra.
8. 17. 5. La metà di *Manilio* all' orlo dell' ombra. *Dioniso* è distante dall' ombra quanto il diametro di *Manilio*.
8. 20. 33. *Menelao* comincia ad uscir dall' ombra.
8. 21. 18. *Menelao* è uscito intieramente.
8. 21. 45. *Platone* comincia ad uscir dall'ombra.
8. 22. 48. *Platone* è uscito intieramente.
8. 23. 8. *Promontorio* acuto esce dall'ombra.
8. 24. 18. *Plinio* esce dall'ombra.
8. 24. 28. *Plinio* è uscito intieramente.

36 *Memoria dell' Accademia Reale*

8. 25. 40. La metà di *Langreno* nell' orlo dell' ombra .
8. 35. 33. *Promontoria* del *segno* esce dall' ombra,
8. 36. 22. L' ombra all' orlo occidentale del *Mar delle Crifi*.
8. 37. 8. Non si vede più l' orlo del *Mar delle Crifi*.
8. 40. 18. L' ombra è dilungata dall' orlo della Luna , che si vedea nell' ombra della lunghezza del più gran diametro del *Mar delle Crifi*.
8. 42. 22. Ella era dilungata dall' orlo della Luna quanto la lunghezza del picciolo diametro del *Mar delle Crifi*.
8. 43. 38. Dilungata per la lunghezza del più grande semidiametro del *Mar delle Crifi*.
8. 44. 38. *Mar delle Crifi* intieramente fuori dell' ombra.
8. 45. 8. L' ombra dilungata dall' orlo della Luna quanto è il picciolo semidiametro del *Mar delle Crifi*.
8. 47. 46. Si vede l' orlo della Luna molto chiaro , e comincia a dubitarsi del fin dell' Eclisse.
8. 48. 56. Non rimane , che la penombra nella Luna .

Se si confrontino insieme le precedenti fasi, allorchè l' ombra era discostata dall' orlo della Luna per la lunghezza del più picciolo diametro del *Mar delle Crifi* , ed indi per quella del più picciolo semidiametro; si vede , che ella accostava all' orlo sù la fine della lunghezza del più picciolo semidiametro in 2'. 46"., quali aggiunti al tempo della penultima fase, quando era dilungata dall' orlo

lo per la lunghezza del più piccolo semidiametro; si avrà il fine dell'Eclisse 8.47.54.

Questo modo a ditterminate il fin dell' Eclisse, per l'osservazione del progresso dell' ombra, quando ancora è un poco dall'orlo discosta, dove distintamente si vede il termine, è più sicuro, e più evidente dell'immediata ditterminazione del fine, qual sempre è dubbia, non rimanendovi intervallo da paragonare.

Il fin dell' Eclisse fu vicino alle macchie di *Messala*.

OSSERVAZIONI

DELL' ISTESSA EGLISSE

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

NOn ebbi voglia di osservar il principio di questa Eclisse in tempo, che la Luna era ancora verso l'orizzonte, per la nebbia, e nugole, che occupavano questa parte del Cielo; Sendosi però rischiarato un poco l'aere, ho fatte alcune osservazioni delle fasi di essa con tutta la possibile esattezza, perciocchè l'ombra della Terra non appariva terminata, e distinta, come ha soluto, se non se verso le sei ore e mezzo: quantunque le osservazioni dell'incintero rimanente di essa si sian fatte con molto maggior giustezza per lo tempo adattatissimo, e sereno.

Primieramente eccovi il passaggio della Terra:

Nel principio del <i>Mar sereno</i> a	6 ^h . 21. 45'.
L'ombra verso <i>Grimaldi</i>	6. 27. 45.
Principio del <i>Mar delle Crisi</i>	6. 44. 15.
	Mez.

28 *Memoria dell' Accademia Reale*

Mezzo dell' istesso Mare	6 ^h . 50'. 45".
Promontorio acuto	6. 53. 30.
Immersione totale del Mar delle Crisi	6. 55. 15.
Principio di Langreno	7. 9. 30.
Fine di Langreno	7. 13. 45.
Principio dell' emersione di Grimaldi	7. 16. 0.
Metà di Grimaldi	7. 18. 15.
Emersione totale di Grimaldi	7. 22. 0.
Principio dell' emersione di Fracastorio	7. 47. 45.
Aristarco	7. 52. 45.
Metà di Copernico , e principio del Mare del Nettare	8. 3. 0.
Arpalo	8. 12. 45.
Elicone	8. 15. 30.
Menelao	8. 17. 45.
Promontorio acuto , emersione	8. 21. 30.
Metà di Platone	8. 22. 15.
Plinio	8. 26. 0.
Principio di Possidonio , e Promontorio del sogno	8. 33. 45.
Fine di Possidonio	8. 35. 15.
Principio dell' emersione del Mar della Crisi	8. 36. 45.
Fine della stessa	8. 45. 35.
Fine totale dell' Eclisse	8. 49. 0.

L'osservazione di questo fine è dubbiosa un poco , a cagion che l' ombra non era ben terminata .

Ecco frattanto molte osservazioni della distanza fra le corna della Luna , & il seno verso , o freccia della parte illuminata della sua orbita fatte con grandissima diligenza , e con un buon Micrometro , donde ho rivacata la quantità delle dita eclissate , e delle loro parti .

Distanza tra le corna

Delle Scienze.

12. 45. a	_____	6h. 39. 45.
17. 0. a	_____	6. 6. 45.
19. 0. a	_____	6. 13. 45.
25. 30. a	_____	6. 24. 15.

Senò verso illuminato dall' orbita della Luna
colle dita eclissate:

Senò verso	Dità	
11. 1.	3. 56. a	6. 25. 45.
14. 51.	6. 20. a	6. 42. 45.
12. 45.	7. 4. a	6. 55. 30.
12. 7.	7. 18. a	7. 1. 45.
11. 27.	7. 34. a	7. 4. 30.
10. 32.	7. 55. a	7. 13. 45.
10. 13.	8. 1. a	7. 19. 45.
9. 35.	8. 17. a	7. 24. 45.

Ticone è comparso nel seno verso,
e la distanza del suo mezzo fino
all'orlo della Luna era di

4. 17. 3.	_____	7. 29. 45.
10. 13. 8.	3. a	7. 33. 45.
10. 51. 7.	48. a	7. 26. 15.
11. 29. 7.	33. a	7. 41. 5.
12. 7. 7.	18. a	7. 50. 45.
14. 1. 6.	29. a	7. 59. 30.
14. 39. 6.	19. a	8. 0. 45.
16. 33. 5.	39. a	8. 8. 45.
18. 7. 4.	40. a	8. 17. 15.
21. 36. 3.	49. a	8. 25. 0.
22. 58. 3.	10. a	8. 28. 15.
25. 30. 2.	11. a	8. 35. 15.
27. 24. 1.	27. a	8. 40. 0.
28. 2. 1.	14. a	8. 43. 30.
29. 18. 0.	43. a	8. 45. 0.

C 4

Dia.

Diametro della Luna dopo l' Eclisse 31. 24.
all'altezza di 28.º. 30'.

Si può conchiudere facilmente, e con tutta giustezza la metà dell'eclisse dall' osservazioni precedenti del seno verso illuminato, o delle quantità delle dita eclissate, e delle loro parti, comparando insieme due osservazioni distanti di tempo dalla metà dell' Eclisse, come

Il seno illuminato nel principio dell'Eclisse era di 21. 1. a 6h. 25. 45.
Nel fine era ancor lo stesso compiuto a 8. 23. 56.

differenza 1. 58. 11.

metà 0. 59. 5.

Dunque metà dell' Eclisse a 7. 24. 5.

Il seno verso illuminato nel principio di 14. 51". a 6. 43. 43.

Nel fine istesso corrispondente a 8. 2. 9.

differenza 1. 19. 26.

metà 0. 38. 43.

Dunque metà dell' Eclisse a 7. 22. 26.

Il seno verso illuminato nel principio di 12. 45". a 6. 55. 30.

Nel fine suo corrispondente compiuto a 7. 50. 53.

differenza 55. 23.

metà 27. 41½.

Metà dell'Eclisse a 7. 23. 11½.

Delle Scienze.

48

Il seno verso illuminato nel principio di 11' 27". a

7. 4. 30.

Nel fine corrispondente a

7. 40. 35.

Differenza	36. 5.
metà	18. d.

Metà dell'Eclisse.

7. 22. 32.

Se si prenda un mezzo fra queste quattro conclusioni, si ritroverà la vera metà dell'Eclisse a

7. 23. 4.

Locche non si discosta dal tempo della metà dell'Eclisse, se non in 5", come io l'aveva ritrovato nelle mie Tavole, ch'era di 7. 22. 59. Il fine ancora concorda col mio calcolo presso a' 16", quale era a 8. 48. 44. Per la quantità dell'Eclisse, l'osservazione non era minore, che di un minuto di dito, del calcolo, che io diedi all'Accademia alcun tempo prima di detta osservazione.

Mio Figlio ha parimente osservato con precisione il passaggio dell'ombra per molte macchie, ed in gran parte va di accordo con quello, che io ho osservato.



RL

RIFLESSIONI

SU 'L LUME ; E COLORI , E SOPRA LA
GENERAZION DEL FUOCO

DEL P. MAILLEBRANCHÉ

* **P**Er ispiegare il sentimento , che sopra le cagioni naturali del lume , e de' colori io ho ; concepiam una gran palla compressa al di fuori da una forza , quasi infinita , ripiena essa di di materia scorrente , il di cui moto sia così ratto , che con tutta la maggiore velocità si aggiri non solamente intorno ad un comune centro ; intiera quanto ella è ; ma ancora , che ciascuna parte di essa , per compire tutto il suo movimento ; cioè per muoverli con quanta forza ella abbia , sia ancora stretta , o di girare intorno al centro d' un infinità di piccioli gironi , o di scorrere tra di essi sempre con una straordinaria celerità. In una parola concepiamo la materia contenuta in questa gran palla , quasi che tale , come il Signor *Descartes* ha descritta quella del nostro vortice , con questo divario , che le picciole palle del suo secondo elemento , quale e^a suppone dure , non siano , se non se piccioli altri gironi , o vortici , o tali almeno , che non abbian durezza , se non quella , che lor viene dalla compression della materia , che li circonda : atteso che se dette picciole palle fossero dure di per loro (qual cosa io credo bastantemente di aver provato non esser vero) * non potreb-

* 4. Aprile 1699.

* Cap. ult. della ricerca della ver.

trebbero, come vedrassi in appresso, tramandare la luce, & i differenti colori per un istesso punto in cui i raggi si segano. Se una tal supposizione riesca dura, e' basta fratanco di concepire una gran palla piena d'acqua, o più propriamente d'una materia infinitamente fluida, e per di fuori estremamente compressa; rappresentando il $\frac{1}{4}$ circolo ABC la sezione di detta gran palla, che si fa per lo centro:

Ciò supposto, se si faccia in questa gran palla una picciola buca, come in A; io dico, che tutte le parti dell' acqua, come son quelle, per cagion di esempio, che ritrovansi in R, S, T, V, tenderanno verso il punto A per le rette RA, SA, TA, VA; perciocche tutte quelle parti, ugualmente premute, non lo essendo così nel lato, che corrisponde alla buca A; devon verso ivi drizzarsi; perciocche ogni corpo premuto si muove per quel verso, ove minor resistenza incontra.

Ma se si metta lo stantuffo all' apertura A, e che prontamente si spinga dentro; le parti istesse RSTV &c; cercheran discostarsi da detta buccia per le medesime linee tutte AR, AS, &c. come quelle, che in avanzandosi più detto stantuffo, più son premute da quel lato, che da altro.

In fine, se si concepisca, che detto stantuffo con prontissimo pignimento si cacci dentro, e ritirì, tutte le parti della materia fluida, che riempiono esattamente la gran palla, la di cui molla io suppongo molto grande, e che difficilmente, ceda, o si arrenda, riceveranno infinite scosse, che io chiamo *vibrazioni di pressione*.

Poicche il tutto è pieno, i nostri occhi, benchè chiusi, o nelle tenebre, che e' siano, sono attualmente compressi: Ma tal compressione del nerve

ot-

ottico non risveglia già sensazione di colore, come quello, che è ugualmente premuto; per la stessa ragione che non sentiam noi il peso dell' aere, qual ne circonda, tutto che egli sia ugualmente grave, che 28. dita di argento vivo. Ma se si concepisca un occhio in T, o dovunque si voglia rivolto verso la fiaccola A, le parti della fiamma sendo in un continuo moto, premeranno, senza rifinire più vivamente di quello, che nelle tenebre era, con vibrazioni, e scosse la materia sottile per tutti i versi prontissimamente, & in conseguenza sino al fondo dell'occhio, giacche tutto è pieno; & i nervi ottici premuti, o scossi fuor dell' ordinario da queste vibrazioni, risveglieranno nell' anima una sensazione di lume, ovvero di viva bianchezza, e rilucente.

Se si supponga in S un corpo nero M; la materia sottile non essendo verso l'occhio riflessa, non iscote il nervo ottico, e vedrassi il nero, come appunto quando dallo spiraglio di una caverna si guardi il fondo, o nella buccia della pupilla, l'occhio.

Se il corpo M sia tale, che la materia sottile scossa dalla fiaccola, rifletta da esso verso l'occhio con la stessa prontezza di vibrazioni, questo corpo apparirà bianco, & altrettanto più bianco, quanto maggiori saranno i raggi riflessi. Apparirà ancora luminoso, come la fiamma, se essendo pulito detto corpo M, i raggi rifletteranno intieri, ovvero una gran parte nello stesso ordine; giacche lo splendore nasce dalla forza delle vibrazioni, & il colore dalla loro prontezza.

Ma se detto Corpo M sia tale, che la materia sottile riflessa, abbia men pronte in certo grado difficile a determinarsi esattamente, le sue vibrazioni, si terrà alcun de' colori, che dicono *primi-
tivi*

tivi, il giallo, il rosso, il celestro, se tutte le parti del corpo M sminuiscono ugualmente le vibrazioni, che cagiona la fiamma alla materia sottile. Si vedranno tutti gli altri colori, che nascono dalla mescolanza de' primitivi, secondo che le parti del corpo M inegualmente scemeranno la prontezza delle vibrazioni del lume. Questo ho inteso io di dire, quando in alcuno de' miei libri ho cennato, che il lume, & i colori consistevano in *diverse scosse, o vibrazioni* * della materia eterea, o nelle *vibrazioni di pressione più, o meno pronte*, che la materia sottile produceva sopra la retina †.

Questa sposizion semplice del mio sentimento apparirà forse molto verisimile a quelli almeno, che intendono la Filosofia del Signor Descartes, se mai non sian contenti della spiega, che questo savio uomo fa de' colori; ma perche più sodamente possa formarli giudizio di mia opinione, non basta di averla esposta; bisogna, che io vi aggiunga qualche pruova. Convien perciò avvertire.

1. Che'l suono sentasi per mezzo delle vibrazioni dell'aria, che scuotono il nervo dell'orecchio perche nella machina del voto, se si tiri quanto si possa l'aere, il suono, che ivi produceasi non si tramanda fuori, quando egli è medioere, e tanto meno, quanto che l'aere sarà piu rarefatto.

2. Che la differenza de' tuoni non nasca dalla forza delle vibrazioni dell'aere; ma come ogn'un sa dalla minore, o maggior loro prontezza.

3. Che quantunque le impressioni prodotte dagli obietti su gli organi de' nostri sensi, non differiscano, che nel più, e nel meno; i sentimenti però, che l'anima ne riceve; sian essenzialmente

* Ric. della ver. tom. 2. pag. 364.

† Trat. sù la Metaf. 12. Trat. n. 1.

differenti . Non vi ha sensazione più opposta , quanto , che 'l piacere , e' l dolore ; frattanto un che si freggi con piacere, sente dolore , se e' li gratti un poco più forte; perciocche il maggiore , o minor moto nelle nostre fibre, essenzialmente differiscono in riguardo al ben del corpo, di cui nostri sensi non ci avvisano, che per questi argomenti. E' ancor verisimile , che' l doles , e l' amaro , quali cagionano sensazioni cotanto opposte, spesso non divarino , che dal più , o meno ; poicche molti degli uomini sperimentano amaro qualche altri senton dolce . Vi son delle frutta , che oggi son dolci , e dimani diverranno amari ; dunque poco cambiamento , che ne' corpi si faccia , li rende capaci a produrre sensazioni molto opposte ; & in una parola , le leggi dell' unione dell' anima , e del corpo sono arbitrarie , nè s' incontra negli oggetti cosa , che sia simile alle sensazioni , che noi ne abbiamo .

Egli è certo , che i colori dipendano naturalmente dallo scuotimento degli organi della vista, quale non può essere , se non se forte , e debbole, o pronto , e lento . Ma la sperienza ne dimostra, che la maggior , o minor forza , o debolezza del pignimento del nervo ottico , non cambj già la specie del colore ; poicche il maggiore , o l' minor lume del giorno , donde il più , e 'l meno di questa forza dipende , ordinariamente non fa vedere i colori di una differente specie , e tutta opposta . Bisogna dunque conchiudere , che la maggiore , o minor prontezza delle vibrazioni del nervo ottico , o delle scosse de' spiriti , che e' contiene , cambjano la specie de' colori , e per conseguenza , che la cagione de' tali sensazioni addivengano principalmente dalle *vibrazioni più , o meno pronte della materia sottile , che comprimono la retina ,*

Van di pari il lume riguardo a' diversi colori, & il suono a' differenti tuoni. La grandezza del suono nasce dalla maggiore, o minor forza delle vibrazioni dell'aria grossolana; e la diversità de' tuoni dalla maggiore, o minor prontezza di queste istesse vibrazioni, come tutti credono. La forza, ovvero lo splendor de' colori nasce dunque egli ancora dalla maggiore, o minor forza delle vibrazioni, non già dell'aere, ma della materia sottile; e le differenti specie de' colori dalla maggiore, o minor prontezza di queste istesse vibrazioni.

Dopo di aver riguardato il Sole, e che il nervo ottico sia stato fortemente scosso dalla vivezza del suo lume, come le sue fibre, quelle, che sono situate nel fuoco degli umori trasparenti dell'occhio; se questi si chiudono, o che si entri in un luogo oscuro, lo scuotimento del nervo ottico passerà dal più, al meno, e frattanto si vedranno differenti colori, tosto il bianco, il giallo, il rosso, l'azzurro, & alcuni altri di que', che fanfi per la mescolanza de' primitivi, & infine il nero: Donde può conchiudersi, che le vibrazioni della retina prontissime sù le prime, divengano a poco a poco indi più rare; dunque bisogna pur confessare, che non già la grandezza, o la forza di tali vibrazioni, ma la loro prontezza sia quella, che faccia la diversità di specie de' colori; poichè il rosso, per cagion di esempio, ugualmente è rosso nel debole, che nel gran lume, potrebbe ancora quindi dedursi dalla successione de' colori, se mai sia ella costante, che le vibrazioni del giallo fossero più pronte di quelle del rosso, e quelle del celeste, e così di tutti altri colori, che l'un l'altro succede: Ma impossibile parmi il preciso scoprimento per tal mezzo, o per altro, della ragione esatta dalla prontezza di

... tali

tali vibrazioni, come nelle consonanze della musica si sono scoverte. Qui indovinando, possiamo accostarci al verisimile.

Essendo l' aere compresso dal peso dell' atmosfera, e' convien, che vi corra qualche tempo, perche ciascuna parte di esso aere rimuova la sua vicina; onde è, che 'l suono molto lentamente si trasmetta, non iscorrendo più di 180. passi in un secondo di tempo. Non così avviene della luce, perciocche tutte le parti eterree di essa fluidissime si toccano, e più perche sono compresse dal peso, per così dire di tutto il vortice; sicche le vibrazioni della pressione, o l'azione del corpo luminoso, in brevissimo tempo debba molto lungi comunicarsi: E se la compressione delle parti, che compongono il nostro vortice fusse infinita; e' bisognerebbe, che le vibrazioni di pressione si facessero in un istante.

Il Signor *Huygens*, nel suo *Trattato della luce**, conchiude dall' Eclisse de' satelliti di Giove, che 'l lume si trasmetta 600.m. volte più velocemente, che 'l suono, tanto il peso, o compressione di tutta la materia Celeste è senza paragon più grande di quella, che sù la terra produce il peso dell' atmosfera. Io credo bene di aver altrove provato, † che la durezza de' corpi addivenir non possa altronde, che dalla compressione della materia sottile; e se così è, bisogna che sia ella estremamente grande, rinvenendosi corpi cotanto duri, che bisogna impiegarvi grandissima forza, per istaccarne la minima parte: E crederei, che la ragione del peso dell' etere a quella dell' atmosfera sia molto più grande di quella di 600.m. ad uno, e che possa riguardarsi come infinita.

Frat.

* Pag. 9.

† Ric. della verità cap. ult.

Frattanto dunque supponiamo, che tutte le parti dell' *etere*, o della materia sottile, & invisibile del nostro vortice, siano compresse con una quasi infinita forza dagli altri, che lo cingono, e che ciascuna di queste parti sia fluidissima, nè abbia altra durezza, che quella, quale dal moto di coloro, che la circondano, e da tutti i lati la comprimono, le nasca. Vediamo, come in questo sistema, che io propongo, sia possibile, che le impressioni d'infiniti raggi, o di svariati colori, senza confondersi, si comunichino. Vediamo, come 10. m. raggi, che si segano in un punto fisico, o sensibile, tramandino per questo istesso punto tutte le loro differenti vibrazioni, giacche ho dimostrato, che la differenza de' colori, si faccia dalla maggiore, o minor prontezza di queste istesse vibrazioni; e quindi apparentemente didurremo, che il sistema del Mondo, che può mettere in chiaro questa gran difficoltà, sarà conforme alla verità istessa.

* Sia APEN la sezione di una camera con infiniti colori dipinta, e che parimente siano effi quanto si possono più forti, cioè, che in A vi sia il bianco vicino al nero *n*, il celestio *b* vicino al rosso *r*, il giallo *i* vicino al violato *u*. Se da tutti questi punti A, *n*, *b*, *r*, *i*, *u*, si menino le rette linee, quali si seghino in un punto, come Q, e si ponga l'occhio per di là, come in E, *c*, *d*, *f*, *g*, *h*, si vedranno tutti questi differenti colori per la tramezza del punto Q, dove si segano; e poicche tal figura non rappresenta altro, che un ordine di colori; bisogna immaginare, che altrettanti distinti l'occhio ne divili nel suo fondo, e che il punto Q d'intersezzione, sia capace a rice-

D

ve;

* Tav. I. Fig. 5.

vere, e trasmettere grandissimo numero d' impressioni differenti, senza che l' un l' altra distrugga.

Se il punto fisico, o la picciola palla *Q*, fusse un corpo duro, come *Descartes* lo suppone, sarebbe impossibile, che l' occhio in *E* vedesse il bianco in *A*, e che un altr'occhio in *c* vedesse il nero in *n*; perciocchè quando un corpo è perfettamente duro, se alcuna parte di detto corpo un qualche poco si avvanzi, o direttamente si muova verso il nervo ottico da *A*, per cagion di esempio, verso *E*, conviene, che tutte le altre parti in tal guisa si drizzino; dunque non si potrà solo vedere il nero, e l' bianco in un istesso tempo per mezzo de' raggi, che si leghino in *Q*.

Il signor *Descartes* pretende ancora, che 'l rosso facciasi dal giramento delle picciole palette, che l' un l' altre comunichino per tutto il raggio dall' oggetto sino all' occhio. Una tal opinione per molte ragioni non può sostenersi, bastando qui per distruggerla, che se la picciola palla *Q* giri intorno al suo asse *PN*, da *r*, dove sta il rosso, in *f*, ove è l' occhio, non potrà ella nell' istesso tempo rotolare su l' asse *rf*, da *N*, ove pur soppongo il rosso, in *P*, dove credo un' altr' occhio.

Quando in fine io dico, che i raggi si segano nella picciola palla, o nel picciolo girone *Q*, io non pretendo, che questi piccioli vortici sieno esattamente sferici, nè che i raggi visibili non abbiano altra grandezza; che quella delle picciole palle del secondo elemento, o di un picciolo girone. Non determino qual debba essere la grossezza di questi raggi, perchè bastantemente possano scuotere il nervo ottico, per far vedere i colori; ma quel che io ho detto di una picciola palla, bisogna intendere di mille, o di un milione, quante volte que-

sto

sto numero di palle fa bisogno, perche sia sensibile un raggio.

Non è dunque possibile, che la pallotta Q, o simili a questa possano trasmettere l'azion della luce propria a far vedere tutte sorti di colori, quante volte si suppongono dure; ma se s'immagini, che siano infinitamente fluide, o molli, (come l'idea semplice della materia rappresenta tutti i corpi, non avendo la quiete minima forza, & essendo indifferente a ciascheduna parte di un corpo l'essere, o 'l non essere dappresso alla sua vicina, da cui facilmente deve dividersi, se qualche forza, cioè qualche moto non la ritiene, giacche ne' corpi non ravviso altra forza, che 'l loro moto); se dico, si concepiscano queste palle mollissime, o come piccioli vortici, quali io le credo con maggior verità, composti di una materia infinitamente fluida, ovvero estremamente agitata, saranno esse capaci di ricevere infinite impressioni differenti, quali potranno comunicare alle altre, su le quali si appoggino, e con le quali sono infinitamente compresse. Locche bisogna provare, e spiegar meglio.

Perciò egli è necessario di ben comprendere, che il ripignere, quale come lo spingimento si comunica tolto per linee rette, sia quì necessariamente uguale al pignere: Per questa essenzial ragione, su l'effetto, che si ricerca, il nostro vortice è quasi infinitamente compresso, e perciò non può egli contener voto. Se per cagion di esempio, si spinga un bastone contro di un muro fermo, la mano, e 'l bastone saranno rispinti coll' istessa forza, con la quale sono stati pinti. Sarà dunque l'azione uguale alla respinta. Or se bene i raggi non siano così duri, come 'l bastone; avvien tuttavia l'istesso, ri-

guardo all'azione, per la compressione, e pienezza del nostro vortice.

Perciocchè se suppongasi una botte piena d'acqua, o la gran palla della prima figura ripiena d'aere, avendovi aperta una buca, si spinga per essa uno stantuffo, questo sarà altrettanto respinto, quanto sarà urtato: E se inoltre si faccia nel mezzo di detto stantuffo una picciola doccia, donde possa introdursi l'acqua, & uscir dalla botte, e che si spinga detto stantuffo; tutta l'acqua, che sarà compressa, per cagion di sua fluidezza, nell'istesso tempo cercherà a dilungarsi da ciascun punto di questo stantuffo, per l'azion di esso; e per lo rimbalzo si avvicinerà alla buca, che ha nel mezzo: Poicché se si spingesse lo stantuffo con molta violenza, e prontezza la botte screpolerebbe nella parte più debole di essa, segno evidente, che per l'azione di quello, l'acqua premerebbe la botte da per tutto, e per poco, che si spingesse lo stantuffo, l'acqua zampillerebbe per la picciola doccia tosto respinta. Tuttociò, perchè questa è uguale all'azione nel pieno, e perchè l'acqua, o la materia sottile è molto molle, e fluida, sicchè ciascuna parte si conformi in maniera a tutte forti d'impressioni.

Bisogna avvertire, che quanto più fortemente si spinga lo stantuffo nella botte, tanto più l'acqua, benchè urtata verso la superficie concava della botte, è fortemente respinta verso lo stantuffo; e zampilla per l'apertura di esso con più forza. Donde facilmente può giudicarsi, che un punto nero sopra della carta bianca debba essere più visibile che sopra della carta cilestre; perciocchè il bianco respingendo il lume più fortemente di tutti altri colori, non solamente scuote molto il nervo ottico; ma sì, che la materia sottile con maggior forza corra col
rima

rimbalzo verso il punto nero. Ma se la materia eterea non fusse infinitamente molle, e fluida, egli è chiaro, che le picciole palle, quali trasmettono l'impression del bianco, essendo dure, impedirebbero quella del nero; perciocche dette palle sostenendosi l'un l'altre, non potrebbero andare verso il punto nero; e se questa materia eterea non fusse compressa; non vi sarebbe respinta.

Quel che si è detto del bianco, e del nero, deve applicarsi ad altri colori; ma molto difficile e' sarebbe il venire al minuto, e rispondere alle difficoltà, che potrebbero far molti sù di tal soggetto; perciocche facilmente sù di cose oscure possono farsi delle obiezioni; ma tutti que', che son capaci di farle, non sono sempre in istato da comprendere tutt' i principj, donde la soluzione dipende delle loro difficoltà. Non è egli impossibile a concepire, come un punto sensibile di materia infinitamente fluida, e dappertutto compressa, riceva in un istesso tempo numero quasi che infinito d'impressioni differenti, se si considerino queste due cose 1. Che la materia è all'infinito divisibile, e che la più piccola sfera può corrispondere a tutte le parti d'una grande. 2. Che ciascheduna parte si drizzi, & avanzi per quel verso; donde è meno premuta, e che perciò tutri i corpi molli, & inegualmente compressi, ricevano tutt' i lineamenti delle forme, per così dire, che le circondano, & altrettanto più prontamente li ricevano, quanto che essi sono più fluidi, e più compressi. Lascio dunque le minute conseguenze, che nascono da principj pur ora spiegati, per le quali si possano, a mio parere, o togliere, o scemare tali difficoltà, che ingombrano, cioè, che i raggi de' colori dovriano confondere le loro vibrazioni, in secan-

dosi, qual difficoltà parmi tale, che il vero sistema della natura intorno alla materia sottile possa solo intieramente rischiararla. Che che ne sia, io credo di aver chiaramente provato, che la diversità de' colori facciasi dalle differenti prontezze delle vibrazioni mosse dalla pressione della materia sottile; appunto come i differenti tuoni della musica nascono dalle diverse prontezze delle vibrazioni dell' aere grossolano, come l'esperienza ne addita, le quali pur si legano senza distruggerli: ed io stimo, che non possa rendersi ragion fisica della maniera, per cui tutte queste vibrazioni si comunichino, se non si tengano que' principj pur or divisati.

Del rimanente non bisogna immaginarsi, che qualche io ho detto delle picciole palle del secondo elemento, quali lungi da crederle dure, io piuttosto le confidero, come piccioli gironi di materia fluida, debba atterrare la fisica del Signor *Descartes*; quando per lo contrario, a mio sentimento, se mai egli è vero, perfeziona ciò, che ha quel sistema di generale: Poicche se la mia opinione può agevolare lo spiegamento del lume, e del colore, la crederei propriissima a risolvere conforme a' principj di tal Filosofo altre quistioni molto generali della fisica, come per cagion di esempio, a spiegare la generazione, & i sorprendenti effetti del fuoco; come io cerco di far vedere.

Della Generazione del Fuoco.

Non potendo i corpi naturalmente muoversi, se da altri non sia loro il moto comunicato; egli è chiaro, che 'l fuoco non possa accendersi, che per la comunicazione del movimento della materia sottile a' corpi grossolani. Il Signor *Descartes*, come ogn'un sa, pretende, che il primo elemento solo comunichi il suo moto al terzo, di cui i cor-

pi grossolani son composti, & agitandolo, lo mette a fuoco. A parer di questo, quando si batte il fucile con violenza, si distacca una picciola parte della selce (io crederei; che queste fossero piuttosto parti svelte dall'acciajo, che si accendono, perciocche quando col microscopio si guardano le scintille del fuoco raccolte, si conosce; che son dell'acciajo fuso, e formato in pallottole, o in piccioli serpentelli; e non ho mai avvistato, che vi fusse cambiamento ne' piccioli tritoli staccati dalla selce, ma questo niente monta per la sostanza) queste picciole parti distaccate dal ferro girando dunque con forza, spingono le pallottole del secondo elemento, e fan, che 'l primo elemento vi scorra, e da tutti i lati circondandole, comunici loro una parte del suo moto ratto, che li fa apparire infocate. Ecco il sentimento del Signor *Descartes* sù la generazione del fuoco: Nella quarta parte de' suoi principj num. 80., e seguente, può più a lungo riconoscerli questo spiegamento. Ma se le picciole palle son dure, e si toccano tutte, com' egli le suppone, per ispiegare i colori, si dura fatica a comprendere, come il primo elemento potrebbe ricorrere verso la parte distaccata del ferro e ciò con molta abbondanza, per cingerla, & infocarla, nè solamente essa, ma tutta la polvere di un cannone, o di una mina, gli effetti delle quali son cotanto violenti; perciocche il primo elemento, che può scorrervi, non può essere altro, che picciolissima porzione della materia sottile, qual riempie i piccioli spazj triangolari, e concavi, che le palle lasciano fra di loro.

Ecco dunque come io spiego la generazione del fuoco, e suoi effetti violenti; supponendo, che le picciole palle del secondo elemento in fatti non

fiano, se non se piccioli gironi di una materia fluidissima, & agitatissima.

Ma bisogna avvertir prima, che quantunque l'aere non sia punto necessario produrre per picciola scintilla di fuoco; frattanto per difetto di esso, tosto si estingua, nè possa comunicarsi alla polvere del cannone, facile tutto che ella sia ad accendersi.

Allorache si scarica una pistola nella machina del voto, l'esperienza ne dimostra, che per difetto di aere la polvere dell' alveolo non si accenda, e nello stesso tempo è difficilissimo a ravvivare scintilla alcuna. Sà infine tutto il Mondo, che si estingue il fuoco, per mancanza di aere, e che soffiando si accenda. Supposto ciò, vedete come io spiego la generazione del fuoco, e suo pronto effetto nelle mine.

Se si batta il fucile nel voto, si stacca a forza del colpo una picciola parte del ferro, o dell' Acciajo, quale girando, e pignendo prontamente alcuni piccioli gironi del secondo elemento, li rompe, e determina per conseguenza le parti di essi a circondarla, indi ad agitarla, & infocarla. Ma la materia di questi gironi, quale non saprei immaginarla molto agitata, dopo di aver avuto in un istante quantità di moti irregolari, prontamente rifondesi in parte in nuovi gironi, & in parte scappa via tra gl' interstizj de' gironi, che sono attorno, quali intervalli divengono più grandi, allora che questi gironi si accostano alla parte distaccata del ferro; questi ultimi gironi non sono rotti, perche la parte del ferro ritondata, o quasi cilindrica, girando intorno al suo centro, o alla sua lunghezza, non urta più ne' gironi, armata di parti atte a rompere. Tutto ciò avviene quasi in un istante, allorche il ferro, e la selce si percuotono in un luogo voto di aere, e la scintilla allora
è af-

è affatto invisibile , e niente durevole ?

Ma quando si batte il fucile nell' aere libero ; la parte staccata del ferro , girando fortemente rincontra , e scuote , non solamente alcuni de' piccioli , gironi , ma molte parti dell' aere ; quali come ramosi , incotrano , e rompono in conseguenza col loro moto più vortici ; che la picciola parte sola del ferro : Di manierache la materia sottile di questi vortici , cingendo il ferro , e l' aere , dà loro molti , e diversi movimenti , per rispignere fortemente gli altri gironi . Devon perciò le scintille essere più risplendenti nell' aere , che nel voto , & aver maggior durata , e forza , per accendere la polvere del cannone , cui non può mancar materia sottile , che l' accenda , per molta , che ella sia , poicche non è solamente la materia del primo elemento , come *Descartes* ha creduto ; ma molto più quella del secondo , ovvero i piccioli gironi rotti , che producono gli straordinarij movimenti del fuoco nelle mine . Se si faccia riflessione sù di quel che avviene al fuoco , allorache se li spigne contro molto aere ; non si porrà in dubbio , che le parti dell' aere non sian propriissime a rompere quantità di gironi del secondo elemento , & in conseguenza a dterminare la materia sottile , a comunicare al fuoco parte del suo moto , giacche altronde non può venire la forza , o'l movimento a questo elemento , che da tal materia ; essendo pur certo , che non possa un corpo muoversi , se quelli , che li son d' intorno non lo pingono . Gli effetti prodigiosi de' specchi ardenti , pruovano molto , che la materia sottile , sia la vera cagione del fuoco : I raggi della luce , secandosi al fuoco di questo specchio , i piccioli gironi della materia eterea , da' quali essi raggi son composti , devono cam-
bia

biare i loro moti circolari in diverse guise, e tutte drizzarsi per una istessa a muoverli, cioè secondo l'asse del cono del lume riflesso, e penetrare, e scuotere, così le parti del corpo, che incontrano, & accenderlo.

DEL RITORNO DELLE COMETE

DEL SIGNOR CASSINI.

DOpo la Cometa, che comparve nel mese di Settembre 1698., se vederli un'altra nel mese di Febrajo, e Marzo di questo anno 1699. Il confronto di queste novelle Comete con le più antiche, e 'l conforme lor moto con quello de' pianeti, dando un nuovo lume all' ipotesi di *Apolonio Min-
diano*, quale, al riferir di *Seneca*, insegnava, che le Comete fossero stelle particolari, visibili allora, che alla terra li avvicinassero, & invisibili, quando che se ne discostassero, sperava questo Filosofo, che coll' andar degli anni, rinverrebbe alcuno, che le vie del Cielo, per dove le Comete camminano, determinarebbe, e distinguerebbe le une dall' altre. Ma da tal tempo, molti secoli son corsi, e persona non si è avacciata ad indagar le regole de' loro movimenti molto, per quel che sembran, irregolari.

Le Comete, che sono in questo secolo comparse, anno risvegliate le antiche idee; e molte novelle altre scoperte han conferite a rischiararle.

1. Primamente si è avvilato, che le Comete, i
di

29. Aprile 1699.

di cui moti particolari, rispetto alle stelle fisse osservati con una mediocre esattezza, seguitano per qualche tempo l'arco di un circolo maggiore della sfera, dal quale alcune, per poco traviano, verso il fine particolarmente della loro apparizione, quando lo scostamento, che a poco a poco si fa, più sensibil diviene: Locche è avvenuto ancora nella Cometa del mese di Settembre ultima. I pianeti fan lo stesso, drizzandosi il di loro apparente moto per un circolo maggiore, quale non descrivono esse precisamente intiero. La Luna se ne discosta in una maniera più semplice, per lo cambiamento de' suoi nodi; i pianeti, toltone il Sole, in una maniera più composta traviano, mentre son dalla terra guardate, quale non è il principal centro del particolar loro movimento.

A' nostri tempi non vi è stata Cometa, che siasi più discostata dal suo circolo maggiore, quanto quella dell'anno 1664., e 1665. Noi esattamente riferimmo un tale scostamento in un libro di detta Cometa, impresso nell'istesso anno in *Roma*, per un movimento particolare de' suoi nodi, qual maniera può parimente applicarsi alla Cometa dell'ultimo anno.

2. Nel giro delle Comete osservate in questo secolo, e nel precedente, con maggior esattezza de' secoli passati, noi abbiam avvisato un luogo, dove appariscono esse più grandi, e dove il loro apparente moto è più veloce, quale in uguali distanze da una parte, e dall'altra, si è conosciuto quasi che uguale, quando si è potuto osservare prima, e dopo del suo perigeo; come è avvenuto ancora nella Cometa del mese ultimo di Settembre. Confrontasi questo col perigeo de' pianeti, ove alcune per un movimento semplice giungono, & altre

per un composto , quale non si ravvisarebbe sì precisamente uguale , se egli fosse semplice .

Noi intanto riduciamo ad una egualità i movimenti delle Comete, durante il tempo della loro apparizione , che supponiamo cortissimo , riguardo a quello del loro intiero periodo , senza pretendere , che e' sia perciò uguale in tutta la rivoluzione ; l' inegualità , che non apparirebbe in un picciolo arco prossimo al perigeo , potrebbe essere considerabilissima in una gran porzione di circolo . Quindi è , che non saprei dedurre i tempi di tutto il periodo dalle osservazioni fatte in tutto il tempo dell' apparizione di una Cometa .

3. Le Comete discostate dal Sole , e dalla Luna , allora escono di veduta , quando sono nella maggior diminuzione del loro moto apparente, come nelle due ultime . Questo conferma , che la molta loro distanza e' il vivo chiarore delle altre Stelle, faccian quelle disparire ; donde nasce , che dopo , che si son tolte alla nostra vista, per qualche tempo ancora , con l'ajuto de' Cannocchiali si veggano ; abbenche alcuna diminuzione fisica possa esservi , la quale , come impercettibile fra 'l tempo dell' apparizione , potrebbe essere ben considerabile , dopo la rivoluzione di molti Anni .

4. Noi di già abbiain ritrovate alcune Comete, che an fatto un' istesso giro descritto nelle costellazioni del Cielo , senza una molta variazione , da quella , che fa la Luna nel suo giro d'un' Anno all' altro , come prima noi avevamo osservato .

5. Avendo confrontate insieme le velocità apparenti di queste Comete , che per le stesse traccie son passate , mentre l' une , e l' altre erano in ugual distanza dal loro perigeo ; abbiain ritrovato in alcune non vi essere maggior differenza di quella ,
che

che tra le velocità de' stessi Pianeti in ugual distanza dal loro perigeo si frapone, locche risulta dalla composizione de' loro movimenti.

6. Quando noi abbiamo avute osservazioni proprie ad investigare se una Cometa non avesse parallasse sensibile, locche è raro; l'abbiam ritrovata minore di quella della Luna.

Allora il moto apparente della Cometa nel suo perigeo era secondo le osservazioni, più lento del moto apparente della Luna; uniformandoli con ciò alla regola degli Antichi, quali tennero, che qualora il moto proprio de' corpi celesti era più lento, allora eran più distanti dalla Terra. Egli è vero, che i Moderni, quali non suppongono, come gli Antichi, che la Terra sia il principal centro del moto di tutti i Pianeti, ma solamente della Luna, non accordino, che tal regola sia universale, per gli altri Pianeti, che essi allogano intorno al Sole; ma senza contrasto ammetteranno, che tal regola debba per le Comete sussistere, le quali nel sistema della Terra sono tra' Circoli di Venere, e di Marte, & avranno l'istessa relazione alla Terra, che gli altri Pianeti anno al Sole.

Abbiain dimostrato altrove, di esservi molto spazio fra questi due Circoli, per ivi porre gli eccentrici, che l'ipotesi di Apollonio richiede.

La gran Cometa del 1680., che ci diè l'agio di osservare sua parallasse per più giorni continui secondo il nostro metodo, fu rincontrata in detto spazio di Cielo, nel quale abbiain ancor ritrovata la Cometa del 1652., il di cui moto apparente fu più lento nel suo perigeo, appunto come il moto della Luna. Egli è inutile di far più lontane inchieste, quando non si ha bisogno di spazio più grande, per rappresentare il moto apparente delle

Co

Comete visibili; poicche al di là di tali confini, non è più sensibile la parallasse, per le osservazioni delle Comete; durandosi fatica ad avverare quella di Marte, e di Venere, ancor quando detti Pianeti son più vicini alla Terra.

Le ultime due Comete anno avuto il moto loro apparente nel perigeo, più lento del moto della Luna; donde si è pensato, che fossero esse un poco più distanti dalla Terra; poicche la condizion dell'aere non ci permise di osservar la Parallasse con quella precisione desiderata.

7. Abbiám vedute col Cannocchiale Comete, l'orbita delle quali era così rotonda, così pura, e così chiara, come quella di Giove. Tali erano la seconda Cometa dell'Anno 1665. e quella del 1682. L'orbita di alcune altre, e delle due ultime in particolare, era così mal finita, & oscura, come le stelle nuvolose pajono appunto alla semplice vista: Può questo rifonderli a qualche grande Atmosfera, che le circonda. Quindi non può dedursi, che non siano esse di lunga durata; essendovi Stelle nuvolose nella constellazione di Andromeda, & in quella di Orione, le quali vedute ancora con Cannocchiali ben grandi, anno l'istessa apparenza, senza accrescimento, o diminuzione da 40, o 50. Anni, che l'osserviamo.

8. Oltre alla variazione della grandezza apparente di una Cometa, per la differente sua distanza dalla Terra, e per alcuna cagion fisica; può ella in apparenza ancora esser varia, per altra simile cagione a quella, che fa differente la grandezza apparente del quinto Satellite di Saturno, qual si osserva crescere, e sminuire, fino a sparire, durante la metà di ciascheduna sua rivoluzione, quando ancora si avvicina alla Terra. Vi
sono

sono parimente Stelle fisse, che appajono accresciute, o diminuite, quali in fine si tolgon di vista, & indi si fan di nuovo vedere, dopò certi spazj di tempi, più, o meno regolati. Per simili cambiamenti, potrebbero alcune volte le Comete comparire di differente grandezza nel loro ritorno, e passare ancora, e ripassare nella stessa distanza della Terra, senza esser vedute.

La Coda delle Comete soggiace a maggiori cambiamenti, essendo di consistenza così tenue; che le Stelle per essa traspaiano, e'l lume della Luna, e quello de' crepuscoli l'oscurano.

E poicche raffiguriamo le Comete, principalmente per la Coda, che an seco; se una di esse, per una qualunque cagione la perda; potrebbe, senza che noi la ravvisassimo, passare. La condizion dell'aere può impedircene la veduta; & i raggi del Sole, che occupano quella di Mercurio in molte delle sue rivoluzioni, possono ancora oscurarci una Cometa nel suo ritorno al perigeo, se questo avvenga mentre il Sole l'è molto da vicino.

Per tutte queste cagioni, quando mai si fusse rinvenuto il periodo d'una Cometa, non potremo riprometterci, di riconoscerla nel suo ritorno.

Poiche da non molto tempo io mi affatigo su l'osservazioni, che possan conferire a tal ricerca; non me ne ritrovo abbastanza molte, da poterne con sodezza sufficientemente dedurre i visibili ritorni dell'istesse Comete, per lo avvenire. Basta presentemente di riconoscerle, quando rivengono, e distinguerle dalle altre.

Per giudicare, se una Cometa, che comparisse di nuovo, non fusse ella una di quelle, che in altri tempi si son vedute; bisogna disaminare, se non si accordi con alcuna di tali Comete nelle proprie;

prietà , che convengono ad un'istesso Pianeta.

Giammal ritroverassi , che due differenti Pianeti abbiano insieme li medesimi nodi , le stesse inclinazioni delle loro Orbite all'Eclittica, e la stessa velocità apparente ne' loro perigei.

Quando dunque noi osserviamo , che una Cometa ha insieme l'istessi nodi, le medesime inclinazioni all'Eclittica , & uguali gradi di velocità apparente, divisiati in un'altra , che prima è comparita; con ragionevole grave fondamento possiam giudicare dall'Analogia co' Pianeti , che possa essere l'istessa Cometa.

Tutte queste conformità si ritrovano fra la Cometa dell'Anno 1680. , e quella del 1577, quali segarono l'Eclittica nell'istesso grado 9. di Sagittario , e de' Gemelli , con simile inclinazione di 29. gradi : passando per le stesse costellazioni, & avendo l'istessi gradi di velocità nelle simili distanze dal loro perigeo : Queste circostanze ne fecero formar giudizio, che fosse l'istessa Cometa, come più a lungo abbiain dimostrato nel Libro dedicato al Re. L'istessa relazione, ha la Cometa dell'Anno 1652. (i moti della quale noi osservammo , e ne descrissimo il giro , che aveva fatto , e che rimaneva a fare, in una lettera drizzata al Duca di Modena, impressa prima , che ella sparisse) con la Cometa del mese di Settembre ultimo, e se si metta in confronto quella descrizione con le osservazioni di questa , si vedrà, che ella ha per lo stesso gran cerchio camminata, qual taglia l'Eclittica nello stesso grado 28. di Toro , e di Scorpione, con ugual inclinazione di gradi 76. avente quasi il medesimo grado di velocità nel perigeo, come ogni Pianeta de' più regolari.

Vi è stato ancora qualche conformità tra la Cometa di quest'Anno , e del precedente : Il suo giro

giro ha quasi avuta la medesima inclinazione all' Eclittica, e l'ha scorsa con quasi la stessa velocità; ma poicché una da Settentrione andava al mezzodì dichinando all'Occidente verso li stessi segni, da' quali l'altra si discostava, camminando da mezzodì a Settentrione, con dichinare all'Oriente, locche non si osserva nel ritorno, che fa un'istesso Pianeta al perigeo; noi perciò non abbiám pruove sì forti da dimostrarla una istessa.

L'ultima Cometa ha parimente qualche simiglianza con quella, che fu osservata nel mese di Dicembre dell'Anno 1689. da' PP. Gesuiti Matematici del Re inviati alla China. Scorse ella la constellatione del Lupo, passando su 'l dosso di questo in poca distanza dal gran Circolo della nostra, camminando, come questa verso il Polo Australe dell'Eclittica, quale intanto aveva passato in qualche distanza da' nodi della nostra, con una inclinazion più grande, e con minor velocità nel suo perigeo; donde sembrava piuttosto, che fusse ella un'altra, che faceva l'istesso giro. I nodi di quella del 1689, erano li stessi con i nodi di quella del 1680.

Egli è vero, che vi possono essere Comete, i cui nodi abbiano un moto assai veloce, e l'inclinazioni variabilissime, e che ritornino al perigeo con una molto differente velocità cagionata da qualche variazione di eccentricità; ma in questo calo sarà estremamente difficile di raffigurarle per le stesse, fin'a tanto, che non si ristabiliscano in un medesimo stato. Tali ristabilimenti non avvengono, che dopo lunghi periodi: Et essendo così, non è picciola cosa, che nel poco numero, che noi abbiám potuto vedere a' nostri giorni di esse, ne abbiám in 18. Anni ritrovate due, che posson supponersi essere le medesime con due altre, che eran comparse,

E

una

una nel Secolo passato, e l'altra nella metà di questo, oltre a molte altre, che in tale intervallo anno dappresso seguite le simili tracce. Poicche questi giri son cotanto frequentati dalle Comete, è bene, che di tempo in tempo li rivediamo, per conoscere, se vi compajano altre, da poter paragonare con quelle, che noi vi abbiain osservate.


Quando terremo un maggior numero di osservazioni di Comete, da poterne indi scegliere quelle, che anno maggior corrispondenza insieme, e dedurne più ferme regole; si vedrà, se non si possano affatto ritrovar i periodi de' movimenti de' nodi, e delle variazioni dell'inchinazione all'Eclittica, che faccian passare una Cometa per differenti giri descritti dalle osservate con i medesimi gradi di velocità; come il moto de' nodi della Luna in 18. Anni, e la poco variazione d'inchinazione, che ella fa in 14, o 15 giorni, san passare la Luna in diversi Anni per differenti giri, prima che ritorni per l'istessa via alle medesime Stelle fisse.

Così vedrassi, come non si possa accordare in tal guisa insieme la seconda Cometa del 1665, e quella del 1677, con l'altra del 1680, e del 1577, le quali anno quasiche avuti l'istessi gradi di velocità, e son passati per vie poco differenti.

Vedrassi parimente, se non si possa ritrovare un periodo della variazione d'eccentricità analoga a quella, che fa la Luna, parte in 13 Mesi, parte in 15 giorni, che possa dare ad un'istessa Cometa i differenti gradi di velocità, che alcune di quelle anno avuti, quali son passate per le stesse costellazioni, come la di questo Anno ultimo, e quella dell'Anno 1690. Così ritroviamo essere stato fatto da una nell'Anno 1472 osservata da *Regio Montano* nel Mese di Gennajo, e Febrajo, e d'altra dell'Anno

1556 da *Omelio*, e da *Camerario* nel Meſe di Marzo, & Aprile; l'una, è l'altra paſſaron l'Eclittica quaſi per lo mezzo del ſegno di *Libra*; e dopo di eſſere ſcorſe tra' Poli del *Zodiaco*, e l'*Equinoziale*, proſeguirono il cammino ſino alla metà del ſegno d'*Ariete*; ma la più gran velocità della prima, parve, che vinceſſe quella della ſeconda, quaſi del triplo. Se non ſi ritrovi regola di queſte variazioni (difficil coſa invero ſenza un'eſatta particolarità di oſſervazioni); non oſerei io aſſicurare, che fuſſero eſſe una iſteſſa *Cometa*.

Prima che ſia perſuaſo da' baſtanti indizj, che una *Cometa* novella ſia una di quelle prima compaſe, e che non ſappia, che ella non abbia dopo fatta, ſe non ſe una *revoluzione*, o ſe ne abbia fatte più, che ne ſappia il numero; egli è inutile l'interaprendere la ricerca della *revoluzione*, come ſarebbe inutile ancora di dedurre la *revoluzione* di *Mercurio* da due ritorni, che ſi fuſſero oſſervati, ſenza ſapere il numero di quelle, che avrebbe fatte tra una apparizione, e l'altra.



OSSERVAZIONI
SOPRA L' ESATTA QUANTITA' DE' SALI
VOLATILI ACIDI

Contenuti da differenti spiriti acidi

DEL SIG. HOMBERG.

Nella Chimica più che in alcun'altra arte abbisogna una somma esattezza in tutte le sue operazioni, non solamente nella scelta de' materiali, che si vogliano adoperare; ma ancora per la loro quantità, quale spessissime volte è così precisa; che per poco, che si manchi l'operazione divien tutta differente da quella, che si era proposta a fare: Questa in parte è la cagione, donde maggior numero di operazioni un poco dilicate, non riescan sempre per man di tutti.

Abbiam noi una infinita facilità di misurare la quantità determinata di tutte le Droghe sode, e secche, col peso, e con le bilancie ordinarie; ma non va l'istesso per le liquide, e particolarmente per tutt'i sali volatili acidi, che per ordinario non si anno in forma secca da vegetabili, e da minerali, ma uniti sempre con una porzion di flemma, dalla quale giammai intieramente si separano. Sinora non abbiamo avuto mezzo comodo da poter conoscere quanto sal acido puro precisamente si contenga ne' liquori, che si dicono spiriti acidi; quindi
im-

29. Aprile 1699.

Imbarazzato l'Artista, che vuol'esser minuto, non si assicura di poter rifare l'istessa operazione, che egli altra volta, o che altri prima di lui, abbian fatta.

Egli è vero, che l'Areometro, istrumento volgare, può dimostrarci poco men qual de' due, o tre spiriti acidi sia più, o meno senza flemma; ma non saprebbesi d'eterminare per quantità, o per conosciuto peso, quanto uno spirito sia più forte, o più grave dell'altro: E quando si disamina in differenti tempi la forza dell'istesso spirito, l'Areometro comune cotanto soggiace ad esser falso, quanto la condizion dell'aere più, o meno caldo in un tempo, che in un'altro, ne cambia considerabilmente l'effetto. Ma quando anche non vi fusse tal mutazione nell'aere, bisognerebbe, per averare la stessa forza d'uno spirito acido, servirli precisamente di un'istesso Areometro, di cui si è nel primo luogo avvaluto, altrimenti non si diviserà cosa affatto; essendo quasi che impossibile di ritrovar due Areometri, che ugualmente lo dimostrino; perciocchè e' converrebbe, che la capacità, e la figura de' loro ventri, e de' loro colli, come la quantità della materia, dalla quale son formati, fossero perfettamente le stesse, cosa difficile ad eseguirsi, come lo è il fare due Termometri perfettamente uguali. Ebbi l'onore sei Anni sono di proporre alla Compagnia un nuovo Areometro più esatto dell'Antico, di cui ho fatto uso per alcun tempo; ma avendolo ritrovato ancora molto scomodo, l'ho corretto in fine, sicchè tutti senza travaglio, e senza errore possano adoperarlo. Questi non ha difetto alcuno di quelli degli Antichi, e corrisponde con suo' buoni effetti a comuni desiderj: Nota precisamente la quintesima, o sessagesima di una goccia, e come un liquore,

per conosciuti pesi sia più grave dell'altro; allorché, se si vogliono aggiungere le seguenti osservazioni, conoscerassi parimente con infinita esattezza, quanta flemma, e quanto sal acido contenga uno spirito acido, qual si voglia esaminare. Di più tutti gli Areometri in tal guisa fatti, benché di varie grandezze, ciascun di essi precisamente noterà l'istesso grado di forza in un medesimo spirito acido, cioè, che se si perda, o rompa un'Areometro, con cui siasi disaminato uno spirito acido; si potrà avverare la forza dell'istesso spirito con un'altro, abbenche quest'ultimo fusse più grande, o più picciolo del primo.

* Altro dunque egli non è, che un vaso di vetro simile ad un picciolo recipiente, il di cui collo AD cotanto è sottile, che una goccia di acqua occupa lo spazio di cinque, o sei linee. A fianco di questo collo sorge dal ventre B del vase un picciolo doccia C dell'istessa capacità del collo, lungo intorno a 6 linee, parallelo al collo AD. Questo picciolo doccia serve, per dar libera l'uscita all'aere, che stà nel vase, a misura, che si riempia questo di liquore: La ragione perche il collo si richiuda così sottile è, perche più facilmente possa quindi conoscersi la vera ampiezza del liquore entrato nel vase. Si faccia un segno D sopra al suo collo AD, per conoscere fin dove debba essere riempito: Egli è bene ancora di formare l'estremità A un pò larga, a guisa d'imbuto, per introdurvi più facilmente il liquore.

L'uso di tale Istrumento è: Riempiesi egli d'uno spirito acido sino al segno del suo collo, & indi si pesa in una buona bilancia dell'Orafo,

* *Tav. I. Fig. 6.*

fo, e mette in agguaglio il peso di questo spirito col peso di un'altro. Esattissimamente si vedrà quanto l'uno peserà più dell'altro; perciocchè occupando una goccia d'acqua lo spazio di cinque, o di sei linee nel collo di tale Areometro, una linea di più, o di meno, che si fusse infusa, l'errore sarebbe di una quintesima, o sessagesima della goccia sopra a tutta la quantità misurata, locchè è pochissimo di vario, e frattanto sarà chiarissimo nell'Areometro, e facilissimo ad emendarli, coll'aggiunta di poco liquore, se manchi, o battendo col dito su l'imbuto del collo di quel vaso, che ne tien di vantaggio, nella qual maniera uscirà un poco del liquore per l'apertura del picciolo doccio.

Con questo Istrumento possono esaminarsi non solamente gli spiriti acidi; ma i sulfurei ancora, e tutte altre sorti di liquori; e poicchè questi soggiacciono a dilatarsi nel caldo, e restringersi nel freddo, nel Verno entrerà più di liquore in detto vaso, che nella State, cosa da imbarazzar coloro, che volessero comparar il peso di un'altro spirito acido, quale nella State avessero saggiato. Per dar compenso a questo inconveniente, io soggiungo quì una Tavola de' Liquori più considerabili, de' quali si servono nella Chimica, e vi noto il peso di essi, nel più gran calore della State, e nel Verno, mentre gela, dissaminato; affinchè quindi possa averli la prossima differenza, che tra queste due estremità di tempi, ne' quali si voglia far uso dell'Areometro, si frappone.

L'Areometro pieno di Mercurio nella State ha pesato 11 oncie, e 7 gran.

Nel Verno 11 oncie, e 32 gran.

Pieno di oglio di Tartaro, nella State 1 oncia 3 dramme, e 8 gran.

E 4

Nel

72 *Memoria dell'Accademia Reale*

- Nel Verno 1 oncia, 3 dramme, e 31 gran.
 Pieno di Spirito d'Orina 1 oncia, e 32 gran.
 Nel Verno 1 onc., e 43 gran.
 Pieno d'Oglio di Vetriuolo nella State 1 onc.
 3 dram. 58 gran.
 Nel Verno 1 onc., 4 dram., 3 gran.
 Pieno di Spirito di Nitro, nella State 1 onc.,
 1 dram., 40 gran.
 Nel Verno 1 onc. 1 dram., e 70 gran.
 Pieno di Spirito di Sale, nella State 1 onc.,
 39 gran.
 Nel Verno 1 onc., 47 gran.
 Pieno d'Acqua forte, nella State 1 onc., 1
 dram., 38 gran.
 Nel Verno 1 onc., 1 dram., 55 gran.
 Pieno di Aceto distillato, nella State 7 dram.
 55 gran.
 Nel Verno 7 dram., 60 gran.
 Pieno di Spirito di Vino, nella State 6 dram.
 47 gran.
 Nel Verno 6 dram. 61 gran.
 Pieno d'Acqua di Fiume, nella State 7 dram.,
 53 gran.
 Nel Verno 7 dram., e 57 gran.
 Pieno d'acqua distillata, nella State 7 dram.,
 50 gran.
 Nel Verno 7 dram. 54 gran.

L'Areometro voto pesava una dram., 28 gran.
 Questa Tavola divisa bene il peso esatto di
 ciaschedun di questi liquori, e la vera differenza
 degli uni dagli altri; ma non ci nota la quantità del
 sal volatile acido, e quella della flemina, donde
 vengono questi spiriti acidi composti. Per venirne
 a capo, ho aggiunta quì la maniera in una seconda
 Tavola, che dimostra, come una certa quantità di
 sal

sal di Tartaro l'abbia afforti da ciaschedun di tali spiriti acidi, sino a perfettamente satollarfene, e come detto sale si è accresciuto di peso, dopo lo svaporamento intiero di tutto l'umido. Questo aumento nota la vera quantità del sal volatile acido, che è stato assorbito nel liquore dal sal di Tartaro.

Per imbeverer un'oncia di sal di Tartaro, di Spirito di nitro, ve n'è bisognato un'oncia, due dramme, e 36 granelli; svaporata la flemma, il sal di Tartaro si è ritrovato accresciuto di 3 dram., e 10 gran.; donde si deduce, che 1 onc. di detto spirito di Nitro contenga 2 dram., 28 gran. di sal Volatile acido.

Per satollar dett'oncia di sal di Tartaro, di spirito di sale, ve ne son bisognate due oncie, 5 dram.; svaporata la flemma, il sal di Tartaro si è ritrovato accresciuto di 3 dram., e 14 gran.; donde deducesi, che un'oncia di questo spirito di sale contenga una dramma, e 15 gran. di sal volatile acido.

Per imbever detta oncia di sal di Tartaro d'cglio di Vetriuolo, si sono impiegate 5 dram. dell'olio; svaporata la flemma, s'è ritrovato il Tartaro accresciuto di 3 dram., e 5 gran., locche dà a conoscere, che un'oncia d'Olio di Vetriuolo contenga 4 dram. 65 gran. di sal volatile acido.

Per imbever detta oncia &c. d'acqua forte, vi è bisognata un'oncia, 2 dram., 30 gran.; svaporata la flemma, l'aumento del Tartaro è stato di 3 dram. e 6 gran.; dunque un'oncia d'acqua forte contiene 2 dram., 26 gran. di sal volatile acido.

Per satollarla di aceto distillato, ve ne son bisognate 14 oncie; svaporata la flemma, il peso accresciuto del Tartaro si è ritrovato di 3 dram., e 36 gran.; dunque un'oncia di aceto distillato, contiene

tiene 18 gran. di sal Volatile acido.

Applicando questa seconda Tavola alla prima, e paragonandola con gli Spiriti acidi, che alcun vorrà esaminare con un'Areometro di questa fatta, facilmente ritroverà la quantità de' sali acidi contenuta in uno spirito.

Potremo noi con tali osservazioni render ragione di molti fatti, che senza di queste, farebbe difficilissimo a spiegarsi. Per cagion di esempio, sappiamo, che un'oncia di acqua Regia, fatta da spirito di Nitro buono, e da sale Ammoniaco, scioglie due volte più di oro di quello, che non fa un'oncia di spirito di sale ugualmente spogliato dalla flemma, che lo spirito di Nitro. Per renderne ragione, siam noi obbligati di ricorrere alla debolezza delle punte di uno di questi due acidi, che facilmente cedono, & alla durezza dell'altro, che operano più lungamente, e dividono con più vigore le picciole parti dell'oro, ovvero ad altra simile ragione, qual non avrebbe, a dritto pensare, altro, che un'apparenza debole di verità: Ma queste osservazioni ci dimostrano, che un'oncia di spirito di Nitro ottimo contiene il doppio di sal acido di quel che un'oncia di spirito di sale s'abbia; sapendo allo 'ncontro, che gli spiriti acidi oprano più, o meno, secondo la quantità de' sali, che contengono; siam certi, che l'uno produca doppio effetto dell'altro, perchè contiene quantità doppia di sali acidi, più che l'altro.

In queste osservazioni ho notato un fatto degno di attenzione, qual si è, che'l sal di Tartaro in imbevendosi dello spirito di Aceto, ha ritenuto un'ottava di più del sal acido, di quello, che da spiriti acidi minerali avea assorbito.

La ragione di tal differenza potrebbe essere;
per-

perche le picciole parti del nostro sal acido vegetabile, essendo passato per i filtri della pianta, e sofferti in conseguenza tutti i movimenti di svariate fermentazioni del vino, e di sua distillazione, si son divise in più picciole parti di quelle d' un sal acido minerale, che non an sofferti tanti accidenti; poiche ha molto del probabile, che i sali acidi de' vegetabili siano l'istessi, che i sali acidi minerali, quali le radici delle piante suggono dalla Terra, insieme con l'umido, che le nutrice; E poiche le punte di dette radici, sono una specie di feltri; ammettano alcune certa sorta di sale, & altre altra, e che si trovino fra' sali essenziali delle piante alcuni di questi sali, che scoppiettano nel fuoco, e producono fiamma molto ardente, altri, che non rendono fiamma alcuna, ma saltellano ivi, e crosciano. Potrebbe ben'essere, che i sali acidi contenuti ne' sali essenziali, alcuni dal salnitro, & altri dal sal comune si producessero, &c. giacche ne danno i segni nel fuoco. Essendovi dunque molta apparenza, che i sali acidi delle piante, & i sali acidi minerali, siano di una istessa natura, e che differiscano solamente nella picciolezza delle parti, per la suddivisione, che quelli soffrono più di questi; noi possiamo senza pena concepire, che la materia porosa del sal di Tartaro ne ha potuto assorbire un poco più dagli uni, che dagli altri; e perche la stessa quantità di sal acido occupa molto più di liquore acquoso nell'aceto distillato, che nello spirito di nitro, e in alcun altro acido minerale; per l'istessa ragione ancora avvenga, che questo sal acido vegetabile sia più volatile, o più facilmente si levi nella distillazioni, che i sali acidi minerali.

MODO GEOMETRICO, E GENERALE

Da fare Cleffidre, ovvero Orologgi ad Acqua con tutte sorti di Vasi, ove si vogliano forati, con qualunque picciola apertura, donde l'acqua scorra, secondo qualunque Ipotesi di velocità: E reciprocamente da ritrovare detti Vasi per tutte sorti d'Ipotesi di tali velocità, e di tempi, secondo i quali debbanfi regolare gli abbassamenti della superficie dell'Acqua, che scola.

DEL SIGNOR VARIGNON.

A 28. di Agosto 1694. diedi all'Accademia una *Regola Generale del movimento delle superficie dell'Acqua contenuta dentro Vasi, o Conserve a misura, che e' si votano*. Eccone presentemente altra pur Generale da formar Cleffidre, la dimostrazione della quale non ha dipendenza affatto alcuna da quella.

I. Per comprenderne l'ampiezza, convien qui considerar tre cose, cioè il Vaso, per lo di cui foro l'acqua scorra, le differenti velocità, che l'acqua ha nell'uscire, & i tempi, secondo che la superficie di questa si abbassi. Date due di queste tre cose ad arbitrio, si cerca la terza.

II. Immaginatamoci perciò un Vaso a piacere, Cillindrico, o Conico, o Piramidale di qualunque base,

29. Aprile 1699; Tav. 2. Fig. 1. 2.

basse, o descritto dalla rivoluzione di una qualunque Curva FEO intorno al suo Asse verticale AO: O per comprendere tutto in generale, immaginiamoci un Vaso, metà della dicui sezione per l'Asse verticale AO, sia una qualunque linea FEO, che da ora in avanti chiamerò la *Prodottrice* di tal vaso; e le sezioni, secondo BE perpendicolari al suo Asse, simili tutte fra di loro, e di quella figura, che si vorrà. Sia questo Vaso forato a piacere, con picciola apertura O di qualunque figura, e sopra il suo Asse AO parimente due altre qualunque Curve, prima delle quali OVX (chiamata *Curva della Velocità*) esprima con le sue ordinate BV le differenti velocità dell'Acqua nell'uscire per la buca O, a misura, che la superficie di essa si ritrova in BE; e l'altra ATR (chiamata *Curva de' tempi*), esprima parimente con le sue ordinate BT i tempi, che questa superficie impiega a scendere da AF in BE.

Posto ciò, è chiaro, che la quistione si riduce a ritrovare una di queste tre curve a discrezione, FEO, OVX, ATR, date le altre due a piacere.

III. Sia $OB = x$, $BE = y$, $BV = v$, $BT = t$, l'apertura $O = c^2$, e la superficie dell'acqua in

$BE = z^2$. Si avrà $\frac{dz}{dt}$ per la velocità di questa su-

perficie nell'istante dt , secondo il quale BV esprime parimente la velocità dell'acqua nell'uscire per

la buca O. Dunque si avrà parimente $\frac{dx}{dt} \cdot v :: c^2 \cdot$

z^2 , poichè l'acqua del vaso scemando di quella parte sola, che esce dalla buca O, deve sempre es-

sere $vc^2 = \frac{z^2 dx}{dt}$, Dunque in generale $dt = \frac{z^2 dx}{vc^2}$.

ovvero $dt = \frac{bz^2 dz}{vc^2}$ in prendendo $b = 1$ per offer-
vare la legge degli omogenj ; tal equazione , o for-
mula in uno conviene alle tre curve FEO , OVX,
& ATR , in maniera che date due di esse , qual si
vorranno , sempre si ritroverà la terza sostituendo
in x , e nelle costanti i valori di qualche l'equazio-
ni delle curve date anno d'indeterminato in que-
sta formula ; perciocche l'equazione , che ne risul-
ta , farà sempre quella di questa terza curva ricer-
cata.

IV. Ma quantunque semplice, che si fusse que-
sta formula generale ; ella n'intriga in due quadra-
ture, quali ne rendono l'uso difficile, cioè alla qua-
dratura (c^2) dell'apertura O , qual si suppone di
qualunque figura, & alla quadratura (z^2) della su-
perficie dell'acqua BE , la quale dipende da quella
del circolo , allorache il vaso , che si richiede è in-
generato dalla rivoluzione della linea FEO intor-
no al suo asse AO : donde è , che io ne ho ricercata
altra , qual niente supponeffe di tutto ciò , e fusse
così generale, come la precedente : Eccola.

V. Oltre a' nomi di sopra (art.3) siano di più
 $AX = a$, $AF = b$, la superficie dell' acqua in
 $AF = f^2$, e la velocità di questa superficie $= 1$, fa-
cendo di AO un asse , che seghi la curva de' tempi
in A sotto un angolo di 45. gradi . Si avrà come
(art. 3.) $\frac{dx}{dt} \cdot v :: c^2 \cdot z^2$, e per l' istessa ragione
 $1 \cdot a :: c^2 \cdot f^2$. Che darà $c^2 = \frac{a}{f^2}$ dunque $\frac{dx}{dt} \cdot v :: \frac{a}{f^2}$.
 z^2 . Ma le superficie dell' acqua in AF , & in BE ,
essendo (art.2.) simili , di qualunque figura , che
per altro si suppongano , si avrà $f^2 \cdot z^2 :: bb \cdot yy$.

Dun-

Dunque ancora $\frac{dx}{dt} \cdot v : - \frac{a}{b} \frac{v}{v}$ locche pur dà in generale l'equazione, o la formula $dt = \frac{a v dx}{b v}$ comu-

ne alle tre curve FEO, OVX, & ATR, come quella dell'art. 3. , ma che non contiene quadratura alcuna, nè pur quella dell' apertura O, o della figura delle sezioni orizzontali del vaso da formarli la Cleffidra. Sicche con questa ultima formula si toglie il travaglio, se tal vaso sia stato formato dalla rivoluzione di FEO intorno al suo asse AO, o altrimenti; e se l'apertura O sia di tal figura, o in tal sito.

Formula Generale.

$$dt = \frac{a v dx}{b v}$$

VI. Per soddisfare presentemente all' art. 1. , cioè a tutte le condizioni richieste, vi son tre Problemi a sciogliere.

1. Dato un qualunque vaso da formar la Cleffidra con quella velocità d'acqua, con cui si supponga uscir dalla buca, secondo quella proporzione di tempi, che si vorrà graduar detto vaso.

2. Date tali qualunque velocità con i tempi, ne' quali si voglia, che si facciano gli abbassamenti della superficie dell' acqua, che scorre; ritrovare il vaso, cui le graduazioni, che risultano, convengano, per formar una Cleffidra.

3. Dato un vaso da far Cleffidra, con i tempi, secondo i quali si voglia, che gli abbassamenti della superficie dell'acqua scorrente si facciano; ritrovare quali dovriano essere le velocità nell' uscire per formare Cleffidra di tal vaso, cui si convenissero le graduazioni, che risultano da questi tempi.

Ma

Ma perche la soluzione di questi tre Problemi si deduce nell'istessa maniera dalla precedente general formula, in cui quella dell' due ultimi, di per se ci si presenta, basterà quella del primo, (che quì è come principale). Sia dunque solamente.

P R O B L E M A.

VII. * *Essendo dato un qualunque vaso da formar Cleffidra, ovvero sua linea generatrice FEO, con OVX, linea della velocità dell'acqua nell'uscire per la buca O, supposta a discrezione; graduar questo vaso, secondo quella proporazione di tempi, che si vorrà.*

Solut. Tutto quel che deve farli è, sostituire nella formula generale precedente (art. 5.) i valori di y , e di v ritrovati in x , & nelle costanti, per mezzo delle curve date FEO, & OVX; l'equazione, che ne risulterà, non avendo altre indeterminate, che x , e t , farà quella della curva ATR de' tempi, su de' quali devonfi regolare le graduazioni ricercate del vaso'l da formarli Cleffidra.

Per averle: descritta, secondo l'equazione ritrovata la curva ATR, sia una qualunque delle sue ordinate OR divisa ne' punti in Z, in quella ragion di tempi, che si vorran notare da A sino ad O sù la Cleffidra ricercata: Da tutti questi punti Z sian tirate altrettante ZT parallele all'asse AO, le quali incontrino la curva de' tempi in altrettanti punti T, da' quali bisognerà tirar ancora altrettante TBE parallele ad RO: I punti E saranno i luoghi del vase, ne' quali la superficie dell'acqua si ritroverà ne' tempi richiesti; & i punti B dell' asse, noteranno parimente le altezze, nelle quali dovrà allora ella ritrovarsi.

Par

* Fig. I. 2.

Per cagion d'esempio; se si divida OR ne' punti a in parti uguali, i punti B, & E noteranno le altezze, & i luoghi del vaso, dove la superficie dell'acqua deve in tempi uguali ritrovarsi: In maniere che se questi tempi siano di ore, di mezz' ore, de quarti d'ore &c., non bisognerà altro, che notarli con cifre convenienti sù di tali divisioni; & il vaso proposto sarà graduato nella proporzion de' tempi ricercata.

ESEMPIO PRIMO.

VIII. * Siano, secondo l'ipotesi ordinarie le velocità dell'acqua nell'uscire per la buca O del proposto vaso, come le radici dell'altezza di sua superficie superiore a detta buca. In questo caso la curva delle velocità OVX sarà una parabola ordinaria, il di cui luogo sia (se si voglia $v = \sqrt{px}$). Posto questo, se si cerchi inoltre, che 'l'vaso dato sia una piramide, ovvero un cono di qualunque base (a forma d'imbuto rivolto, ma la buca sia ove piacerà nell'altezza di AO) in maniera che la sua linea generatrice FEO sia retta, e formi col suo asse AO prolungato verso C un angolo rettilineo qualunque ACF; allora supponendo $c = OC$ parte di AC, si avrà $AC \left(\frac{aa}{p} + c \right) . AF(b) :: CB(c+x).$

BE (y) & in conseguenza $y = \frac{bp \times c + x}{bbpp \times c + x^2}$, ovvero $\frac{aa + cp}{aa + cp}$, ovvero

$yy = \frac{aa + cp^2}{aa + cp^2}$. Dunque sostituendo questi va-

lori di v , e di yy nella formula generale
Mem. F pre-

* Fig. 3.

precedente (articolo 5.) $ds = \frac{aydx}{appdx \times \frac{c+x^2}{2}}$, si avrà
 $ds = \frac{aydx}{aa + pc^2 \times \sqrt{fx}}$, la di cui integrale $s =$
 $\frac{30ac^2 \times ap^2 - p^3 \sqrt{fx} + 20acp \times a^3 - px \sqrt{px+6a \times a^3 - p^3 x^2} \sqrt{fx}}{15paa + cp^2}$

farà quì il luogo della curva de' tempi ATR , la
 quale descritta secondo questa equazione , avrà la
 sua ordinata OR $= \frac{30ac^2 cp^2 + 20a^4 cp + 6a^6}{15p \times aa + cp^2}$, che bi-

sogna dividere in Z, secondo la proporzion de' tem-
 pi ricercata; e compiendo il rimanente , come nel-
 la soluzione precedente (art. 7.) li punti B, & E es-
 primeranno li luoghi , ne' quali si deve ritrovare
 la superficie dell'acqua in tali tempi , mentre scor-
 re per la buca O . Et ivi si avverta , che detta cur-
 va ATR volgerà tosto la sua convessità verso OR,
 toccandola in R , e dipoi si curverà di nuovo per
 lo contrario rimpetto ad $x = \frac{2}{3}c$.

IX. * Se presentemente si voglia, che la buca
 O sia nel fondo del vaso, come nel fondo di un im-
 buto di qualunque base; avendo C in O, ovvero
 CO (c) $= 0$; il luogo precedente (art. 8.) della
 curva de' tempi ATR, si cambierà quì in $s =$
 $\frac{6ab - 6ap^2 x^2 \sqrt{fx}}{25a^4 p} = \frac{2a^3 - 2f^2 x^2 \sqrt{fx}}{5a^3 p}$. Locche di-

mostra, come questa curva ATR sia quì una secon-
 da Parabola del quinto grado, il di cui asse è OR $=$
 $\frac{2aa}{5p}$ ($\frac{2}{3}AO$) vers'il quale ella presentemente rivol-
 ge la sua concavità M dal punto R , e va senza al-
 cun

* Fig. 3.

con punto di contorno a rincontrare AO in A sotto l'angolo supposto di 45. gradi.

X. Se in fin si supponga (art. 8.) ; che il vaso dato sia un cilindro di qualunque base, allora FE parallela ad AO, rendendo OC (c) infinita l'equazione della curva de' tempi ATR ritrovata

nell'art.8. , si cambierà quì in $t = \frac{2an - 2a\sqrt{px}}{p}$,

locche dimostra , come questa curva debba quì essere una parabola ordinaria , sommità della quale,

e l'asse sono R , & $OR = \frac{2at}{p}$ (2AO) , la di cui

curvatura presentemente è controposta alla precedente , ritrovandosi la sua convessità rivolta verso OR , che tocca in R.

Quindi facilmente si deduce il metodo ordinario di fare le Clepsidre cilindriche : cioè per aver i punti B, quali disegnino tempi uguali, per cagion di esempio, 12. ore sopra AO, bisogna concepire AO divisa in 144. parti uguali (quadrato di 12), sottraendone OB di 121 (quadrato di 11), suo primo, o più alto punto B farà quello della prima ora . Da questo OB sottrattone l'OB , che siegue di 100. parti (quadrato di 10) questo secondo B farà quello della second' ora , e così degli altri : Di maniera che da questi 144. parti uguali bisogna prenderne 23 per la prima ora dello scolo , 21 per la seconda , 19 per la terza , 17 per la quarta , & infine 1 per la dodicesima , sempre secondo l'ordine de' numeri impari.

F 2

ESEM.

• Fig. 5.

ESEMPIO SECONDO.

XI. * Rimanendo la velocità dell'acqua nell'uscire dal buco O, l'istessa dell' esempio precedente (art. 8.), cioè come le radici delle altezze della superficie dell'acqua superiore a detta buca; sicche la curva OVX, che con le sue ordinate l'esprime, sia una parabola, il di cui luogo sia $v = \sqrt{px}$; se presentemente si voglia, che la curva generatrice FEO del vaso dato, sia una qualunque sezione Conica, sommità della quale sia O; si può soddisfare in una volta a tutte le sezioni Coniche, servendosi del loro general luogo $2mn^2x + 2m^2nx + n^2 - m^2x^2 = m^2y^2$ poicche dando questo luogo $yy = 2mn^2x + 2m^2nx + n^2x^2 - m^2x^2$

se si sostituiscano questi valori di v , e di yy nella precedente formula generale (art. 5.) $dt = \frac{aydx}{bbv}$, si cambierà quì in $dt =$

$$\frac{mn^2 + 2mn^2n + n^2x + n^2 - m^2x}{p^2m^2\sqrt{px}} \frac{dx}{20mn^2 + 20m^2n + n^2p - ap^2x\sqrt{px} + 6n^2 - 6m^2 - ap^2x^2\sqrt{px}}$$

la di cui integrale sarà il luogo generale del-

la curva de' tempi ATR, qualunque sia la sezione Conica (al di dentro) della linea generatrice FEO del vaso dato, cioè qualunque sia la ragione di m ad n ; giacche per la sola varietà di tal ragione, si ritrova, che la curva generatrice sia tale, o tale se-
zio.

* Fig. 6.

zion Conica, Parabolica cioè, quando $m = n$; Iperbolica, se $m < n$, Ellittica, se $m > n$, e circolare, quando m è infinita.

XI. Si scorge ancora quì in generale, che se si prenda (parallela ad AX) OR $\Rightarrow$

$$30mm^2a^2p + 20m^2na^2p + 6n^2a6 - 6m^2a6$$

la curva ricerca:

ta ATR ^{$15b^2m^2p^3$} incontrerà perpendicolarmente rivolgen-
do la sua cavità verso OR fino a $x \equiv \frac{2mm^2 + 2m^2n}{3m^2 - 3n^2}$,

dove ella si rivolgerà a contrario verso se 'l suo angolo di 45 gradi in A con AO, darà quì $b^2m^2p^2 \equiv 2a^2mn^2p + 2a^2m^2np + n^4n^2 - n^4m^2$, donde risulterà il valore di quella, che si vorrà di tre indeterminate costanti m, n, p ; essendo l'altre due a piacere.

XIII. Ritrovata la Curva de' tempi ATR per li tre casi, ne' quali la generatrice del vaso FEO può essere (al di dentro) una sezion Conica; non bisogna altro, che dividere OR ne' punti Z nella ragion de' tempi ricercata, e compire il resto, come nella soluzione precedente (art. 7.); poichè li punti B, ovvero E, o piuttosto B, & E, segneranno i luoghi, ne' quali deve ritrovarsi la superficie dell' acqua in detti tempi scorrendo per la buca O del vaso formato dalle tre sezioni Coniche affunte.

ESEMPIO TERZO.

XIV. † Se presentemente si voglia, che la curva generatrice del vaso FEO sia una Iperbole equilatera presa per di fuori, il di cui luogo tra le asimptote OA, OP, sia (se si voglia) $aa \equiv xy$,

F 3

ovv.

• Fig. 7. † Fig. 6.

ovvero $yy = \frac{a^2}{xx}$, e le velocità dell'acqua nell'uscire per lo foro O di detto vaso, come quì sopra, cioè $v = \sqrt{px}$; non bisognerà altro, che sostituire ancora il valor di quelli due yy , e di v nella formula generale (art. 5.) $dt = \frac{a, y, dx}{bbv}$, si avrà quì $dt = \frac{a^2 dx}{b^2 x^2 \sqrt{px}}$

integrale della quale $t = \frac{2a^2}{3b^2 x \sqrt{px}} - \frac{2a^2 p}{3b^2}$ farà

il luogo della curva de' tempi ATR, che si conosce dover essere una seconda iperbole cubica, & OR una delle asimptote, e l'altra farà PQ parallela ad AO; prendendo $OP = \frac{2a^2 p}{3b^2}$ sopra RO prolun-

gata, e quì si avrà $p = b$. L'equazione $cc = xy$ avrebbe dato parimente $t = \frac{2ac^2}{3bbx\sqrt{px}} - \frac{cc^2 p}{3bba^2}$, & $p = \frac{aab}{cc}$.

XV. Essendo la maniera di servirsi di questa curva QAR per graduare secondo quella proporzione, che si vorrà, il vaso, la di cui iperbole al di fuori FEO fusse la produttrice, l'istessa con quella di sopra (art. 7. &c.), non occorrerà altro: Basta quì avvertire; che per picciola, che fusse l'altezza finita AO dell'acqua contenuta in questo vaso, e per grande allo 'ncontro, che fusse la buca finita O, donde si suppone, che ella scorra, non vi vorrebbe meno di un tempo infinito per votarla; cioè un tempo più grande di qualunque tempo finito, che possa mai supponersi; se mai sia possibile un tal vaso.

O S S E R V A Z I O N E I.

1. Potrebbero darli altri esempj di tutto ciò, ne' quali la buca O non fosse nel fondo del vaso, o nella sommità della sezion Conica, che lo forma; essendo però il metodo l'istesso con quello del primo esemplo; non bisogna arrestarci di vantaggio.

2. Intanto bisogna avvertire, che quantunque la graduazione di queste sorti di Clesidre, secondo tale arbitraria divisione de' tempi, che impiegano a votarsi, non dipenda in modo alcuno dall'ampiezza della buca, donde l'acqua scola; non lascia però la durata di averci dipendenza; poicché, secondo che questa buca sarà più, o meno grande, l'acqua si discaricherà più, o men velocemente. Per far dunque, che durino quanto si voglia, bisogna cambiare questo forame in un'altro ugualmente allogato, che sia a quelli, come il tempo, che consuma nel votar l'acqua a questo, qual si vuol mettere; poicché in uguale altezza, essendo le velocità uguali, i prodotti de' tempi per le aperture, sono come le quantità delle acque, che scorrono, le quali sono quì le stesse in tutte due (*Ipot.*)

3. La soluzione de' due altri Problemi cennati nell'art.6., si deduce parimente dall'istessa formola generale (art.5.), di cui sinora ci siam serviti; sostituendo solamente i valori dati di v , e di dt per la soluzione del secondo Problema, ovvero di y , e di dt per quella del terzo: Egli è chiaro, che la sola sostituzione di dt , che risulta dall'equazione della Curva de' tempi ATR, nell'uno, e nell'altro di questi Problemi data, lascia ancora questa equazione comune alle due altre Curve FEQ, & OVX: In maniera che dopo ciò non bisognerà altro, che so-

sostituire il valore di v , ovvero di y , per rendere questa equazion particolare alla Curva generatrice del Vaso ricercato, o a quella delle velocità dell'acqua nell'uscir per lo forame O dimandate: Ond'è, che s'imo di non esservi altro bisogno sù di ciò. Ma è troppo celebre, da non poterli quì omettere, la Clessidra, che sembra essere itata richiesta da *Torricelli*, e ritrovata dal Sig. *Mariotte*, nella quale l'abbassamento uniforme della superficie dell'acqua, che scorre con velocità supposte, era come le radici delle altezze; & allo 'ncontro presentandosi tosto ella nel nostro Metodo; farebbe il supprimere questo esempio del secondo Problema un risparmiar non molto.

XVI. * La dimanda è dunque, secondo il Sig. *Mariotte* (del movimento dell'acque part. 3. disc. 3.) di ritrovare un Vaso di figura tale, che essendo forato nel fondo con picciola apertura, l'acqua superiore, in calando, passi in tempi eguali per uguali altezze. In tal caso essendo dati i tempi BT, come li spazj AB, la linea de' tempi ATR sarà diritta, & ABT un Triangolo rettilineo, che darà $dt = dx$, per cagion dell'Angolo BAT supposto di 45. gradi; Si avrà in oltre $v = \sqrt{px}$, secondo l'ipotesi delle velocità dell'acqua nell'uscire per la buca O, che quì si fa, come la radice delle altezze di sua superficie al di sopra del buco. Non bisogna altro, che sostituire le valute di dt , e di v in loro luogo nella formola genera-

le (art. 5.) $dt = \frac{ay dx}{bv}$ per cambiarla in un subito

in $1 = \frac{ay}{bb \sqrt{px}}$, ovvero $\frac{bb \sqrt{px}}{a} = yy$, che sarà il

luo-

* *Fig. 8.*

luogo della Curva ricercata OEF . Donde si conosce, che tal Curva deve essere una Parabola quadrato-quadrata, come il Sig. Mariotte l'ha ritrovata, e che io a 28. di Agosto dimostrai parimente all'Accademia in una maniera ancor brieve.

XVII. Se in luogo di $v = \sqrt{px}$ avessi preso $v = xq$ avrei avuto ancora $\frac{b^2 x q p}{b^2 x q p} = yy$ per

luogo generale di tutte queste Curve generatrici de' vasi FEO, ne' quali gli abbassamenti della superficie dell'acqua, che sciolerebbe per O, con velocità xq , sarebbero come a' tempi, cioè uguali in tempi uguali: Locche, prendendo $q = \frac{1}{2}$ darebbe

ancora $\frac{b^2 \sqrt{px}}{b^2 \sqrt{px}} = yy$, cioè la prima Parabola qua-

drato-quadrata, per generatrice FEO del vaso proprio per tal'uso nell'ipotesi ordinaria, in cui le velocità dell'acqua nell'uscire dal buco O, sono, come le radici delle altezze di sua superficie al di sopra di tal buco. Se si facciano queste velocità

come le altezze, cioè $q = 1$, si avrà $\frac{b^2 x}{b^2 x} = yy$ alla

Parabola ordinaria, per luogo della Curva generatrice del vaso in tal caso richiesta. Se tali velocità sian come i quadrati delle altezze, cioè $q = 2$, questa linea FEO sarà retta, & FOA un Triangolo rettili-

neo rettangolo in A, il di cui luogo sarà $\frac{b^2 x^2}{b^2 x^2} = yy$,

ovvero $x = y$. Se si prenda $q = -2$, questa

Curva generatrice del vaso FEO, sarà una iperbole

ordinaria, e'l di lei luogo $\frac{b^2}{b^2} = xy$: E così degli

altri

altri casi in infinito , ne' quali la superficie dell'acqua contenuta si abbasserebbe ugualmente in tempi uguali , qualunque si fusse la potenza delle altezze , che produce la velocità dello scolo per la buca O.

XVIII. Quanto alle altre velocità dell'acqua , che nell'uscir dalla buca O potrebbero immaginarsi in questa ipotesi d'abbassamento uguale di sua

superficie in tempi uguali ; l'equazione $\frac{a}{v} = \frac{y}{v}$ le

comprenderà con le precedenti tutto , e comprenderà ancora in una fiata tutte le Curve generatrici de' vasi propj a questa ipotesi : Sicche sostituendo solamente tal valore di v , che si vorrà; questa equazione diverrà quella della Curva generatrice FEO del vaso in simil caso richiesto : E reciprocamente qualunque valore di y si sostituisca in questa istessa equazione , diverrà quella della Curva OVX delle velocità , che l'acqua dovrebbe avere nell'uscir dalla buca O del vaso dato , perche gli abbassamenti di sua superficie sian tali , qua' si dimandano , cioè uguali in tempi uguali . Ma tanto basta : Vedete la somma agevolezza , che si ha nel ritrovar tutto ciò col nostro metodo , cioè di dedurlo da questa formula , o dalla generale dell'art. 5., donde questa sorge.

OSSERVAZIONE II.

E' bastato finora il sapere , che le sezioni orizzontali de' Vasi da formar Cleffidre sian simili , qualunque per altro si fussero le loro figure ; ma se non li fussero, bisognerebbe arrestarsi alla formula

$\frac{dx}{v f^2} = \frac{a z^2 dx}{v f^2}$, che dà l'Analogia $\frac{dx}{v f^2} : \frac{a z^2 dx}{v f^2} :: \frac{f^2}{a} : \frac{z^2}{1}$ del-

l'artic. 5. , nel quale i valori delle superficie , o sezioni orizzontali rimarrebbero ancora a sostituirsi, secondo la natura de' vasi , de' quali è quistione . Per cagion di esempio , se questi vasi fossero cilindrici orizzontali di qualunque base , aventi i loro Assi verticali , o parimente cuneo conici di sezioni verticali , e di qualunque vasi fatti a simiglianza di que' , che dice il Sig. *Wallis* nel fine della sua *Algebra* ; le sezioni orizzontali di questi vasi , dando allora $f^2 . z^2 :: b . y$ questa formula diverrebbe $dt = \frac{ay dx}{bv}$ della quale bisognerebbe fare l'istesso uso ; che della generale dell'art. 5. , e così di tutto ciò , che può uniformemente darfi $dt = \frac{ax^2 dx}{vf^2}$.



DE.

DESCRIZIONE
DI UNA NOVELLA FOGGIA DI PORTA
DI CHIUSA,

*Posta in uso per la novella navigazione della Senna;
letta nell'Accademia*

DAL SIGNOR DES BILLETTES.

* **Q**uesta Porta è affatto singolare, nè simile ad altra, che ho veduta adoprarfi in tutte navigazioni.

Eccone le proprietà Principali.

1. Risparmia ella per lo meno un piede di scavamento; vantaggio, che ogn'uno sa, quanto sia grande in simigliante affare.

2. Have una straordinaria forza da non vincerfi mai.

3. Non è ella attaccata a Palizzate; che è quanto dire, lontana da quell'inconvenienti, cui soggiacciono tutte le altre, che così son formate.

4. Viene da un sol'Uomo aperta, con tanta prontezza, e facilità; che un Marinajo nella distanza di 100. passi, o sopra, o sotto che e' sia, dando il segno con la Cornetta, o con altro strumento, la ritrova aperta prima del suo arrivo. Non è perciò mai interrotta la navigazione, come per ordinario delle

• 3. Maggio 1699.

delle altre Porte avviene , per quali aprire , vi si consumano ore intiere.

5. Se ha bisogno di risarcimento , due soli Uomini la possono tirare dall'acqua in un quarto di ora , e questi stessi all'istante rimetterla racconciata.

6. In un momento può nettarsi quel sabione, o altra tal cosa, che radunati impediscano l'apertura di essa.

7. Quantunque ella sia semplicissima , è però la più sicura di tutte altre finora poste in uso , di spesa minore , nè sottoposta a quegli avvenimenti, a' quali le altre soggiacciono.

Fù ella inventata dal Sig. Duca di *Rovana* , il quale senza studio era capace, con la sola agguftatezza della mente per sua natura geometrica , d'inventare tutto ciò , che vi ha nelle *Mecaniche* di più Ingegnoso , e quello più , che alle acque si attenesse ; siccome era egli pronto a discorrere con infinita adeguatezza su di ciò , che può esservi di certo nella *Fisica* , e generalmente sopra di tutte materie , quali non dipendessero , per discutersi, da concatenazione di principj arbitrarij.

C O S T R U T T U R A .

Per iscanfar le minuzie maggiori , come quelle , che sono aliene dal disegno di questo estratto , riferbandole sì per un trattato della *Maniera da rendere i Fiumi navigabili* ; darò qui un disegno geometrico della Porta , col profilo di un membro di essa , senza entrare nello spiegamento del cerchio di fuori , di sotto , delle Cataratte , o imposte , &c. quali e' pur si sà , che siano necessarj a tutte le Porte di Chiuse , a buche , & animelle di *Mulin*i , &c.

Aven-

Avendo dunque supposto lo scavamento, qual debba appunto essere, & i due tavolati di sopra, e di sotto proprii allo alloggiamento di questa Porta, così aperta, che chiusa, con tutte le condizioni necessarie, per impedire, che l'acqua non vi scorre per di sotto, e non ruini le Palizzate del Canale; basta qui avvertire, che questi due tavolati son contenuti, e come in uno ridotti, & uniti da una comune pianta, o come dicono Piattaforma, a tutti e due, di cui fanno essi una parte. Questa pianta, o piattaforma è rappresentata qui da quattro linee puntate AB, BA.

Viene ella formata da quattro pezzi Curvi di legno posti per capo, che compiono la lunghezza di 48. piedi, e son 18. dita larghi: La Centina è di due porzioni di circolo, che s'incontrano nel mezzo del Canale ne' punti BB, centri de' quali son 30 piedi in giù un poco sporti in fuori dal livello. Il Canale si rappresenta qui da due parallele puntate CCCC.

In ciascheduno di detti Centri è fitto un buon palo lungo 15, o 16 piedi, e grosso 18, o 20 dita, di cui rimane fuori della Terra la sola lunghezza di due piedi, e mezzo, a forma d'arpione torniato, diametro del quale sarà di 10 dita: Detti due pali sono i perni della Porta, come PP.: si è dopo pensato, in vece di detti Arponi, su'l grosso del legno, di segar il capo del palo intero, e nel centro di esso piantarvi un perno di ferro di 4 dita, o poco più di diametro.

Ecco frattanto in che consiste la sola Porta.

Hà ella due Imposte, ciascuna delle quali vien composta da due gran braccia, e due picciole.

Le

Le grandi DDDD son pezzi di legno 30 piedi lunghi, e grossi di 10, o 12 dita quadrati, uniti, e ligati insieme nell'estremità di sotto, con cinghie di ferro, o da spannali aguti; e per la punta di sopra si dividono nella lunghezza di 5 ò 6 piedi: Poco più di un piede giù dalla loro unione evvi una buca intagliata ritonda, in cui s'immettono gli arpioni de' perni: E l'estremità divise si congegnano con due legni curvi 12 ò 13 piedi lunghi, e grossi 7 dita quadrati, come EE, quali sono centinati, come la pianta, o piattaforma, rincontrandosi parimente in BB, allora che la porta è chiusa; quali legni son pur fermati per una, e per altra parte da ligami congegnati F.

Dieci piedi più giù di dette curve, le braccia vengono sostenute dalla traversa GG, e con un'altra nella distanza di 8, o 9 piedi dalla punta di basso.

Intorno a 6 piedi dalla sudetta estremità si ergono due altre minori braccia, quali col capo di sotto si comettono nell'incavo H, indi si discostano per un angolo molto aguto, alzandosi circa quattro piedi sù, e con questo altro lor capo s'incastrano in un'altra Curva parallela alla prima: Son pur queste sostenute da due stipiti congegnati con le gran braccia verso I.

Si vede uno di questi piccioli bracci attaccato al grande, & ad una sezion delle Curve Superiori, ed inferiori nel profilo, che quì a basso descriverò.

Siccome le braccia più grandi sono con ligami incastrati alle Curve di sotto, che posano sù la pianta, o piattaforma, che dicono; Così le picciole con simili argomenti sono attaccate a Curve 4 piedi più alte di queste, e sono ancora sostenute da traversa, come G.

Tali

Tali Curve alte, e basse sono unite con i stipiti, e ligami in ciascheduna congegnati; si vedono gl'incavi dell'incastramento in 12 luoghi delle Curve basse.

Verticalmente a dette Curve nella parte loro convessa vi son conficcate Tavole, che formano una lezione di Tamburo; donde fatti, che l'acqua si sostenga alta su 'l Tavolato di sopra, e di sotto: Si dà a queste l'altezza di 6, o al più 7 piedi, secondo l'acqua, che sostener devono a proporzion delle palizzate, e ripe de'Canali.

Il profilo di dette Tavole si osserva in ee.

I due Stipiti, che sono nell'estremità di ciascuna Curva, an sott' essi una girella, o cilindro di 10. dita di diametro sopra 7 di lunghezza, sù le quali 4 girelle si muove la porta sopra la pianta, o piattaforma: Una di esse è posta nel cennato profilo j. Sotto le Tavole per la parte d'avanti (ovvero sopra l'acqua) si adattano piccioli assi distesi su'l gherone, e con gangheri uniti, in maniera che si possano, come i coperchi de'Forzieri aprire, e muovere, quali battono sù di una listra di legno rialto, e conficcato sù la pianta, o piattaforma, secondo la sua centina di lungo; sicchè non possa perciò l'acqua scorrer per sotto la porta, e per l'interstizj delle girelle: E nell'istesso tempo se avanti, o sopra di essi vi si arrestino erbe, sabbia, legni, o altra simigliante cosa, in un attimo si faccian passare per sotto la porta, rialzando con una catenetta, ovvero uncino detti piccioli assi.

Per facilmente aprire, o chiudere detta porta; si pianta a dritta, e manca, molto da presso alla sponda del Canale un'argano, ovvero tornò per ancora verticale. Nella circonferenza di detto argano sù la parte superiore per due capi, uno prossimo all'altro,

altro , si conficca una catena di ferro , qual primo si fa girare intorno ad una carrucola , ovvero girella attaccata alla palizzata ; sicchè un Uomo solo con una lieva raggirando detto argano , o torno , in un verso apra la porta , e per un'altro la chiuda in brevissimo tempo .

Ciascuna imposta di essa , qualora è aperta , si ripone in un incavo dell' istessa profondità delle tavole , qual si rappresenta dalle linee puntate AKL: Questo io chiamo *Stagno* , perciocchè ivi l' acqua non ha il suo corso . Per impedire , che i Battelli urtino ne' perni , si piantano avanti di questi due pali QQ, detti *Pali di difesa*.

Puo ancora farsi , come alcuna volta ho praticato , detta Porta semplice , cioè di una imposta , che occupi tutta la larghezza del Canale . Ella ha due braccia grandi nelle sue estremità , cioè a destra , e sinistra , e due altre più corte fra dette due , che metton capo in una tramezza , quale sostiene le due grandi . Io non vo quì , far parola di questa , sì perchè non differisce molto nella struttura , come perchè la precedente è molto migliore . Questa semplice ha una sola imposta centinata in tutta la larghezza del Canale , gira intorno ad un perno solo , ne ha bisogno di doppio stagno , ma d' un solo da riporvili , qualora sia aperta : E quantunque un solo perno debba sostenere tutto l' urto dell' acqua del Canale , quando allo 'ncontro la porta a due imposte , ha due perni , ciascun de' quali divide detto sforzo ; pur non riman quella semplice di essere più eccellente , & in alcuni casi , ne' quali non possono farsi i Stagni in tutte due li lati del Canale , di essere ancor necessaria .

*Spiegamento del Preffilo di una delle Imposte, che
bisogna immaginare elevata su 'l Pian geome-
trico delle altre.*

aa DDIR unione del grande, e del picciolo braccio con uno de'stipiti della Porta disegnato dalla lettera R.

H Luogo dell' Incavo segnato nel piano della Porta: I uno stipite, che sostiene le due braccia superiore, & inferiore.

P uno de' due grossi Pali, che servono di perno alla Porta: **T** L'arpione.

M E'una traversa di due larghi pezzi uniti pe' fianchi, per abbracciare insieme l'arpione.

N Uno de' due Pali, che sostengono la Traversa cogl'Incavi, e servono con questa ad affodare più il perno contro l'urto dell' acqua, che riceve la Porta.

J E' una delle quattro girelle attaccata con perni a' Stipiti incavati: Altra si vede a parte.

ee Una delle Tavole; che formano le Imposte della Porta.

S A G G I.

Per esaminare i Sali delle Piante.

DEL SIGNOR HOMBERG.

* **N**OI offerviam tutto giorno, che alcuni Sali essenziali delle Piante producono nel fuoco

* 16. Maggio 1699.

fuoco gli effetti del Salnitro , e altri quello del Sal comune ; donde crediamo , che potrebbero essi contenere un vero Salnitro , e Sal comune succiati dalla Terra per mezzo delle radici di esse Piante , senza cambiar natura ; se pur questo non addiven- ga dalla mescolanza di differenti Sali, che una istes- sa Pianta abbia potuta assorbire .

Ma vedendo allo 'ncontro , che due Semplici di svariata natura piantati sì da vicino , che le loro radici dentro al terreno si intralcino , non lascino di conservar ciascheduna i loro particolari odori , e sapore , quantunque nutrite da un' istesso sugo , buono ugualmente per l'una, e per l'altra ; ho pen- sato, che tal sugo , dopo di essere stato succiato, per vigor di fermentazione , o di altro , cambiasse la natura del Sale introdotto nella Pianta con es- so , in maniera , che il puro nitroso potesse prende- re la forma del Sal marino, o di un Sal volatile uri- noso , secondo gli organi , & i formenti naturali della Pianta . Per tormi di tal dubbio , ho fatte l'e- sperienze , che sieguono.

Ho posto in un gran Tino buona terra nera di Giardino , l'ho lavata , con più acque bollenti per ispogliarla di tutti i sali , che potesse mai contene- re ; indi ne ho riempite quattro Casse larghe, e pia- ne , ho irrigato il terreno di due di questi vasi con dell'acqua , nella quale aveva io disciolto il salni- tro , in maniere che in ciascheduna di dette due casse vi si fossero intromesse circa due oncie di sal- nitro , contenendo ogni vaso qualche 200. libbre di terreno.

Le altre due Casse io lasciai col lor terreno in- sipido, avvertendo, che fossero irrigate con sola ac- qua pura , perche non vi entrasse cosa da far suspi- care , che seco avesse del sale.

Seminai del finocchio in una di queste casse irrigate col nitro, come nell' altra Intipida; e nelle due altre il crescione di Giardino. Germogliaron ugualmente bene le granella del seme in tutte quattro le casse, le irrigai con acqua di Fiume in que' giorni, che non pioveva, e lasciai, che crescessero fin'attanto, che'l Crescione fusse innalzato a 7. o 8 dita: Allora io lo sbarbicai, e dopo di averlo mondato da tutto il terreno, ritrovai, quello che era allevato nel terreno insipido pesare 25. oncie, e l'altro, irrigato col nitro 27. oncie, e mezza. Gustai l'uno, e l'altro, così l'erba, come le radici, nè vi ravvisai differenza alcuna.

Volendo disaminar col fuoco tali piante ancor fresche; posi in un lambicco di vetro una libra, e mezza di ciascheduna con le loro radici, per distillarle in un'istesso tempo in due ritorte a bagno vaporoso. Sù le prime le tenni in un molto leggier fuoco, che lentamente accrescevo, per separarne tutto l'umido; dopo di che l'avanzai fino a fuoco di arena.

Si ritrovò il liquore acquoso di ugual quantità, poche granella meno, quale non diè segni di acido dal principio della distillazione fino al fine.

Il crescione piantato nella terra intipida diè una dramma di sal volatile, e quello, che fù allevato col Salnitro ne diè 75. granella.

L'olio dell'uno, e dell'altro era ancora quasi che uguale, cioè due dramme e 26. granella quello della terra insipida: e 2. dramme, e 32 granella quel della nitrosa: E l'uno, e l'altro molto consistente.

Il sal fisso dava molto del ranno, & il crescion nitroso ne produsse due [dramme; l' insipido uno dramma, 67 granella.

E' così

E'così piccola fra le due Anallisi di queste piante la differenza, che potrebbe tenerli per nulla; perciocchè i vali più, o meno ben lutati, lasciano scappar via più, o meno i principj volatili, e la terra morta calcinata in un fuoco più, o meno violento, o li feltri del ranno, avendo ritenuto più, o meno della lisciva, faran ritrovare una picciola differenza tra' sali fissi. Se frattanto si voglia avvertire, si conoscerà, che 'l terreno irrigato col nitro ha prodotto un poco più d'olio, di sal volatile, e di sal fisso, che l'altro: E facile, che 'l nitro effettivamente abbia rifiuto un poco di sale alla Pianta; ma poichè l'istesse lavande non an potuto portar via maggior materia untuosa dall'uno di questi due terreni, che dall'altro; e poichè il terreno nitroso ha prodotto un poco più d'olio, di qualche non ha fatto il terreno insipido; bisogna, che 'l nitro sia servito da dissolvente del grasso della sua terra, e che perciò questo abbia potuto più facilmente essere dalle radici della pianta succiato.

Se a questo si voglia aggiugnere, che l'istessa quantità della semenza abbia prodotto il crescione della terra insipida due oncie, e mezzo, meno, dell' altro irrigato col nitro; può giudicarsi, che se i sali non sono assolutamente necessarij per lo germoglio, & accrescimento delle piante, che pur nelle terre scipide si producono; giovano però all' aumento, e forza delle stesse; poichè nella terra irrigata col nitro, non solamente è maggiore; ma ancora il nostro Crescione di tal terreno ha dato nell' Analisi principj più attivi dell'altro.

Lasciai crescere il finocchio più lungo tempo, fin attanto, che venne fuori la gemma de' fiori: Ritrovo allora una molta considerabil differenza tra la quantità, e condizione dell'istessa Pianta semi-

nata nelle due Casse : quello della terra insipida era magro , basso , e di un verde accostantefi un poco al giallo ; e sbarbicato dalla terra , il di lui peso , montava a 19. oncie ; quandoche il finocchio del terreno irrigato con nitro , era più bello , verde , bruno , alto , un quarto più dell' altro , e 'l peso giungeva a due libbre , e di vantaggio.

Pigliai diciannove oncie di ciascheduna di queste Piante fresche con tutta la radice , per farne analisi , come del Crescione . Il liquore acquoso fu più acido nel principio , e più , e più si accrebbe nell'acidezza infino al fine : Il Finocchio della terra insipida ne rese 15. oncie , cioè quasi un oncia di più dell'altro.

Da quello della terra nitrosa si ebbe una dramma , e 12. granella di olio ; da quello del terreno insipido 62. granella.

L'uno , e l'altro non diedero sal volatile , ma solamente una leggiera effervescenza con l'ultim, oncia del liquore acquoso.

Il Sal fisso dava poco della lisciva ; quel della terra nitrosa ne avea tre dramme , l'altro due dramme , e 10. granella.

Una delle due ultime Piante rendè più liquore acquoso , men oglio , e sal fisso dell' altra ; forse , perche l'una era più avanzata , cioè più prossima a fiorire dell' altra , qual differenza si osserva per ordinario nelle piante , secondoche sono esse più , o meno venute a maturezza , al che si potrebbe aggiugnere ancora , che l'una era più misera dell' altra.

Bisogna quì osservare , che i semi dell' una , e dell' altra Cassa siano ugualmente bene furti dalla terra ; e che le giovani piante per molti giorni abbian continuate a crescere uguali , così del finocchio , come del Crescione : Ma dopo il crescimento

di circa un mese , cominciai ad avvedermi della differenza tra' due vasi de' finocchi , uno avanzandosi più , e l'altro rimanendo quasi nello stesso stato , benchè ugualmente irrigati . Non potei avvedermi dell'istessa cosa nel Crescione , che troppo presto sbaroicai per farne l'Analisi : Forse che l'accrescimento di questa pianta non sarebbe stato dissimile da quello del finocchio , se l'avessi lasciata crescere più lungamente ; giacchè pur si ritrovò più di due oncie minore quello del vaso insipido , dall'altro .

Egli è facile , che la giovane pianta riceva nutrimento , e forse dalla sua secondina , o da due grossi lobi , per cui la sua semenza lo somministra ; e che mentre detti due lobi sussistono , non abbia ella bisogno d'altro , che della semplicissima acqua , qual risale dalle radici alla secondina , preparata la porga al corpo della giovane pianta come un convenevol succo . Ma consunti che siano detti lobi , la pianta cerca il suo nutrimento nella terra , dove bisogna , che l'umido , qual vi ritrova , sia accompagnato con alcuna materia pingue , e salina , che possa arrestarsi nelle fibre della pianta , mentrecchè la semplice umidità acquosa svapora ; altramente ella riman da crescere , & in fine perisce : Locchè io credo essere stata la cagione , perchè il nostro finocchio del vaso scipido non abbia continuato a nutrirsi , come l'altro .

Egli è vero , che non sia perito affatto ; forse perchè le semplici lavature fatte con acqua calda , non son capaci intieramente di spogliare il terreno dal sale ; ma che ne tolgano solamente quello , che è più facile a discioglierli , privando con ciò la pianta di quella parte confacevole alla sua nutrizione , rimanendovi sempre ciò che il terreno può rattenere di materia untuosa indissolubile dall' acqua .

è vero, che tal materia sia una delle principali parti, per lo nutrimento delle piante, ma riesce ella inutile, senza l'accompagnamento di alcun Sale, che la disciolga, e metta in istato di essere stemperata nell'acqua, & indi succiata dalle radici, e portata alla pianta.

Osservammo nell'analisi delle nostre due piante, che l' Crescione, benchè irrigato dal Salnitro, qual è un sale, che contiene molto acido, non si è rimasto di produrre tutti i suo' principj molto alcalini, senza dare alcun segno di acido ugualmente, che se si fusse e' piantato in un terreno mescolato con stabbio; e che il fangocchio seminato nel terreno scipido, come l'altro nel nitroso, an dato molto acido in tutti i suo' principj, anche nel sal fisso, che era salino, cioè imbevuto d'una parte dell'acido di sua pianta.

Vediamo da detta osservazione, che un sale, qual contenga molto acido succiata da una pianta di natura alcalina, non produca alcun acido in detta pianta; e che una pianta di natura acida, allevandosi in un terreno scipido, quanto si possa far mai, non rimane a dar di se molto acido nell' analisi.

Donde possiam conchiudere, che la maggior parte de' sali contenuti nelle piante, vi si formino tali quali vi sono; e che i sali, che si ritrovino nel terreno, mutino la lor figura nelle piante, secondo gli organi, e secondo i fermenti naturali, che incontrano.

S P I E G A M E N T O

DI ALCUNI SINGOLARI EFFETTI,

*Che avvengono ne' vetri piani , come sono i Cristalli
de' Specchi .*

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

R Iguardando uno oggetto per traverso di un vetro piano pulito in tutte due bande, come un cristallo di specchio, non si avvisa, che e' si moltiplichi più volte; ma se ciò si faccia nell' oscuro, e che l' oggetto sia luminoso, come una candela, può vederli, per lo meno, quattro volte moltiplicato; e tale oggetto si vedrà altrettanto più distintamente, quanto che'l vetro sarà più obliquo alla linea, che va dall' occhio all' oggetto. Una tal ripetizione scorgerassi ora da un lato, & or dall' altro del corpo luminoso, e tali apparenze diminuir di vivacità a poco a poco, a misura, che si allontanano, divenendo in fine così deboli, che non si possano raffigurare. Vi è però una tal positura obliqua del cristallo, nella quale la candela non si vegga raddoppiata, e vi sono ancora vetri, ne' quali non si fanno tali moltiplicazioni, benché li sia ella molto inchinata.

Io osservo, che tale apparenza sensibil facciassi, allora, che 'l vetro, benché piano, non è da per tutto di ugual grossezza: E poicché i cristalli de' specchi, quasi che tutti anno la loro superficie ad onda, dalla maniera forse, che si tiene nel pulirli

(poic-

Il 16, Maggio 1699.

(poicche allora per ordinario sono ben piallati , e ben addolciti , quando sono adattati , e fregati l' un contro l'altro) , avviene quindi , che si veggia l'oggetto moltiplicato in alcune polizioni del cristallo, or da una parte, & or dall' altra; & in alcune altre polizioni non si scorga moltiplicazione , almen sensibile .

Frattanto io dico , che la moltiplicazione più distinta dell'oggetto luminoso , facciasi nella linea, qual è la sezione , ovvero incontro d' un piano, passando per l' occhio , e per l' oggetto , e perpendicolare a tutte due insieme le superficie del vetro; e che questa moltiplicazione si faccia dalle differenti riflessioni della luce dentro del vetro , e dalle refrazioni , mentre entra , & esce: Come dimostrerò .

Primjeramente egli è facile a conoscersi , che i raggi luminosi non possono fare molte volte , e rivolte , tanto dentro , quanto fuori del vetro , se non se nelle superficie piane , perpendicolari a ciascheduna superficie del vetro , penetrato da essi ; poicche tutti questi andirivieni tanto nella riflessione , quanto nella refrazione , sono sempre in un piano , che passa per la perpendicolare alla superficie , qual fa la riflessione , o la refrazione; e poicche egli ha due superficie , due parimente saranno le perpendicolari ; e se queste sono in un istesso piano , tutti i raggi , tanto refratti , che riflessi , saranno in un istesso piano , e formeranno angoli più ottusi gli uni cogli altri di quello che farebbero , se fossero sopra differenti piani , e gli uni agli altri inclinati: Locche deve intendersi unicamente per que' raggi , che venendo dall' oggetto , possano incontrar l' occhio .

Dico perciò , che se il vetro fusse di ugal
gros.

grosſezza , o la ſezion delle di lui ſuperficie terminaffe in due linee paralelle ſopra un piano perpendicolare al vetro , che paſſa per l'occhio , e per l'oggetto luminoso ; tal oggetto non potrebbe vederſi multiplicato ſenſibilmente , purchè fuſſe notabilmente diſcoſtato dal vetro .

* Sia la ſezion del vetro *EMBD* , di cui le due linee *EM* , *BD* ſiano paralelle , il punto luminoso ſia *C* , e l'occhio *O*. Egli è chiaro , che tutti i raggi , come *CA* , che vengono dall' oggetto *C* , incontrando la ſuperficie del vetro *EM* , ſi rompano , e diſtorcano in *AB* , avvicinandoli alla perpendicolare dentro del vetro , ſecondo le regole della refrazione , & eſcano indi in *BO* ; ſicche l'angolo d'incidenza *CAE* ſia uguale a quello , che nell' uſcir forma *DBO* , poicche l'angolo rotto *EAB* è uguale a *DBA* per le ſuperficie paralelle . Stando dunque l'occhio in *O* , vedrà il punto luminoso *C* per mezzo del raggio *OB* paralello a *CA* . Se le ſuperficie non ſono paralelle , ma la ſezione *EM* , *GD* formi due linee paralelle : farà preſſo a poco l'ifteſſa coſa , poicche tutta la differenza farà ne' raggi reſſi , quali non faranno ſù di una iſteſſa ſuperficie , locche non nuoce a queſta dimoſtrazione .

Ma per l' iſteſſa cagione , ſe un altro raggio *CF* , qual può conſiderarſi come paralello a *CA* , quando il punto *C* ſia in una conſiderabil diſtanza dal vetro , beriche lo ſpazio *EF* ſia molto grande , cada ſopra la parte *AE* nella ſuperficie *EM* del vetro ; avrà il ſuo raggio refratto *FG* dentro del vetro , quale farà ancora paralello ad *AB* , e qualche uſcirà *GH* , eſſendo ancora paralello a *BO* , non potrà entrare nell' occhio *O* , ſe non ſia per lo men-

vi.

• *Tav. I. Fig. 7.*

vicinissimo a BO, che quì non si suppone. Lo stesso avverrebbe d' un altro raggio, che rincontrasse la superficie del vetro dall' altro lato, da A verso M. Ma se una parte del raggio FG si rifletta in I, secondo le leggi della Catottrica, & un' altra parte ancora di quello istesso raggio GI si rifletta in K, qual sarà parallelo ancora ad AB per le superficie parallele EM, BD, esca dal vetro in K rotto in KL; è chiaro, che tal raggio, o incontrerà l'occhio in O, o no'l rincontrerà; se l' incontrerà non formerà immagine differente da quella del raggio BO, entrando nella pupilla con la stessa direzione di BO; quindi è, che 'n tal caso l' oggetto non si vedrà moltiplicato.

Ma se noi supponiamo, che CF faccia l' angolo CFE molto più acuto dell' angolo CAE; potrà avvenire, che 'l raggio KL, quale farà parimente l'angolo DKL uguale a CFE, incontri l'occhio in O sotto un'altra direzione di BO, donde formerassi una immagine del punto luminoso, differente da quella formata dal raggio BO.

Questa seconda immagine però fatta da KL sarà molto debole, perche gran parte de' raggi in uscendo dal vetro in G, & in I si farà disperda.

Bisogna avvertire, che se 'l vetro non sarà molto grosso, o che l' oggetto ne sia molto discostato, il raggio KL sarà assai vicino a BO, & in conseguenza l'immagine formata da KL, più facilmente si confonderà, quanto è più debole, con quella fatta da BO, donde l' oggetto non apparirà moltiplicato.

Non è necessario dimostrare, che 'l raggio, quale venendo dal punto C, cada sù la parte AM della superficie del vetro, e faccia un angolo più ottuso di CAM, che non possa mai rincontrar l'

occhio dopo una o più riflessioni; poichè di più in più si scosterebbe sempre da BO.

* Frattanto se il vetro dato, sia d'inequal grossezza, e verso l'oggetto C più grosso, che verso l'occhio O. 1. Il raggio CABO, qual verrà all'occhio dopo due refrazioni, vi giugnerà per la linea BO, qual prolungata incontrerà il raggio incidente CA, poichè il raggio AB rotto dentro del vetro, essendo più perpendicolare sopra BD, che sopra AM, il raggio ancora OB farà con AB un angolo più ottuso di qualche CA fa con l'istessa AB; Onde è, che prolungata OB, incontrerà CA verso l'oggetto C: E se la grandezza del vetro non impedisca i raggi immediati dell'oggetto C verso l'occhio; si vedrà detto C semplicemente fuori del vetro, & a' fianchi l'oggetto per traverso del vetro per mezzo del raggio OB.

2. Vi faranno altri raggi, come CR, quali venendo dall'oggetto C, dopo una refrazione RN, e due riflessioni NM, MP, & una refrazione PO, potran venire all'occhio O: Perciocchè supponendo CR, come parallela a CA, RN sarà pur parallela ad AB; ma la superficie BD, potendo incontrare la superficie AM in D, il raggio NM farà più perpendicolare alla superficie AM, che 'l raggio NR, (locchè non merita dimostrazione) e'l raggio MP, facendo l'angolo PMD uguale all'angolo NMA, l'angolo MPD farà meno ottuso dell'angolo RND, ovvero ABD; donde è, che 'l raggio rotto PO facendo l'angolo DPO più grande dell'angolo DBO, potrà incontrare BO nel punto O, dove è l'occhio.

Ritroveransi parimente altri raggi incidenti, come CR, che rincontrino la superficie AD più in là

* Tav. 1. Fig. 8.

là di R verso D , quali dopo due refrazioni, così in entrando, che in uscendo, e 4. , o 6. , ovvero 8. riflessioni dentro del vetro , potrebbe cadere nell' istesso punto O ; donde vedrassi l' oggetto tante volte multiplicato , quanto saran differenti i raggi , che verranno all' occhio , quali nell' istessa maniera verranno , come se l' oggetto luminoso fusse posto ne' raggi OP prolungati in una distanza dal punto O uguale alla somma di tutti i raggi OP , PM , MN , NR , RC ; Perciocchè entreranno nell'occhio con la stessa direzione , come se venissero in fatti da un punto in tal distanza posto.

Da quel che io dimostro, si conosce, che l' ultime immagini dell' oggetto , quali son quelle , che vengono all' occhio dopo di un maggior numero di riflessioni, & in conseguenza dopo di un più gran cammino , si vedranno più picciole di quelle , che son più vicine alla prima di OB ; perciocchè venendo come più da lontano , entrano i raggi nell' occhio più paralleli tra di loro, donde l' oggetto pare, e si giudica più lontano, contribuendo molto la debolezza dell' immagine degli oggetti più discosti da OB a farli veder più piccioli.

E' facile a conoscere, che i raggi, quali vengono all' occhio dopo di un maggior numero di riflessioni dentro del vetro, debbono comparire molto più deboli di quelli, che vi giungono dopo di un minor numero ; perciocchè in ciascun incontro , che fa il raggio con una delle superficie interiori , gran parte di esso scappa dal vetro ; e poichè son pochissimi que' , che riflettono , perciò gli ultimi ad uscire , che son picciola parte di que' , che son riflessi , devono essere debolissimi : Per qual ragione avviene , che se un corpo non fusse luminoso

noso , nè stasse all' oscuro , non si osservarebbe moltiplicazione alcuna .

Bisogna frattanto dimostrare , perche si avvifi una più gran distanza tra ciaschedun objecto moltiplicato , quando il vetro è più obliquo al raggio , che vada dall' objecto all' occhio , che allora quando l' è meno obliquo .

Sia il raggio CABO , che incontri l' occhio in O , dopo due refrazioni nell' entrare , e nell' uscir dal vetro , & un' altro raggio CROMPO , che pur cada all' occhio in O , dopo due refrazioni e due riflessioni nel vetro : Sia parimente un altro raggio , K α , di un altro punto luminoso K più inchinato al vetro di qualche non è CA , qual passi per K α B α , & un altro K α N μ α , quale venendo parimente da K dopo due refrazioni , e due riflessioni , incontri B α in α , dove sarebbe l' occhio ; io dico , che l' angolo B α α , è più grande dell' angolo BOP , e per conseguenza le due immagini , che da raggi OB , OP si fanno all' occhio , e le loro ordinate sembreranno meno dilungate , o divise l' una dall' altra di quelle , che si formeranno da' raggi α B , α α .

Il raggio α B nel vetro fa con AB l' angolo α BA più piccolo dell' angolo α BO fatto dalli stessi raggi rotti , in uscendo dal vetro , siccome per la Diottrica ; poicche i raggi , come BO , che sono i rotti degli incidenti AB , si avvicinano molto più velocemente alla superficie del vetro BD ; che gli incidenti nel vetro non fanno alla stessa superficie HB ; essendo però la linea , N parallela ad α B , perciocche supponiamo i raggi K α , K , ancor come paralleli ; deducesi quindi , che l' angolo , NR sarà uguale all' angolo MN μ , & in conseguenza la differenza degli angoli DMP , D μ α sarà ancora uguale all' angolo α BA .

Ma

Ma i raggi MP , $\mu\pi$ essendo più perpendicolari alla superficie BD , di quel che non è AB , & αB ; li raggi rotti PO , e $\pi\omega$ faranno tra di loro un angolo minore dell'angolo $OB\omega$: E se si tiri πl parallela a PO , l'angolo $l\pi\omega$ sarà uguale al compreso da raggi PO , & $\pi\omega$, il quale sarà più piccolo dell'angolo $OB\omega$; locche è chiaro per la ragion detta inanzi.

Frattanto essendo nel triangolo gli angoli esterni uguali a due interni, & opposti, l'angolo $D\pi\omega$ — l'angolo $DB\omega$ sarà uguale all'angolo $\pi\omega B$, e l'angolo DPO — l'angolo DBO sarà uguale all'angolo POB : Ma la differenza tra l'angolo $D\pi\omega$, & DPO , ovvero $D\pi l$ uguale è l'angolo $l\pi\omega$, dimostrato quì sopra minore dell'angolo $OB\omega$; quindi è, che se dall'angolo $D\pi\omega$ se ne tolga l'angolo $DB\omega$, e se dallo stesso angolo $D\pi\omega$ + l'angolo con l si tolga l'angolo $DB\omega$, e l'angolo ωBO più grande di ωl , come si è dimostrato; ne viene, che 'l primo avanzo è più grande del secondo, poicche dal secondo più se ne toglie, di quel che s'aggiugne; ma il primo rimanente è uguale all'angolo $\pi\omega B$, & il secondo uguale a POB ; dunque l'angolo $\pi\omega B$ è più grande dell'angolo POB , che dovea dimostrarli.

L'istesso può dirsi di tutti gli altri angoli fatti come, $\pi\omega B$, da raggi incidenti, che caderanno verso D .

L'esperienza conferma qualche io ho dimostrato delle immagini, che si vedono per mezzo de' raggi OB , OP , OQ &c., le quali son formate dagl' incidenti CA , CR , CS , e da quelli, che sono dell'istessa ordinanza, e che venendo dall'istesso punto dell'oggetto luminoso, possano entrare nella pupilla: Perciocche se si applichi una carta sopra la superficie del veiro AD , e si faccia avanzare da D verso A ; allorache la carta coprirà il luogo S del
rag.

raggio incidente CS, si vedrà sparire l'immagine luminosa in Q; indi quando sarà giunta in R, il lume in P di-parirà ancora, e così di mano in mano. E si avverta, che non bisogna aver riguardo all'immagine della carta, qual si vede raddoppiata per cagion della refrazione; locche non si offer-va fuori dell'oscurità; ma questo è un caso particolare, che spianerò appresso.

Le distanze fra le immagini B, P, Q sembrano quasi che tra loro uguali, poicche queste immagini sono fatte da raggi riflessi, che per ordine si forpassano di due riflessioni, e li raggi incidenti CA, CR, CS, che le formano, sono vicinissimi gli uni agli altri: Ma questa apparenza allora avviene, quando le superficie del vetro, sono presso, che plane, poicche se l'una, o tutte due son curve, le distanze tra le immagini appariranno molto ineguali; locche è facile a dividersi dalla disposizione de' raggi, che possono venire all'occhio.

Ho già dimostrato, che le immagini appajono più deboli a proporzione, che sono esse più dilungate da quelle, che son più prossime all'oggetto luminoso per la quantità de' raggi, che scappano fuori del vetro, & ho detto ancora, che si veggono più picciole, perche giungono all'occhio, come se fossero più distanti: Dimostro ora; che appajono più larghe a proporzione, che sono più discostate dall'oggetto luminoso (intendo delle immagini moltiplicate nel piano, il quale passando per l'oggetto, e per l'occhio, è perpendicolare alle due superficie del vetro.)

Spiegherò questo Fenomeno come il precedente; I raggi, che dopo due sole refrazioni vengono

Memor.

H

all'

* Tav. 3. Fig. 10.

all'occhio O da due punti C, K, che sono a'lati del corpo luminoso, sono più inclinati alla superficie del vetro rivolta verso l'occhio, di que', che vi vengono dopo due refrazioni, e due riflessioni dentro del vetro: Locche si vede dalla figura, e da qualche poc'anzi si è dimostrato: Ma poiche i raggi più inchinati alla superficie BD formano angoli ben più acuti a proporzione, come più si accostano alla superficie del vetro, di qualche non sono que' d'inclinazione; perciocche le refrazioni sieguono la proporzione de' seni degli angoli d'inclinazione; ne viene, che i raggi OB, O β faranno un angolo BO β molto più aguto a proporzione di qualche facciano i raggi OP, O γ , quali comprendono l'angolo PO γ ; Perciocche il raggio O β deve essere più inclinato riguardo al suo raggio incidente, che il raggio O γ rispetto al suo; così l'angolo BO β farà più aguto a proporzion della lunghezza del raggio, che va fino all'oggetto per lo punto B, e per le sue frazioni dentro del vetro, che l'angolo PO γ a proporzione della lunghezza del raggio, che va all'oggetto per OP, e per tutte le sue frazioni. Dunque l'immagine rappresentata all'occhio dall'angolo PO γ apparirà più larga a proporzion di sua altezza, di quella, che formerassi dall'angolo BO β .

Giacche l'altezza di questa, che io ho supposto essere una candela, deve stremarsi solamente nella proporzione de' cammini, che' raggi fanno, tanto dentro, quanto fuori del vetro, per giungere all'occhio: poiche la sezione del vetro, qual determina la maggior inclinazione delle sue superficie, vien supposta orizzontale.

Si deve avvertire, che tutto ciò che io dico de' raggi vengenti da punti di un oggetto, come C, K, io intenda de' raggi principali; quantunque bisogn

gni sempre concepire un'ordinanza de' raggi, che vengono da questo istesso punto intieri all'occhio, per entrare nella pupilla, quali formano come un cono, ovvero pennello, come alcuni chiamano, quali si uniscono nella retina, per dipignere l'oggetto: Dimostrandosi nella Diottica, che 'l punto, in cui si uniscono dopo la loro refrazione nell'occhio, sempre sia sopra uno di questi raggi, che io chiamo principali.

* Per quel che si attiene alla carta, che nasconde le immagini moltiplicate a misura, che ella si avvanza, come ho detto quì sopra, egli è certo, che non si potrebbe vedere l'orlo suo MN moltiplicato, se il corpo luminoso no'l facesse apparire, come può vederfi in questa figura; perciocche se la carta MN comincia a nascondere i raggi incidenti VT, che fan vedere la larghezza della immagine D della candela, l'orlo della carta, che apparirà in OP, nasconderà parimente una parte di questa immagine, come la figura rappresenta; ma le l'istesso orlo della carta MN occupi la maggior parte de' raggi SR, che rappresentano l'immagine Q; egli è chiaro, che si vedrà una picciola parte di questa immagine, come in Q, dove si scorderà quella dell'orlo della carta, che l'asconde, la quale non si potrebbe vedere senza del lume, che appare in Q.

Mi rimane a dimostrare, come si faccia la moltiplicazione dell' oggetto, allorché l'angolo della sezione del vetro è rivolto verso l'oggetto luminoso; ma oltre a quello, che si è sopra detto, la figura sola può dimostrare qualche deve avvenire.

† Sia dunque la sezione del vetro EDB, in cui

H 2

il

* Tav. 2. Fig. 1.

† Tav. 2. Fig. 12.

il concorso delle superficie in D sia rivolto verso l'oggetto C, e l'occhio sia posto nella parte opposta verso O. Sia primieramente il raggio incidente CA, quale rotto nel vetro AB nel suo entrare, e rifratto in BO nell'uscire, venga all'occhio O; dico, che quando il vetro fusse tagliato in B, e che la parte BD ne fusse tolta, non potrebbe vedersi perciò l'oggetto C.

Perciocchè il raggio AB entro del vetro, essendo più inclinato su la superficie DB, che sopra DAE, l'angolo ABO sarà meno ottuso dell'angolo BAC; donde è, che 'l raggio CA concorrerà col raggio OB verso O, ed in conseguenza non potrà ivi essere raggio diretto, che venga dall'oggetto C all'occhio O.

E' chiaro ancora, che tutti i raggi vengenti dall'oggetto luminoso C, che rincontrano la superficie del Vetro verso E, non potran giammai giugnere all'occhio, che si suppone sito nel raggio BO, dopo due, o più riflessioni nel vetro; poichè saranno eglino sempre più, e più inclinati alla superficie DB, & in conseguenza usciranno dal vetro discostandosi dal raggio BO: Dunque i soli raggi, che caderanno sopra AD verso il concorso delle superficie del vetro potran fare la moltiplicazion dell'oggetto.

Sia indi il raggio incidente CR, quale venendo dall'oggetto luminoso C, come parallelo a CA incontri la superficie DA in R; Dunque il raggio rotto RN sarà ancora come parallelo al raggio rotto AB; ma il raggio riflesso NM sarà più inclinato alla superficie DA, che NR, e contrapposto alla quantità dell'angolo D delle due superficie del vetro, come io ho dimostrato nel primo caso; Onde è, che 'l raggio riflesso MP farà l'angolo EMP più

più acuto dell'angolo ERN, o del suo eguale EAB. Dunque il raggio MP uscendo dal vetro per PO, farà l'angolo XPO più aguto di XBO, & in conseguenza PO potrà incontrare BO nel punto O, ove è l'occhio nel raggio BO.

L'istesso avverrà negli altri raggi, che venendo così dall'oggetto, potranno incontrare l'occhio dopo due, 4., o 6. riflessioni dentro del vetro; che non merita più lunga spiega.

Se si faccia parimente avanzare una carta sulla superficie del vetro dalla parte E verso A, si vedrà, che la più forte immagine formata dal raggio CA, sparirà la prima, e le altre appresso, come l'orlo della carta si avanzerà verso D, e si vedrà parimente, come nel caso precedente moltiplicata l'immagine della carta: Perciocchè nell'istessa figura, se l'orlo di questa MN copra la maggior parte dello spazio SR, che comprende i raggi, quali formano l'immagine Q, così la immagine XY del bordo della Carta, nasconderà la maggior parte dell'immagine Q del corpo luminoso: E se l'istesso orlo MN nell'istessa posizione occupi una parte di VT. per dove entrano i raggi, che fan l'immagine D si vedrà pur l'orlo della Carta rappresentata in OP, che occuperà una parte dell'immagine D, cosa facile ad intendersi.

Intorno alla grandezza delle immagini moltiplicate in questo secondo caso, io non id parola, perchè può dedursi dal già detto prima.

Dal questa moltiplicazione d'oggetti possono conoscersi le differenti grossezze de' pezzi de' cristalli da specchio, di cui si servono per lavorare le obbiettive de' Cannocchiali, & in maniera più sicura, e più giusta di qualunque misura, che possa mai farsi.

Per rendere però più compiuto questo spiegamento, bisogna disaminare ancora come si faccia la moltiplicazion dell'obietto, quando questi è nel medesimo lato dell'occhio, riguardo alla stessa superficie del vetro.

Non vi è chi non sappia, che qualor si riguardi una candela posta vicino ad uno specchio, stando l'occhio così dapresso a detto cristallo, si vegga l'immagine della candela più volte moltiplicata. La ragione è facile a conoscersi; perciocche la superficie anteriore del cristallo riflette la prima immagine, e l'altra la seconda, dopo due refrazioni de' raggi nell'entrare, e nell'uscir dal cristallo, & una riflessione sù lo stagno. Il più difficile a ravvisarsi è la ragione, perche appajano più di due immagini. Son sicuro, che questa esperienza, e lo spiegamento di essa, servono di pruova a quel che poc' anzi ho detto intorno a raggi luminosi, che riflettonsi al di dentro del vetro, rincontrando le superficie di questo, tuttoche esse non siano stagnate. Egli è facile a comprendere, che se 'l cristallo sia stagnato, tutti i raggi, che entreranno in esso, non potranno uscirne; e che tutti si debban riflettere, & in conseguenza, che l'immagine, qual si formerà da questa riflessione dopo due refrazioni, sarà molto più viva di quella, che si fa dalla sola riflessione nella superficie anteriore; perciocche in questa la maggior parte de' raggi, avendo penetrato il vetro in dentro, non possono in uscendo incontrare la pupilla dell'occhio, se i soli riflessi l'an rincontrata, tanto più, se 'l cristallo sia un pò grosso. Ma poicche avvien lo stesso in un cristallo, che non è stagnato, che in quello, che lo è; & essendovi alcune osservazioni particolari, che si posson fare sù di quello, che è stagnato; io spiegherò solamente què

si ec.

ciocchè avviene di un cristallo, qual non sia stagnato.

Poicche le varie immagini di un'istesso oggetto devon formarli da' raggi, che anno svariate inclinazioni all'occhio; bisogna necessariamente, che detti raggi vengano da differenti luoghi della superficie del cristallo: locche non può avvenire, se i primi raggi incidenti di un'istesso punto non siano diversi fra di loro (supponiamo quì, che le superficie del cristallo sian piano, e parallele); e dette differenti inclinazioni de' raggi non possano incontrare la pupilla, quale è quasi un punto, che dopo molte riflessioni dentro del vetro. Ma se questi raggi, che quindi escono sian quasi paralleli tra di loro, come avviene quando l'oggetto è molto dilungato dall'occhio, e'l cristallo di ugual grossezza, o pur quando sono sù di un medesimo piano, quali essendo ugualmente inclinati nell'una parte, e nell'altra dalla superficie del cristallo, e passando per l'occhio, e per l'oggetto, fan sezioni parallele fra di loro; egli è chiaro, come ho già dimostrato, che i raggi di uno stesso punto, avendo sofferte molte riflessioni dentro del vetro, non potranno incontrar l'occhio; dunque in questo caso apparirà una sola immagine formata da questa sorta d'immagini. Ma se nell'istesso caso di superficie parallele, l'oggetto si avvicini all'occhio, & al vetro; potran cadere sù la superficie di questo raggi da un'istesso punto dell'oggetto diversamente inchinati da formar molte immagini, come l'esperienza dimostra.

Se sia il vetro d'inequal grossezza, e le linee rette, che si formano dalla sezione di esso, per mezzo di un piano perpendicolare alle di lui superficie, qual passa per l'occhio, e per l'oggetto, con-

corrano o per un lato, o per l'altro; si vedran sempre molte immagini dell'oggetto, purché e' sia luminoso, e' l tempo di notte; poicché in qualunque distanza dall'occhio, che si allogherà l'oggetto, molti raggi si avranno, quali, come paralleli tra di loro venendo da un'istesso punto dell'oggetto, dopo molte riflessioni dentro del vetro, usciranno quindi con differenti inclinazioni formantino svariate immagini: (cosa, che non ricerca molta spiegazione dal finora detto): Queste immagini ora da un lato, & ora da un'altro si ritroveranno rispetto a quella, che da una sola riflessione si fa, secondo che l'angolo d'inclinazione del vetro sarà, o verso l'occhio, o verso l'oggetto.

Potrà per questo mezzo ancora conoscerli con somma giustezza, se i cristalli da due bande puliti siano di una istessa grossezza, ancorché questi fossero picciolissimi, difficile per altro ad avvisarsi per mezzo de' migliori compassi fabricati perciò: Poicché se si riguardi su la superficie di un cristallo l'immagine di una linea chiara nell'oscuro, ovvero di un tratto nero nel giorno, e che sia in una molta distanza, e l'occhio come l'oggetto nell'istessa parte della superficie; & inoltre, se in girando in differenti maniere il pezzetto del cristallo, si divisi sempre tale immagine semplice in una sola positura; può assicurarsi, che'l pezzetto del cristallo sia di uguale grossezza, secondo la disposizione della linea chiara, ovvero oscura; e che egli sia d'inequal grossezza, se avvenga il contrario, in cui l'angolo più grande sarà nella sezione, che taglierà perpendicolarmente l'immagine di tal linea. Si vedrà perciò doppia in tutte altre positure del cristallo, da quella ove l'immagine della linea è semplice, & appariranno più dilungate l'una dall'altra;

quon-

quando ad angoli retti segheranno la positura, dove si vedeva semplice.

Si osserverà ancora una delle due immagini del tratto apparir più viva dell'altra: e quella appunto è formata dalla riflessione, perche ha maggiori raggi, che vengono all'occhio.

Non sarà dunque difficile in tal modo riconoscere la parte del vetro più grossa; perciocche se l'immagine più debole si vedrà verso l'oggetto, dico, che la parte del cristallo, che riguarda l'oggetto sia la più stretta; ma se la più debole immagine sia verso l'occhio, questa sarà la parte men grossa del cristallo.

Così se l'oggetto è B, e l'occhio O, e che un raggio luminoso BD incontrando la superficie del vetro HE in D, rifletta verso l'occhio in O, è chiaro, che se un'altro raggio incidente, qual pur venga dal punto B, e come parallelo a BD, incontrando la superficie del vetro in F, sia da una parte, o dall'altra di D penetrando insino a K, riscontri l'altra superficie KI, quale concorra verso la prima in M a lato dell'oggetto: La maggior parte di questo raggio rotto FK uscirà fuor del vetro, e picciola parte solamente riflettendo in L, riverrà verso la superficie HE in H, ove rompendosi in HL, giammai potrà rincontrar l'occhio O; perciocche essendo il raggio KH più inchinato alla superficie HE del raggio KF, sarà parimente il raggio HL più inchinato alla stessa superficie dell'incidente FB; & in conseguenza questo raggio HL, che si discosta più, e più dal raggio DO, non potrà mai giugnere al punto O, se il punto H sia più dilungato dalla sommità dell'angolo M, che'l punto D.

* Non avverrà lo stesso di un'altro raggio, co-

me

Tav. 2. Fig. 12.

me BE, il quale dopo di una refrazione in E, una riflessione in I, & una seconda refrazione in G esce dal punto G tra D, & M; poicche questo raggio rotto in G, potrà rincontrar l'occhio in O, per l'inclinazione HGO sempre più grande di BEM, ovvero BDM, o pure ODH, come si è dimostrato: Quindi è che l'immagine più debole formata dal raggio OG, quale ha sofferto due refrazioni, & una riflessione, si vedrà in G verso la parte M di minor grossezza del cristallo.

La dimostrazione sarà l'istessa, se la parte più sottile del cristallo sia rivolta verso l'occhio.

PER IMPEDIRE,
CHE L'UMIDO DELI'AERE NELLA NOTTE

*Non si attacchi a Cristalli obiettivi de'
Cannocchiali.*

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

Bllogna prendere due, o tre gran foglia di carta grossa griggia da straccio ben'asciutta, e formarne un doccio di un piede, o di un piede, e mezzo, quale si appicchi all'orlo del Cannocchiale ver l'obiettivo: Questo doccio di carta arresta tutti i vapori, che potrebbero attaccarsi al vetro; e così può conservarsi lungo tempo, senza che l'umido l'appanni.



• 27. Maggio 1699.

BA

RAGION GENERALE

DELLE FORZE, CHE BISOGNA IMPIEGARE
NELL'USO DELLA VITE.

DEL SIG. VARIGNON.

LA difamina, che si fa ordinariamente della Vite, è fondata su di tre supposizioni: La prima, che la direzione della potenza, che se l'applica, sia in un piano perpendicolare al suo Asse; la seconda, che tal direzione sia ancora perpendicolare alla retta tirata in tal piano dal punto dell'applicazione di questa potenza per l'asse della Vite; & in fine la terza, che la direzione del carico della Vite, o dello Strettojo, cioè di quello, che opera contro la potenza, sia parallelo a detto Asse.

Avendo però dopo qualche anno osservato nella Campagna in tempo delle vendemmie, che de' molti Uomini adattati alle lieve, quali servono a far girar la vite di ciascheduna soppressa, non v'era pur uno, che sua direzione avesse nel piano perpendicolare all'asse di detta vite, anzi nomen perpendicolare alla sua lieve; appoggiandosi quasi che tutti su di questa, e contro tutto ciò, che potevano incontrare, con isforzi diretti per tutti versi, secondo linee differentemente inchinate all'Orizzonte, & a queste lieve: Una tal contrarietà alle due prime delle tre supposizioni già dette, mi fe ripensare alla terza, e vedendo, che ella ancora possa in mille differenti maniere variare, come quando la

vite

20. Maggio 1692.

Vite è all'Orizzonte obliqua, & il suo carico, o quello del suo strettojo è un semplice peso &c.; mi deliberai in fine di ricercar tutto in generale, cioè per tutte le immaginabili direzioni, tanto del carico della vite, o di suo strettojo, quanto della potenza, che li adatta: Et eccone il ritrovato.

P R O B L E M A.

Ritrovare in generale la ragione dell'incàrico della Vite, o del suo Strettojo, e della potenza applicati in tutte le direzioni immaginabili dell'uno, e dell'altra.

• Soluz. Sia la Vite $VXZY$ col suo strettojo QM , e suo Cordone AB , che sostiene lo strettojo, ovvero il peso; il quale premendo ugualmente da per tutto con una istessa forza, e direzione sopra di questo Cordone AB , e sopra il suo punto P può considerarsi, come fusse tutto intiero in P ; Quindi è, che per brevità lo dirò sempre in appresso P . Se lo Strettojo QM sia fisso, rappresenterà ancora P il peso della Vite sostenuto su 'l Cordone, o vano FO dello Strettojo. Sia parimente la potenza R applicata a piacere in M a detto Strettojo, se la vite sia fissa; ovvero ad una lieva PM , se sarà lo Strettojo; o che la direzione RMG di questa potenza sia, o non sia nel piano dello Strettojo QM ; ovvero (più generalmente) in un piano perpendicolare all' asse della vite; o che parimente ella sia perpendicolare, o no alla retta MP tirata nel piano, fino a rincontrare l'asse in D ; o che in fine la direzione PN del peso P dello Strettojo, o della Vite, sia, o non sia parallela all' asse &c. Qualunque siano, io dico, tut-

• Tav. 3. Fig. 1.

124 . . . 31 . . . 06

tutte queste direzioni tanto del carico P della vite, o dello Strettojo, quanto della potenza R applicata; immaginiamo l'E perpendicolare su 'l cordone AB, et in un istesso piano con la di lui tangente in P, e PN direzione del suo carico P. Da questo punto P per G, ove RM prolungata incontra il piano El-N prolungato, sia tirata PG indefinita verso K, su la quale avendo preso il punto F a discrezione, sia fatto il parallelogrammo EF intorno alla diagonale PN. Immaginiamo parimente nel piano delle linee GK GR, una retta GH, che incontri l'asse della vite in alcun punto (qual deve essere ancora in D, perciocchè la retta MPD pur ella è nello stesso piano) & il parallelogrammo KL intorno della diagonale GH a discrezion presa. Siano in fine DS, & DT perpendicolari sopra RG, & PK.

Posto ciò egli è chiaro, che lo sforzo del carico P della vite, o di suo strettojo, secondo PN, potendo esser riguardato, come composto di due altri, secondo PE, & PF, alli quali sia egli come è la Diagonale PN del parallelogrammo PE, a questi due istessi lati PE, & PF; il Cordone AB, che ne sostiene tutta l'impressione, secondo PE, a cui è perpendicolare (*ipotes.*) non lascerà di vantaggio a questo incarico P, che lo sforzo secondo PK, al quale ella è, come PN a PF.

Dunque la potenza R, che si suppone in equilibrio coll' incarico P della vite, o del suo Strettojo, non dovrà sostenerne altro, che lo sforzo, secondo PK, cioè, che con questo solo sforzo; (ch'io chiamo K), deve ella bilicarsi, essendo l'altro sforzo, secondo PE interamente sostenuto, & estinto dalla resistenza del Cordone AB, qual se li suppone perpendicolare. L' impression dunque composta, che deve risultare nel punto G dal concorso dell'
 axion

azione dello sforzo K, e della potenza R, dovendo esser ritenuti da qualche punto fisso D dell'Asse $\beta\alpha$, deve farli secondo una retta, che non solamente sia nel piano KGR; ma ancora passando per G, che vada a rincontrare l'asse $\beta\alpha$ in alcun punto D, cioè (*Costruz.*) secondo la Diagonale GH del parallelogrammo KL: Donde si vede parimente, che lo sforzo K deve essere alla potenza R:: LG. GL:: HL. GL (*f*, significa qui *seno*):: $\sqrt{HGL}.$ $\sqrt{GHL}$:: $\sqrt{DGL}.$ $\sqrt{DGP}$:: DS. DT, cioè K. R:: DS. DT.

Ripigliamo: Quì sopra si è ritrovata P. K:: PN. PF, e presentemente abbiamo K. R:: DS. DT; Dunque moltiplicando con ordine P. R:: PN $\times$ DS. PF $\times$ DT. Cioè in generale, che 'l carico della vite, o del suo strettojo è sempre alla potenza R, che la tiene in bilico:: PN $\times$ DS. PF $\times$ DT qualunque siano le direzioni di tal incarico, e di tal potenza: Locche &c.

COROL. I. Se si supponga presentemente, che la direzione RM della potenza R sia nel piano dello Strettojo, cioè in un piano perpendicolare all'asse della vite, si vedrà in tal caso, che il punto G di questa direzione continuata, ancor debba ivi ritrovarsi, così il punto P, che vi stà per ipotesi, tutta la retta PGK, & in conseguenza il lato PF del parallelogrammo FE ancora.

Dunque se si supponga, che la direzione PN dell'incarico della vite, o del suo strettojo sia parallela al suo asse $\beta\alpha$; allora si avrà l'angolo FPN retto nel piano FPE, che toccherà la vite in PN, e suo cordone AB col circolo $\Delta P\mu$ in P, parimente l'angolo C è nel triangolo sviluppato ACB, la di cui altezza è un mezzo passo della vite, e la base BC la semicirconferenza raddrizzata della base di questa vite, o di un circolo fatto sopra di essa, con una

sezione perpendicolare al suo asse; Riguardando inoltre così questo triangolo rettilineo ACB, come toccante la vite in PN col parallelogrammo FE, cioè in un'istesso piano con tal parallelogrammo, di cui PE si suppone lato, ed in conseguenza FN ancora, perpendicolare all'ipotenusa AB di tal triangolo; si ritroveranno ancora gli angoli $NFP = BPN = BAC$. Dunque allora i triangoli NPF, & BCA faranno simili, e $PN : PF :: BC : AC$, & in conseguenza sostituendo BC in luogo di PN, & AC in luogo di PF nell'analogia generale della soluzione precedente, si avrà $P \cdot R :: BC \times DS \cdot AC \times DT$.

Ma poichè PK ritrovasi qui tangente in P del circolo $\lambda P \mu$, DP è perpendicolare sopra PK, come DT; & in conseguenza DP qui si confonde con DT, o piuttosto questa con quella, dunque si può ancora sostituire DP in luogo di DT, & allora avrassi per questo caso $P \cdot R :: BC \times DS \cdot AC \times DP$.

COROLL. II. Se oltre a ciò si supponga; che l'angolo RGP sia infinitamente acuto, cioè, che le rette RG, & PG siano parallele, ovvero (che è lo stesso) se la direzione RM è perpendicolare a DM: poichè abbiám veduto, che in tal caso PK lo è sopra di questa istessa DM; allora DS, che si è conosciuta dover essere sempre perpendicolare su di RG, ritrovandosi confusa con DM, si potrà sostituire ancora DM in luogo di DS nell'ultima analogia del Corollario precedente, e si avrà $P \cdot R :: BC \times DM \cdot AC \times DP :: 2BC \times DM \cdot 2AC \times DP$. Ma se in generale si noti per (a) la circonferenza di un circolo, il di cui raggio fosse $= a$ (cioè tal circonferenza per queste due parentesi, e 'l suo raggio per quello, che esse racchiudono) si avrà $2BC = (DP) \& DM \cdot DP :: (DM) \cdot DP$. Dunque sostituendo ancora, si avrà parimente $P \cdot R ::$

P. R. :: (DP) ^ (DM). 2AC x (DP): : (DM). 2AC.
 Donde si vede , che l'incarico della vite , o del suo Strettojo , sarà quì alla potenza , che la ritiene in bilico , come la circonferenza del circolo descritto dal punto dello strettojo , o della lieva , alla quale detta potenza è applicata , è ad un intiero passo della vite , cioè alla distanza di due de' suoi Cordoni immediati presi consecutivi secondo la lunghezza di tal vite . E questo è 'l caso ordinario , qual si vede essere molto limitato rispetto al Problema antecedente .

I S T O R I A

DE' TAMARINDI

DEL SIGNOR TOURNEFORT.

Quelche in Medicina dicono Tamarindi , e che alcune volte si adoperano nelle pozioni , e nelle orzate purgative , altro non è , che la polpa , o la sostanza molle , quale ritrovasi nel frutto di alcuni Alberi , che portano l'istesso nome . Nascono questi in *Africa* , e più in *Senegal* nell' *Arabia* , & in alcuni luoghi dell' *Indie Orientali* : Oggi giorno si rinvergono pur nell' *Isole dell' America* , ove gli *Spagnoli* trapiantano nel principio delle loro conquiste insieme con la *Cassia* , e 'l *Zenzevo* , e con molte altre piante usuali .

Dobbiamo agli *Arabi* la cognizion de' Tamarindi .

3. *Ginno* 1699.

marindi. Gli antichi *Greci*, e que' che scrissero dopo *Galeno* ancora non li conobbero. *Serapione*, *Avicenna*, e *Mesue* primi ne an fatta parola; e sebbene quest' ultimo Autore senza ragione abbia affermato, che i Tamarindi fossero frutta delle Palme selvaggie; egli non può metterli in dubbio, che non abbia voluto intendere di que' Tamarindi, de' quali noi ci serviamo.

Nel mio ultimo viaggio di Spagna nel 1689., ebbi il piacere in *Granata* di vedere uno di detti Alberi in un terrapieno del famoso Palazzo dell' *Alabambra*, ornato da' Mori di cose aggradevoli, molto, e di sommo comodo per uso della vita. Assicurano gli Autori, che in tutta l' *Africa*, e nell' *Indie Orientali* i Viaggiatori si provvedano delle frutta di questi per mitigar la sete ne' gran calori; e che prendon cura di confettarle, per renderle più soavi, e per conservarle più lungamente.

L'Albero, che si chiama Tamarindo è grande, e grosso quanto una Noce con maggior celso. La radice è divisa in più braccia, che van molto lungi accompagnate da molte barbe ricoperte di corteccia rossiccia stitica, qual mi parve un poco amara, il pedale ha bella crescenza, da non poterli da due Uomini abbracciare; La corteccia molto grossa, bruna, e screpolata, il legno è duro, e come lionato, i rami si stendono con molta ordinanza per tutti i lati divisi, e suddivisi in ramuscelli vicendevoli, ricoverti di una sottil pelle verdebruna, ornati di molte foglie ben folte, ed alternamente disposte. Ciascuna foglia è composta da 9, 10, 12, sino a 15 paja di picciole foglie attaccate ad un lato lungo 4, o 5 dita, quale termina con un pajo di esse; nelle figure di *Prospero Alpino*, e dell' *Hortus Malabaricus* vi si rappresenta una sola fo-

Memor.

glia

glia. Le picciole foglie sono lunghe 8, o 9 linee, e 3, o 4 larghe, an la punta ottusa, e molto più ritonda della loro base, in cui si avvisa, come una specie d'angolo, che riguarda l'estremità del lato: Sono esse sottili, agrette, come i tralci delle Viti, delicate, verdechiare nell' orlo, & al di sotto leggermente vellose, scompartite nella loro lunghezza da piccioli nervi, rami de' quali sono sottilissimi; nel giorno sono divise, come quelle della nostra Acacia, ma nella notte si adattano l'una contro l'altra, come fanno quasi che tutte le foglie di un ramo.

I fiori nascono nelle piegature, e nell'estremità de' rami 9, e 10 insieme disposti a mazzolini, lunghi intorno a mezzo piede, molto rari, e quasi senza odore; sostenuto ciascheduno di essi da un gambo di 4, o 5 linee lungo: Ciascun fiore ha tre foglia color di rose, listate a color di sangue: Vi è per ordinario una delle sue foglie, quale è più picciola delle altre, che son lunghe quasi un mezzo dito, e son più di quattro linee larghe ondulate, e fimbriate, sicche sembrano simili alle foglie di una specie di Cisti, che C. Baubin ha detto *Cistus Mas folio Chamedrys*. Pin. Il Calice del fiore de' Tamarindi è un picciolo pero carnosso verdognolo terminato da quattro foglie bianche, o rossiccie, un pò più lunghe delle foglie del fiore, e sovente depresso in giù. Questo Calice tutto che polposo non divien frutto; anzi per lo contrario si dilunga, quando i fiori sono appassati, e non differisce punto dal picciuolo.

Il frutto del Tamarindo altra cosa non è, che 'l pestello del fiore ingrossato, e turgido dal succo nutricevole. Esce detto pestello dal mezzo del fiore, lungo circa mezzo dito, verdiccio, e cur-

vato , come il becco dell' Uccello : Rimpetto alla sua base nascono tre stami uniti nel loro nascere ; incurvati in verso contrario , bianchicci poco più lunghi del pestello , ciascuno premuto dalla sommità rossa , quale aprendosi , dà da una polvere dorata . Il frutto sù le prime è verde , e nella perfetta maturezza divien rossiccio , simile molto nella figura al baccello della fava ordinaria , che in Parigi dicono fava di Palude , egli è quasi quattro dita lungo , e largo uno , leggiermente ondato nel dosso , quale non è così grosso , come il lato opposto : Questo quì è incavato profondamente in due , o in tre luoghi , & in ogni lato è sensibilmente rilevato , stendendosi dal picciuolo , che sostiene il frutto fino alla sua estremità , la quale è ritonda , e finisce per lo più in un picciolo becco . A considerar questo frutto , egli è come un baccello doppio , o per meglio dire , composto da due baccelli l'uno nell'altro compreso ; l'esteriore è polposo , grosso una linea quando è verde ; l'interiore è una sottil pergamena : la tramezza fra questi due gusci , è grossa tre , o quattro linee , quali come una specie di diploa , riempito di quella polpa , o molle sostanza , di cui si fa uso in Medicina per isciogliere il ventre , e rinfrescare : Ella è nericcia , viscosa , agretta , sino ad allegar i denti , traversata da tre grossi cordoni di vascellamenti , uno de' quali si dilunga per lo dosso del guscio , gli altri due per lo lato opposto , sotto de' pocanzi detti : Si ravvisano ancora alcuni altri piccioli , che serpono per l'istesso lato . Le diramazioni di tutti questi docci non portano solamente il succo agro-vinoso , che si strigne in polpa ; ma somministrano ancora il nutrimento a' semi , che son contenuti nel baccello nel numero di tre , o quattro : Sono questi duri ,

pianati, grossi di circa due linee, lunghi di quattro, o cinque linee d'irregolar figura; altri son quati che quadrati con gli angoli rotondi; altri son più acuti in un lato, che in un' altro, puliti, lucidi d'un rosso, che si avvicina al falbo, segnati in ciascun lato con una macchia, che rassomiglia al seme: Contengono sotto la loro cortecchia due lobi bianchicci, camosci, che dividonfi facilissimamente tra di loro, e più quando s'immergano per poco nell'acqua: Contengono il germe, qual non si dilunga più d'una linea, posto come in nicchia nell' alto de' lobi, qual situazione è osservata per di fuori da una specie di picciolo bellico un pò rilevato.

Non abbiamo descrizione alcuna esatta, nè figura del Tamarindo: Appresso a' Droghieri si ritrova la loro polpa mischiata con i semi, quali gli Arabi, e gli Africani, dopo di aver mondati, cioè separato il guscio esteriore, ammassano insieme. In Europa si ordinano i Tamarindi soli per la loro acidezza, e si uniscono con altri purgativi remedj per quelle malattie, ove trattati non solamente di scaricare gli umori; ma di metter freno alla somma agitazione di essi, di attemperare il calor delle viscere, e di attutare il furor della bile. Gli Africani, e gli Orientali mangiano i Tamarindi, o ne fanno una specie di pozione mescolata con del Zuccaro, qual bevanda li rinfresca, e mantiene libero il ventre, con profitto della salute.

L'agrezza considerabile, che si osserva ne' Tamarindi, e l'analisi chimica dimostrano evidentemente, che dominano in essi l'acido: La parte alcalina è sì poca in detta polpa, che non si ravvisa, se non se distillandola con calce viva per ritorta. Tutto ciò, che si ricava da detta polpa, con l'analisi
sem-

semplice è acido, e sulfuroso. Da sei libre di Tamarindi dilattati in 16. libre d'acqua, si ebbero sei dramme di Sale essenziale, quale si attaccò a' pareti del vaso due mesi dopo; per quel tempo il liquore filtrato non muffò come avviene alla maggior parte de' succhi delle piante: Per ordinario si avacciano a ricavare il Sale essenziale da simili succhi; ma questo non differisce dal tartaro, che dopo un considerabil tempo si scevera dal vino: Per aspettare, che i succhi delle piante depongano tutto il loro sale essenziale, senza muffare, bisogna coprirli con un dito di oglio, e lasciarli nel medesimo vaso per un Anno. Dal fummofterno appena si ha qualche granello del sale essenziale, se si metta a svaporare, come per ordinario fanno dopo sette, o otto giorni; quando che coprendo il succo di detta pianta con olio comune, fra lo spazio di sette, o otto mesi quantità considerabile se ne trae.

Il Sale essenziale de' Tamarindi è allo 'ntutto simile al Cremor del Tartaro, è un poco acidetto, nè si scioglie nell'acqua fredda, non crepita su 'l fuoco, nè esala odor vinoso, quando se l'istilla l'olio di tartaro. I Tamarindi allo 'ncontro dilattati nell'acqua comune, dopo una digestione di più mesi, rendono lo spirito acido simile a quel dell'aceto: Locche mi fa conghietturare, che l'acido, qual domina ne' Tamarindi, si avvicini molto al carattere dell'agresto, il di cui Sale essenziale non differisce dal Tartaro: Una tal conghiettura potrebbe forse servire a spiegare la virtù solutiva del Tamarindo; perciocche non contendo altro, che acido, e solfo, potrebbe credersi, che tal acido invigorisse la parte resinosa de' Tamarandi, come appunto ne dimostra la sperien-

za, che la Manna dilattata nell'agresto, purga molto meglio, e più sicuramente, che se si sciogliesse nell'acqua comune, o nel brodo. Giacche gli acidi minerali propriamente son que', che rompono i purgativi remedj, e diminuiscono la loro virtù, e non già quelli delle piante, o del limone, o spirito di aceto.

Si ritrova alcuna volta su'rami del Tamarindo una specie del Sale essenziale, simile ancora al Cremor di tartaro: Unisceli egli, e s'indurisce dopo lo stravasamento del succo nutricevole, che ne' cocenti calori scappa da Docci in più maniere. Il Signor *Renaume* fe vedermi ultimamente alcune foglie d'una specie di Acero, che propriamente si chiama in Parigi *Sicomore*, sù le quali vi era un liquore inzuccherato: Le foglia del Tiglio su'l gran viale del Giardino Reale in ogn'anno ne son coperte, & allora più, quando la Stagione è un poco avanzata: In alcuni anni ebbi cura di lavare una gran quantità di dette foglie in una Secchia d'acqua fino a renderla molto dolce, quale svaporata per metà, diedi a bere nella quantità di tre bicchieri ad un Malato di mia Pieve, che teneva bisogno di esser purgato, e la pozione operò così bene, come un'orzata solutiva ordinaria: Cosa, che mi confermò nel pensiero de'Frati *Angelo Paglia*, e *Bartolomeo da Civita Vecchia*, che han commentato *Mesue*; quali primi, cioè nel 1543. proposero, che la Manna di *Calabria* non facevasi dalla rugiada del Cielo, ma che risudava da'rami, e dalle foglia di quell'Elce, che l'ha rotonde. *Altomari*, che scrisse nel 1558, *Tommaso Cornelio Cosentino*, il Signor *Marchant* Padre, e molti altri han confermato il sentimento de'Zoccolanti con osservazioni esattissime fatte ne' luoghi stessi; ond'è, che io credo,

pa-

potersi ben dire, che la Manna di Calabria, sia il Sale essenziale dell'Elce mischiato con una porzione considerabile di solfo: La Manna di *Briançon* sia ancora un Sale essenziale del Larice unito al Solfo; & il Zuccaro un Sale essenziale di alcune Canne, che si coltivano in Ispagna, e sopra tutto nelle parti Meridionali dell'America.

I succhi che gemono dalle piante posson ridursi a quattro principali Classi; l'une contengono molto Sale essenziale della pianta, come è il Zuccaro ordinario, quel dell'Arabia, la Manna di Calabria, quella di *Briançon*, quella che *Lobel*, e *Pena* chiamano *Elæomeli*, osservato in *Montpellier* su le Olive con *Rondelezio*, e *Banalio*: Io qualche volta ne raccolli nell'Autunno su gli stessi Alberi intorno ad *Aix*, & a *Toulon*, nè avvertii, se purgasse: Posson ridursi all'istessa classe il miele, e tutti i liquori zaccarini, che risudano dalle parti delle piante. Gustasi un tal liquore dolce ancora, quando si fugge il fondo di quali che tutti i fiori: Il Calice del fior del Melianto, trasportato da Africa da qualche Anno, ne contien molto, e questo è l'ordinario manicaretto degli *Hottentots* Popoli più numerosi del *Capo di buona speranza*, e gli *Ollandesi* istessi, che si trattengono in dette parti, rinvengono tal miele molto aggradevole, come il Signor *Herman* afferma; Ond'è, che se li è dato il nome di *Melanthos* alla pianta, che suona il fior del miele: Ne' Paesi caldi le foglia del Salice sono spesso nell'Estate ricoverte di un Zuccaro candito suavissimo; sicchè ha molto del verisimile, che tali dolci liquori somministrino alle Api la principal materia del loro miele, qual perderebbesi, nè giammai si depurerebbe, se non passasse per gli organi di questi animali. Nella seconda classe possono annoverarsi i

fucchi oleosi , e le vere ragie . Ogn'un sà , che tal forte di corpi altro non sono , che solfi , più o meno ristretti nell'Abete , vedendosi manifestamente i vasi , che li contengono , quali si osservano principalmente nella corteccia di questi Arbori , nella grossezza delli quali sono essi incavati a forma di Canali , che Sabato prossimo presenterò all' Accademia . La terza classe comprende i fucchi acquosi , mucilaginosi , e vischiosi , come sono le vere gomme , quali nella sol acqua si solvono ; così l' Arabica , di Senegal , di Ciriegia , di Albercocco , di Prugna , & altri liquori , che risudano nell' Estate dalla sommità di molte , e principalmenie da certa spezie di Lichnis . Sù la quarta classe possono riporsi le gomme raggie , che parte si solvono nell'acqua comune , e parte nello spirito di vino : Ma non avendo io fatto ancora conto esatto , & osservazioni sù le differenti soluzioni di tai corpi , per poterli distribuire in classi regolari ; prego la compagnia ad aggradire , che io mi vi applichi con attenzione , per poi renderne conto in altro tempo .

OSSE R V A Z I O N I

Di tre Novelle Macchie di Giove.

DEL SIGNOR CASSINI.

* **A** 11. di Giugno ore dieci , e mezzordella sera , mentre era attento ad osservare l'Eclisse del primo Satellite di Giove con Cannocchiale di diciassette piedi , viddi nel centro di Giove una macchia oscura sù di una sottil banda , che serviva,

* 17, *Giugno* 1699.

va, come di diametro a Giove. Era ella lunga quanto la sesta parte del semidiametro, e larga quanto la metà della sua lunghezza, obliqua un poco all' istessa banda. Alle 10^h 38' era nel centro.

Vi erano in Giove due altre fascie più larghe, e più oscure, una dalla parte di mezzo giorno, e l'altra di Settentrione: La Meridionale era un poco più dilungata dal centro, che dalla Settentrionale: Eranvi oltre a queste tre fascie, dalla parte del Settentrione, e due altre sottili, e parallele alle cennate; siccome un poco verso l'orlo orientale di Giove si avvisava un'altra macchia più grande della sudetta, & un poco più Meridionale.

Su le 11^h 24', queste due macchie erano in ugual distanza dalla metà di Giove; donde si formò giudizio, che la seconda sarebbe a mezza notte giusto nel mezzo; siccome osservata con l'istesso Cannocchiale su 'l far di mezza notte sembrò, che vi giugneste; veduta però con un altro di 46 piedi, vi raggiunse 6' dopo mezza notte, quando non più si distingueva la macchia prima, che poc' anzi si era osservata vicino all'orlo.

Un hora, e 32' dopo mezza notte vedevasi la seconda macchia vicino all'orlo occidentale di Giove; e nell'istesso tempo si osservò una terza più grande sù l'orlo Orientale preceduta da una picciola, quasi uguale all'orbita di un Satellite.

Alle 2^h, e 42' il mezzo di questa terza macchia più grande era nella metà di Giove, & era ancora Meridionale, come la seconda. Avendo posto in agguaglio gl'interstizj de'tempi, che scorsero fra queste tre macchie per giugnere alla metà di Giove con la loro intiera rivoluzione di 9^h 56', pareva, che la seconda macchia fosse discostata dalla prima in 54 gradi della circonferenza di Giove, e la ter-

128 *Memoria dell' Accademia Reale*
za distante dalla seconda 96 gradi.

Queste tre macchie sono situate nell' istessa fascia chiara fra le due oscure , ove erano quelle , che furono osservate nell'anno 1691 , e 1692 , che saran riportate nelle Memorie dell' Accademia . Dette due bande scure però non occupano l'istesso sito, che allora tenevano ; essendo presentemente più tra esse dilungate ; Sicchè può dirsi , che non siano più l'istesse fascie , ma che svanite le prime , se ne sian formate delle nuove un pò più lontane . E' veramente maraviglioso il cambiamento , che da un Anno all'altro si avvisa nelle fascie di Giove ; tosto si restringono , e tosto si ampliano , alcune volte interromponsi , & indi si riuniscono , se ne formano nuove in diversi luoghi di Giove , e spariscono alle volte . La Settentrionale , che per lo spazio di 40 Anni erasi la più larga di tutti veduta ; da due anni in quà si è ristretta , & oggi non si ravvisa più larga della Meridionale , che da due Anni si è molto più allargata .

Può farsi in qualche parte la mutazione nella lor situazione per ragion ottica , che corrisponde al cambiamento ottico , che avviene a' circoli de' Satelliti di Giove , i quali di sei, in sei Anni si fan vedere per linea dritta , quando giugne ne' loro nodi Giove ; & indi si cambiano in Ellisse per tre Anni , dilatandosi , e tre altri strignendosi ; Indi si rivolgono , e' l' semicircolo inferiore , che si aggirava verso il mezzo giorno per sei Anni , si rigira da Settentrione , e così reciprocamente ; ma poicché questi cambiamenti , che sensibilissimamente si osservano ne' Satelliti i più distanti da Giove , sono meno sensibili ne' più vicini ; le fascie , che sono sopra la superficie di Giove , non dovrebbero fare a proporzione , se non se una mutazione quasi che
im-

impercettibile ; quando che quella , che vi si offer-
va è molto sensibile , e potrebbe rifonderfi ad al-
cuna cagion Fisica . Nelle Memorie dell'Accade-
mia abbiain fatta parola di alcuno di esse: Nel 1692
avvisai di non essersi mai vedute tante macchie in
Giove , quante nell'istesso Anno, mentre era il Pia-
neta nel suo Parello . Oggi è nella metà di sua di-
stanza dal Sole , e giammai abbiain vedute in un'
istesso tempo tre macchie così grandi in lui , come
queste , che presentemente vi sono ; Sicche il di lo-
ro ritorno non sembra , che abbia ragione al ri-
torno di Giove nell'istessa distanza dal Sole ; come
abbiain proposto a dover esaminare: Le conseguen-
ze dedotte dall'invariabilità della gran macchia
Settentrionale di Giove dal tempo , che noi l'ab-
biamo osservata, devono oggi esser regolate, secon-
do la variazione , che noi vi ritroviamo presente-
mente: Locche ne dimostra, che vi sian nella natura
de' Cambiamenti , de' quali non sapremmo avve-
derci , se non se dopo una buona quantità d'Anni,
maggiore alle volte di quella , che all'ordinaria vi-
ta di un'Uomo è conceduta.

A 13. Giugno la prima di queste tre macchie
giunse nel mezzo di Giove a $11^h 45'$, & alli 11 det-
to eravi arrivata a $10^h 38'$: L'intervallo de' tem-
pi è di due giorni $1^h 7'$, fra quali ha fatte ella cin-
que rivoluzioni , per le quali dividendo questo in-
tervallo di $49^h 7'$, si ritrova, che in $9^h 50'$ ha fatta
una rivoluzione.

L'istesso giorno 13. di Giugno la seconda mac-
chia pervenne alla metà di Giove a $12^h 18'$ dopo
mezzo giorno; alle 11 vi era giunta a $12^h 6'$, l'in-
tervallo de' tempi è di due giorni $1^h 12'$, quali di-
visi in 5. rivoluzioni, dà per ciascheduna $9^h 51'$.

Non potè osservarsi nell'istessa notte il ritorno
della

140 *Memoria dell'Accademia Reale*

della terza alla metà di Giove, venendo il Cielo occupato da nugole per detto tempo: si vidde a 12. su le 11^h $\frac{1}{2}$ della sera dilungata dall'orlo occidentale per la quarta parte del diametro di Giove: Si vidde parimente a 14 su le 11^h 55', mentre avea passata la metà un poco meno dilungata dall'orlo, di quel che nella precedente osservazione si era avvisata.

La revoluzione di queste due macchie è uguale a quella di alcune altre comparse nel Mese di Dicembre 1690, e nel Mese di Gennajo 1691, qual ritrovammo di 9^h. 51' minore di 5' di quella, che avevamo osservata nell'Anno 1665, quale era più discostata dal centro di Giove; donde si conferma quel, che noi abbiám avvertito nelle Memorie de' 31 Gennajo 1692, cioè, che le macchie, quali più da vicino passano al centro apparente di Giove, abbiano un moto più veloce di quelle, che ne son più lontane.



METODO FACILE

PER RITROVARE UN SOLIDO ROTONDO

Quale mosso in un fluido stagnante parallelo al suo Asse, incontri minor resistenza, che ogni altro solido, quale avendo la stessa lunghezza, e larghezza, si muove con ugual velocità secondo la stessa direzione.

DEL SIG. MARCHESE DELL' HOPITAL.

* **A** Vendomi il Sig. Fazio inviato il suo Trattato delle Mura inchinate all'orizzonte per gli Alberi fruttiferi, impresso in Londra; nel fin di detto libro ho ritrovata una soluzione del Problema della *linea della più veloce calata*; & altra del *solido di minor resistenza*. Il Sig. Newton nella sua eccellente Opera de' *principi Matematici della Filosofia naturale* pag. 227, avea data una proprietà della linea, che descrive la superficie di questo solido con la sua rivoluzione intorno al proprio Asse: E poicché egli non iscopre il cammin tenuto per giugnervi, pretende il Sig. Fazio, che non possa ella dare alcun lume a coloro, che si mettono ad una tale inchiesta. Io quì non farò parola del primo Problema, come quello, che la maggior parte de' Geometri, quali l'anno sciolto ne' tempi divisi dall'Autore, an già reso pubblico con le loro soluzioni, o impresse, o comunicate per lettere a colo.

* 20 Giugno 1699.

coloro, che ne l'avean richiesti; in maniera che non è oggi più questo un mistero. La soluzione però dell'altro mi è sembrata cotanto intrigata, che non avendo potuto risolverla, col passo passo seguirla; mi son diliberato a rinvenirne una, che fusse più semplice, e più naturale: Se mi sia riuscita, giudicatelo, soltanto che io vi avverta, che'l metodo da me tenuto, può servire a sciogliere molte altre simili quistioni; e che io lo creda niente affatto differente da quello del Sig. *Newton*, avendomi condotto alla stessa proprietà. Ecco il sentimento di tal Problema.

* *Ritrovare la Curva DM di tal proprietà, che la superficie, qual'ella descrive con la sua rivoluzione intorno al proprio Asse AP, incontri minor resistenza, venendo mossa parallela a detto Asse in un fluido stagnante, che un'altra superficie simile descritta intorno al medesimo Asse da differenti linee Curve, comprese tra li stessi punti D, M, e mossa nell' istessa maniera.*

Suppongo, che le due picciole rette * MN, NO, sianò due piccioli lati del Poligone, qual forma la Curva ricercata: Io tiro le applicate MP, NQ, OH, con MF, NG parallele all'Asse AP, e la perpendicolare MD al picciolo lato MN, che incontri l'Asse nel punto D. Egli è chiaro, che la resistenza, quale incontra il picciolo lato MN, e la retta NF, essendo mossi in un fluido stagnante da P verso A con una tal velocità, sia precisamente uguale allo sforzo, che farebbero su di quelle linee in riposo le parti del fluido, se venissero ad urtarle con l'istessa direzione, e velocità. Ma secondo i

prin-

* Tav. 3. Fig. 2.

* Fig. 3.

principj di Meccanica, lo sforzo, che queste parti del fluido fanno su'l picciolo lato FN per muoverlo da A verso P, è allo sforzo, che fanno su'l picciolo lato MN, perche da M vada verso D, come MD a DP; e lo sforzo, che fanno queste istesse parti, per muovere il picciolo lato MN, lungo la sua perpendicolare da M verso D, è parimente a quello, che adopran esse per muoverlo parallelo all'Asse da A verso P, come MD è ad DP. Dunque lo sforzo, che fa il fluido su la picciola FN, per muoverla da A verso P, è allo sforzo, che egli fa su'l picciolo lato MN, per muoverlo parimente da A verso P, come il quadrato di MD è al quadrato di DP, ovvero, per la simiglianza de' Triangoli rettangoli MDP, MNF, come il quadrato di MN è al quadrato di NF. Se dunque si supponga, che la costante AB (a) esprima la velocità, con cui ciascuna parte del fluido urti nelle rette MN, NF; egli è chiaro, che $a \times NF \times MP$, potrà esprimere lo sforzo, che fanno le parti del fluido su la superficie descritta da FN intorno a PH; poicche NF $\times$ MP esprime detta superficie; e che facciasi quindi $\overline{MN}^2 \cdot \overline{NF}^2 :: a \times$

$\overline{NF} \times MP$. $\frac{a \times \overline{NF}^2 \times \overline{MP}}{\overline{MN}^2}$; questa quantità esprimerà

lo sforzo, che le parti del fluido, adoprano su la superficie descritta dal picciolo lato MN intorno all'Asse AP, per muoverlo da A verso P, ovvero (che è lo stesso) la resistenza, che incontra questa superficie mossa con la velocità AB (a) in contrario verso da P verso A. posto ciò.

Io considero i punti M, O, e la retta GN dati per posizione sopra di un piano, e cerco, qual debba essere la situazio delle picciole rette MN, NO, affine che la superficie, che esse descrivono intorno

ad

ad AP, ritrovi minor resistenza, che ogn'altra superficie, similmente descritta da due altre rette MN, NO. Per ritrovar questa situazione delle rette MN, NO, io dico le date, e costanti FN, b , GO, c , MP, f , NQ, g , e le incognite, e variabili MN, v , NO, z ;

& ho $\frac{ab^3f}{vv}$ per la resistenza, che incontra la superficie descritta da MN, secondo quel che quì sopra ho provato. Per l'istessa ragione $\frac{ac^3g}{zz}$ esprime la resistenza, che ritrova la superficie descritta da ON;

donde viene, che $\frac{ab^3f}{vv} + \frac{ac^3g}{zz}$ deve essere la minore. Quindi è, che prendendo la differenza di questi due termini, & uguagliandola al zero, come nel Libro dell'*Infiniti piccioli* ho insegnato, si formerà l'equazione $\frac{ab^3f dv}{v^3} = \frac{ac^3g dz}{z^3}$. Frattanto se

per un punto preso su la retta GN infinitamente prossimo ad N, si tirino le rette MN, ON, su le quali si lascin cadere le perpendicolari NR, NS; è chiaro, che l'angolo RN n sia uguale all'angolo FNM, e l'angolo SN n all'angolo GQN, poicché i due primi essendo aggiunti ad un'istesso angolo MN n , e li due altri all'istesso angolo GNO, siano angoli retti; e che perciò RN ($-dv$) è ad Sn (dz), come il seno dell'angolo FNM è al seno dell'angolo GON, cioè (prendendo NL uguale ad NM, tirando LK parallela ad NF, e chiamando MF, m , NG, n) come

MF (m) è ad NK ($\frac{nv}{z}$) donde si deduce un valore $-dv = \frac{mndz}{nv}$, il quale aggiunto all'equazione

pre-

precedente, da $\frac{ab^2 \int m \, dx}{v^4} = \frac{ac^2 \int n \, dx}{z^4}$, che si riduce a

$$\frac{b^2 \int m}{v^4} = \frac{c^2 \int n}{z^4}, \text{ donde si vede, che tirando } AB=a$$

perpendicolare all'asse AP, e tirando le rette BC, BE parallele a due piccioli lati MN, NO del Poligono, che forma la curva, si avrà $4 \overline{AB}^2 \times AC, BC^3 :: BC. MP$, e parimente $4 \overline{AB}^2 \times AE. BE^3 :: BE. NQ$; poicche mettendo in luogo di queste linee il valor loro analitico, e moltiplicando l'estreme, e le mezze,

$$\text{ritrovafi } \frac{b^2 \int m}{v^4} = \frac{1}{4} a = \frac{c^2 \int n}{z^4}.$$

* Egli è dunque chiaro, che la natura della curva ricercata DM debba esser tale, che avendo preso sopra AK perpendicolare all'Asse AP la parte $AB=a$, & avendo tirata parallela BC ad una linea, che tocca la curva in un qualunque punto M, si abbia sempre $4 \overline{AB}^2 \times AC. BC^3 :: BC. MP$. applicata in M: Che è la precisa proprietà del Sig. *Newton*.

Il Sig. *Fazio* ritrova col suo metodo una proprietà differente da questa, più semplice, come egli pretende, quantunque io non glie l'accordi, come quella, che contiene i raggi della sviluppata, & in conseguenza differenti seconde; quando per lo contrario questa non comprendendo altro, che tangenti, rende l'espression della curva con differenze prime, e facilmente mena a rinvenire i suoi punti col mezzo della quadratura dell'iperbole, come siegue; e questo appunto è il modo più semplice in tal questione.

Sian prese sopra AK perpendicolare all'Asse AP la parte $AB=a$, e sopra AP dilungata per lo

Memor.

K

ver.

Fig. 3.

verso di A la parte $AE = \sqrt[3]{aa}$: sia parimente descritta per lo punto E la logaritmica FEN, che abbia per asimptota la linea AK, sottangente della quale $= \frac{1}{2}a$. Avendo presa AC di quella grandezza, che si vorrà, quale io chiamo S, & avendo tirata CN parallela ad AK, che incontri la logaritmica in M, sian prese $AK = \frac{aa}{s} + \frac{aa}{2} s + \frac{s^3}{4aa}$, &

$AP = \frac{ss}{aa} + \frac{3s^3}{16a^3} - \frac{s}{4a}$ a $\pm$ CN, cioè quando AC superi AE, e $+$ allorché ella è minore; e siano tirate le rette KM, PM parallele ad AP, AK; il punto dell'intersezione di esse M farà nella curva ricercata DM.

Poiché dicendo AP, x , FM, y , AC, s , la proprietà, che deve aver la curva, fa AK, ovvero PM

$(y) = \frac{aa + 2aas + s^3}{4aas}$, e per conseguenza $dy = \frac{3sds}{4aas} - \frac{aads}{4as}$. Or poiché BC è parallela alla tangente in M, si avrà $dx = \frac{sdy}{a} = \frac{sds}{2a} + \frac{3s^2ds}{4s^3} - \frac{ads}{4s}$, integra-

le della quale è $AP(x) = \frac{s^2}{4a} + \frac{3s^3}{16a^3}$ meno l'integrale di $\frac{ads}{4s}$ più, o meno una quantità costante. Prendo per detta quantità $\frac{1}{4}a$, e la sminuisco, affinché CN, quale per proprietà della logaritmica FEN è

integrale di $+\frac{ads}{4s}$ annullandosi AP (x) sia ancor nulla. Dunque, &c.

Allorché $\Delta E = AE$, l'applicata FM, quale è la

la minore, che mai possa farli, diviene $AD = AE$; e la tangente nel punto D sarà parallela a BE. Ma se si prenda AC minore di AE, si descriverà la porzion DO della curva, la di cui convessità è opposta a quella della porzione DM, che discostasi così come ella di più in più all'infinito per le due rette AP, AK, di maniera che la linea ricercata MDO nel punto del rintuzzamento in D, e l' solido della minor resistenza, posson essere convessi forse, o concavi, o parte convessi, e parte concavi. Avendo il Sig. Fazio nella sua costruzione fatta $AE = AB$, e volendo sempre, che si assuma AC più grande di AE; ne siegue, che egli descriva la parte della porzione convessa DM, qual suppone AC più grande di AE: Locche dà luogo a credere, che non abbia egli avuto alcun conoscimento, nè del punto del rintuzzamento D, nè della parte concava DO, tanto più, che egli ha mal designata nella sua figura 5. la curva MV, qual deve avere per asintota la linea AQ, & avvicinarsi alla linea AT fin dove, $AT = AB$ ✓; dopp di che deve ella dilungarsene più, e più in infinito.



M A N I E R A
DI COMODAMENTE SOSTITUIRE
L' AZIONE DEL FUOCO ALLA FORZA
DEGLI UOMINI , E DE' CAVALLI

Per muovere le Machine .

DEL SIG. AMONTONS.

NON vi è chi dubiti , che l'azion del fuoco non sia violentissima , facendo la cotidiana sperienza conoscere , che corpi i più gravi , e più sodi , & i più resistenti non saprebbero durar lungo ten po alla di lei forza ; e che il potere di lui non solamente metta in moto la massa di ciascun di detti corpi , come avvenir vediamo nel prodigioso urto della polvere da Cannone ; ma ancora ne distrugga , & annichili interamente la forma del suo essere , come ne' legni , & in tutte altre materie combustibili si avvisa : Niuno però menerà buono , che una tal forza atta a produrre effetti cotanto sorprendenti , possa utilmente impiegarsi , a muovere regolarmente machine , nelle quali per costume s'adoperano forze animate , e regolari , quali son quelle degli Uomini , o de' Cavalli ; perciocche non ben si conosce la maniera da far questo , e tutte le finora proposte si son rinvenute colme di gravi inconvenienti . La verità frattanto si è , che questa nostra dubbiezza è forse quella istessa , che cadè negli anni i prima dell' invenzione de' Mulini ad acqua ,

P 20 Giugno 1699.

acqua, & a vento, se mai il moto di questi si fosse potuto ridurre a tal'uso; perciocchè in simili faccende, dipendendo tutto dal ritrovamento di qualche semplice mezzo, che renda l'uso comodo, e profittevole, un tal'impossibile non è dalla parte della cosa istessa, ma da quella delle nostre conoscenze, che si diffondono, & avanzano col tempo, e come l'esperienza, e l'uso cotidiano ne porgono l'occasione: Ma la maniera migliore da persuadere è quella de' fatti.

Eccovi alcune sperienze su di tal proposito fatte, che vi descrivo, per quindi dedurre verità, su le quali è bene prima andar di accordo.

PRIMA SPERENZA

Della rarefazione dell'aere, che faffi dal calor dell'acqua bogliente.

* In un pajuolo pieno d'acqua tuffati le palle de' tre Docci di vetro ACD, ACD, ACD di ugual lunghezza, aperto ciascheduno in A, rincurvato in C, terminante in una palla D, capacità delle quali erano tra di loro, come i numeri 1, 2, 3, & i tubi AB ancora. tuttochè molto stretti, non avendo il mezzano più di mezza linea di diametro interiore. In ciaschedun vetro conteneasi il Mercurio da E su l'imboccatura della palla fino a B, dove egli era tre dita più alto di E; perciocchè l'aere di cui le palle eran ripiene, non avendo potuto scappar via, quando si versò il Mercurio dentro per l'apertura A, col vigor della sua molla impediva, e sosteneva, che egli non calasse, e livellasse, entrando nella palla.

Si mise tutto al fuoco, & il Mercurio in B si

K 3

vide

* Tav. 2. Fig. 14.

vidde salire ugualmente in tempi uguali in tutti e tre li vetri; Sicche quando l'acqua cominciò a grillare, era 9 dita più su di B; e quando intieramente bolliva, monò a 9 dita, e 10 linee, dopo di che lasciò di più salire. Da tale sperienza ne viene.

1. Che'l calore dell'acqua bogliente ha suoi limiti, quali non oltrapassa.

2. Che ineguali masse d'aere ugualmente accrescono la forza della loro molla per gradi di ugal calore, & al contrario.

3. Che'l calore dell'acqua bogliente rinforzi, o accresca la molla dell'aere, fino a farle sostenere il peso di circa 10 dita del Mercurio in alto, ovvero 11 piedi, & 8 dita di acqua, più del peso dell'Atmosfera. * Perciocchè la quantità, in cui l'aere scema la sua molla, dilatandosi per entrar nel luogo del Mercurio, che monta da B in F, s'uguaglia quali alle due linee, che mancano dalle 10 dita in tale sperienza.

4. Che se l'aere abbia la libertà di stendersi, premuto solamente dal peso dell'Atmosfera, accrescerà il suo volume col calor dell'acqua bogliente intorno al terzo della sua massa; poicchè secondo le sperienze del Signor Mariotte; facendo l'aere equilibrio con la sua molla a' pesi proporzionati a' volumi, ne quali si riducono questi per la pressione; & essendo tali volumi fra di loro in ragione inversa di questi pesi; se l'altezza del Mercurio sia supposta di 45 dita, come in fatti può ella in questa sperienza esserla, e che il volume dell'aere sia espresso col num. 3, quando l'altezza del Mercurio non sarà più, che di 31 dita, il volume sarà 3 $\frac{1}{2}$.

Ma poicchè quì si suppone il peso dell'Atmosfera

* Si suppone, che'l peso dell'acqua a quella del Mercurio sia come 1 a 14.

sfera uguale a 31 dita di Mercurio (che in fatti non è, uguagliandosi a sole 28 dita), develi contare la frazione per un intiero; perciocchè l'aere perdendo meno la forza della sua molla, quando è poco premuto, che quando l'è molto più; non deve tanto accrescere il suo volume; per rimettersi dalla pressione di 41 dita a quella di 31, quanto deve fare, in ritornando dalla pressione di 38 dita a quella di 28.

5. Che se l'aere rarefatto dal calor dell'acqua bollente non ha la libertà di accrescere il suo volume, sino a divenire il terzo più grande, la forza della sua molla si uguaglierà sempre ad un peso maggior di quello dell'Atmosfera, il quale sempre sarà a quello della sudetta Atmosfera in ragione inversa de' volumi: Che se detto volume sia, per cagion di esempio, espresso col num. 7, e che l'altezza del Mercurio resistente alla forza della di lui molla, sia di 41 dita; quando detto volume sarà accresciuto di un settimo, cioè sarà espresso col num. 8, la forza della molla dell'aere, si uguaglierà ancora a 35½ di Mercurio, e qualche ne avrà perduto, non giugnerà, che a 5 dita ½ di Mercurio, ovvero 5 piedi 11 dita ½ d'acqua; e solamente a 5 piedi, 6 dita, 6 linee, se si faccia il calcolo sù di 38 dita, in luogo di 41.

I L S P E R I E N Z A.

I Termometri divisano in quest'altra quasi che il temperato: s'immerfero nell'acqua fredda le tre palle de' tre tubi cennati sopra, e l'Mercurio si abbassò quasi una linea sotto di B nel vetro, che avea la palla più grande, nel secondo 2 linee, e nel terzo più picciolo 3 linee, dopo di che cessò intiera:

K 4

men;

mento di abbassarsi in tutti e tre: si cavarono fuori dall'acqua i tre vetri, e 'l Mercurio continuò ad avvallarsi per una linea nel vetro della più picciola palla, di due linee nella mezzana, e di circa tre linee nella più grande; in maniera che il Mercurio rimase in qualche tempo in tutti e tre detti vetri intorno a quattro linee più basse di B, dove a poco a poco risalì appresso, come le palle si andavano disseccando.

Essendo questa sperienza simile ad un'altra, che io feci dodici Anni sono nel mese di Agosto, quando i calori son più grandi, col Zimosimetro; immergendo la palla di esso nell'acqua fredda, dove l'aere frattanto non iscemò di vantaggio la forza della sua molla; ne deduco,

1. Che l'aria immersa nell'acqua scemi la forza della sua molla di una linea nel sostenere l'altezza del Mercurio, meno dell' Atmosfera.

2. Che l'aria diminuisca ben la sua molla nella freddezza dell'acqua a proporzione del suo volume; ma che i più grandi ne perdano meno de' più piccioli.

3. Che l'acqua, quale è vicina a svaporare scemi la forza della molla dell'aere più di quando ella è in molta gran quantità, sicchè lo cinga da per tutto: qual cosa si conferma con quest'altra sperienza del Zimosimetro: Avendo tuffata la palla nello spirito di vino, la molla dell'aria iscenò, e sostenne il peso dell'acqua in altezza quattro dita meno del peso dell' Atmosfera; tolta dallo spirito di vino, sminuì ancora, fino a sostenere detta acqua cinque dita meno, che intutto eran nove dita d'acqua, meno del peso dell'Atmosfera: Riposta di nuovo nello spirito di vino, la molla dell'aere si aumentò nelle cinque dita calate mentre
era

era fuori; e ritolta dallo spirito, di nuovo si avallò per cinque dita. Questa sperienza fù fatta nello stesso tempo, che si fe quella, pozanzi detta, cioè nel calor della State più fervido.

4. Che questo secondo scemamento della forza della molla aerea, si faccia parimente in proporzione del suo volume, essendo più grande ne' maggiori, e più picciola ne' minori.

III. SPERIE N Z A.

* Si fe fabricare un Cubo di latta di ferro ABCD, per tutti i versi esattamente chiuso, e diviso in due parti ugualmente con lo spartitojo EF; sicchè la parte inferiore EBCF comunicasse con la superiore AEFD, per mezzo del tubo GH contenuto in un altro più grosso IL chiuso in L, & imboccato, e saldato in I nella parte superiore del Cubo: con MN altro Canale, che penetrasse nella parte superiore vicino quasi al fondo EF saldato in O, & imboccato, e saldato nell' estremità sua N in una picciola tinozza, o vaso P: Eravi inoltre verso A una picciola chiave per risfonder l' aria alla parte superiore. Nella tinozza P, stando aperta detta chiave, si versò acqua, quale per lo Canale NM scorresse nella parte superiore del Cubo sino a riempirla intieramente, e si chiuse e s' in merse per sei secondi la parte inferiore del Cubo nell' acqua bogliente; tosto parte considerabile dell' acqua contenuta nella superior divisione del Cubo, spinta dalla forza dell' molla dell'aere, precipitosamente salì nella tinozza P: Avendolo tolto nel finir delli sei secondi dall' acqua bogliente, la risalita nella tinozza cominciò a ricalare, sicchè per lo spazio di 300. secondi non

era

* Tav. 2. Fig. 15.

era ancora ridotta nello stato primiero . Si mise di poi detta parte inferiore nell'acqua fredda , per ridurre intieramente l'aere al suo primo volume , e dopo questo di nuovo si rimise nell'acqua bogliente, per sei altri secondi , e questa rimontò , come prima nel vaso P ; dopo di che si rituffò nell'acqua fredda , e l'aere riprese il suo primo volume in 18, ò 20 secondi : locchè più volte fù replicato con ugual effetto sempre , o che siasi tenuta detta parte inferiore del cubo nell'aria fredda per 18 , ò 20 secondi , o che dopo di averlo tenuto nell'acqua , si sia riposto all'aere. Da tali sperienze ne siegue.

1. Che i corpi duri , che non son molto grossi, come la latta di ferro, prontissimamente si riscalzano nelle acque boglienti.

2. Che non sempre il freddo solo del mezzo distrugga l'azione del calore ; poicchè secondo l'esperienza anzi detta , l'aere, e l'acqua sono quasi di un' istessa temperatura.

3. Che i Corpi sottili consumino tre, o quattro volte più di tempo a perdere nell'acqua fredda il calore lor appreso nell'acque boglienti, di qualche abbiano impiegati a riceverlo .

Io dico acqua fredda quella , che è uguale alla temperatura dell'aere.

I V. S P E R I E N Z A.

Nella sperienza antecedente i tubi NM , GH , avevano un sol piede di altezza , ma questo poi si allungò sino ad 8 piedi ; & avendo replicate le stesse sperienze , an corrisposte con ugual effetto , col variar solo , che l'acqua non montò in così gran quantità intiera , locchè dovea necessariamente avvenire per la maggior altezza , e peso dell' acqua ,
con

con cui si opponeva alla dilatazione del volume dell'aria contenuta nella parte inferiore del Cubo.

Si pose dopo di ciò la parte BC sopra a' carboni ardenti, e l'acqua falli nel tinozzo P, come nell'acqua bogliente, ma non vi montò sì prontamente, perche il calore immediato si applicò al fondo solo BC, quandoche dall'acqua bogliente eran cinti i quattro pareti del cubo BE, BF, FC, CE, quali insieme eran di superficie doppia di BC: Non potè avvisarsi bene il tempo, che l'acqua impiegò di più per salire nel vaso P; perciocche si attendeva, che le saldature del cubo non si fondessero, come avvenne, mentre l'acqua era per allora nella Tinozza così alta almeno, come sarebbe stata per l'effetto dell'acqua bogliente; e sarebbe montata più alta, senza di tal inconveniente.

Da questa sperienza ne siegue, che si può col calore del fuoco applicato immediatamente al vaso, che rinchiude l'aria, accrescere la forza della sua molla notabilmente più di quello, che con l'acqua bogliente farebbesi, purché il vaso, che la contiene possa resistere all'azione del fuoco; come ancora, che l'effetto vien altrettanto più spedito, quanto che l'azione di questo è maggiore.

V. S P E R I E N Z A.

Si adattarono cinque Uomini per muovere una Machina, spignendo a tutto potere con lieve quella parte, dove è costume di attaccare i cavalli.

Supponendo la forza di ciaschedun Uomo di 200. libbre; la totale sarà di 1000.

Si posero indi i Cavalli per quest'istesso, tra vagliandovi per tre Mesi: E quantunque vi si adoperassero quattro per volta, e che di tre in tre ore si rilasciassero, e dipoi per ogni ora e mezza scam-

156 *Memoria dell'Accademia Reale*

scambievolmente; sicche ciascun Cavallo non faticasse delle 24. ore, altro che sei, e per detto tempo facessero il cammino di sei leghe; pure non poterono resistere, e perivano.

A ciaschedun Cavallo se li davano tre fastelli di fieno di 15. f., uno stajo di Avena di 8. f., un mezzo fastello di paglia per lettiera di 2. f. 6. 8., che fan 25. f. 6. 8., a quali bisogna aggiungere il quarto di detti 25. f. 6. 8., perciocche di 265. giorni, che compongono l'Anno, ve ne sono 86. di feste, e Domeniche. Aggiungi il Salario de' Servidori, e Cocchieri di 5. f. per ciaschedun Cavallo, e quello del Maniscalco, e del Sellajo.

1. Da tale sperienza ne siegue, che per continuare notte, e giorno simigliante fatica, si richiederebbero 16. Cavalli; E che non possa contarli un Cavallo per una potenza continua di 60. libbre, che faccia una lega per ora.

2. Che 'l nutrimento, e spesa per un Cavallo, che fatica, ascenda per ogni giorno di fatica a 40 s

VI. S P E R I E N Z A.

Gli Artefici, che puliscono i Cristalli, si servono per premere il brunitojo, di una balestra, o arco di legno, un capo di cui rotondo poggia su 'lmezzo di detto pulitojo, e l'altro armato di ferro, preme contro una tavola di quercia dura, piantata sopra del luogo, ove si travaglia: La semplicità di tal macchina fa, che tutta la forza dell'Artesice s'impieghi unicamente ad avvacciare la sua fatica: Li brunitojo, de' quali ordinariamente si servono, sono di tre grandezze, quì appresso notate; e la pressione della loro balestra, la più familiare è, come si dirà, quell'istessa, che si è avvisata in un Romano a molla,
in

In appiccando l'uncino di esso nella superior punta della balestra, e tirandola giù direttamente; si è ancora osservata, in tirando il brunitojo orizzontalmente con una fune attaccata al manico di esso, cui per l'uncino sia appeso detto romano, la quantità di forza, che vi bisognava per muoverla, come quì appresso, fra le quali quantità, la mezzana esser di circa 25. libbre: Cominciando dunque detti Artefici l'ordinario lor travaglio, alle cinque del mattino, e terminando alle 7. ore della sera, col prendere in tre svariati tempi due ore per loro riposo, sicche delle 24. fatighino essi regolarmente 12. ore, interrotte di tre in tre ore dal riposo; il moto della loro balestra, cioè il cammino, che fa il brunitojo ogni qual volta, che lo spingano, o che'l tirano a se, per lo più è di un piede, e mezzo, & il tempo, che impiegano per ciaschedun moto, un mezzo secondo; ma poicche eglino di tempo in tempo si fermano, così per vedere la loro opera, come ancora per setolare, & affettare il brunitojo, & inoltre a suggellare, e rivoltare il cristallo, consuma tutto ciò intorno alla sessagesima parte del tempo della loro fatica; sicche di 12. ore, rimangono 10. di vero travaglio, il quale per tutto detto tempo si uguaglia all'innalzamento continuo di un peso di 25. libbre a tre piedi d'altezza per secondi.

Da questa sperienza ne nasce, che per far durare un simile travaglio per lo spazio di 24. ore, vi bisognerebbero due Uomini; e che perciò un Uomo solo tien le veci di una potenza continua di 12. l. $\frac{1}{2}$; facendo $\frac{1}{2}$ di lega per ora, cioè intorno alla sessagesima parte della fatica di un Cavallo.

Ecco le sperienze fatte con brunitoj di differenti grandezze, premuti da balestre di svariato
Un

158 *Memoria dell'Accademia Reale*

Un brunitojo di 6. dita di superficie premuto da 28. libbre, fù tirato da 23. l. nel suo forte, cioè allora, che la balestra era a perpendicolo, o nel mezzo del suo moto, e per 20. l. del suo debole.

L'istesso premuto da 30. libbre fù tirato da 26. l. nel forte, e 25. nel debole.

Un' altro brunitojo di 11. dita di superficie premuto da 28. l., fù tirato da 25. l. nel suo forte, e da 23. nel suo debole.

L'istesso caricato da 30. l., fù tirato da 28. libbre nel forte, e 25. nel debole.

Da queste sperienze può osservarsi di passaggio l'error comune, che i fregamenti nelle machine crescano, o diminuiscano a proporzion delle superficie; e che la ruota del molino, per cagion di esempio, tanto più facilmente giri, quanto che i di lei perni sono più corti; locche per altro è una struttura mal fatta, rodendosi presto il legno, su di cui si aggirano. Mà che tai fregamenti crescano o manchino a proporzione de' peli, che son mossi, e nella ragione della lunghezza delle lieve, che si adoprano a muoverli, alla lunghezza di quelle, su di cui si appoggiano.

Avrei desiderata occasione da fare l'istesse sperienze sopra a pezzi di ferri, di rame, di legno, sopra a' piani di simili materie, donde avrei potuto dedurre pesantissime regole, per calcolare lo sfregamento delle machine.

P R O B L E M A.

* *Dati a piacere tanti pesi uguali B, G, H, I, L, sopra la mezza circonferenza di una ruota verticale*

* *Tav. 2. Fig. 16.*

le di là della linea perpendico'are, che passa per lo centro di detta ruota, ritrovar la forza resistente, qual, applicata alla circonferenza della stessa, si bilichi con i pesi dati.

SOL. Sia il diametro orizzontale AB, per l'uguaglianza de' raggi AC, CB, un peso uguale in P, applicato in A, si bilicherà col peso B.

Inoltre i pesi, che si appendono all' estremità di una bilancia, essendo fra di loro, come si dimostra nelle Mechaniche in ragion reciproca della loro distanza dal sostegno; un peso, che sarà al peso B, come CD, uguale al seno retto dell' angolo GCL, al raggio CB, farà bilico col peso G.

Per l'istessa ragione, un peso, che sarà al peso B, come CE, a CB, si bilicherà col peso H; un altro peso, che sarà a B, come CF a CB, si equilibrerà col peso I, e così degli altri quanti mai si vogliano; in maniera che, il peso L essendo nella linea perpendicolare, non ha bisogno di alcun peso in A per far l'equilibrio, ma poicche in qualunque parte della circonferenza della Ruota sia la resistenza applicata, sempre vien riputata, che operi per la direzione di una tangente all' estremità di un raggio uguale ad AC; quindi nasce, che la resistenza, ovvero la somma de' pesi, quali applicati in A si bilicano con li pesi dati, sia a questi istessi pesi, come la somma de' seni retti degli angoli, che forman detti pesi, in dilungandosi dalla linea perpendicolare al centro della ruota, al seno totale moltiplicato col numero de' pesi. Locche &c.

DESCRIZIONE

Della maniera di comodamente servirsi del fuoco, per muovere le Machine.

Posto quanto di sopra, se A, B, C, D, E, F, & 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. sian o due ordini circolari, e concentrici di Cellette disposte intorno ad un asse orizzontale mobile in C, esattamente chiuse da per tutto, fuorchè in una parte, donde ciascuna delle Cellette A, B, C, D, E, F, &c. possa comunicarsi con ciascuna delle Celle 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. per mezzo de' tubi HI, LM, NO, PQ, RS, TV, &c. e che le Cellette 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. abbiano scambievolmente comunicazione, per mezzo delle animelle 7, 8, 9, 10, 11, e 12, &c. tutte allogate, sicchè si aprano per lo stesso verso, permettendo all'acqua della prima, di entrare nella seconda Celletta, a quel della seconda alla terza, della terza, alla quarta, e così per ordine fino all'ultima, donde si riversi di nuovo nella prima, con risponderla però in contrario modo.

Se inoltre le Cellette A, B, C, D, E, F, &c. non abbiano alcuna diretta comunicazione fra di loro; & in due delle Cellette 1, 2, 3, 4, vi sian due aperture, come X, Y, per le quali sian riempite di acqua, & indi esattamente chiuse; se la capacità di ciascuna delle Cellette 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. sia a un da presso la settima parte di una delle Cellette A, B, C, D, E, F, e che sia supposta la resistenza,

bi-

Fig. 4.

bilicarsi con l'acqua delle Cellette 1, 2, se in fine si applichi in BB la fiamma, che dalla Fornace AA esca spinta dall'aria, che dalla ferrata del Forno entra, e che la parte bassa del Tamburo, formata dalle Cellette A, B, C, D, E, F, s'immerghi nell'acqua fresca della conserva, & io dico.

1. Che l'aria della Celletta B accrescerà bastantemente la sua molla, per non solamente sostenere l'altezza dell'acqua IK; ma per far passare ancora l'acqua della Celletta 1, alla Celletta 3, se detta altezza IK sia poco meno di 5. piedi.

2. Che il peso di quest' acqua farà girare tutta questa fabbrica per lo verso di BAF intorno al centro G, se la resistenza sia minore di tal peso.

3. Che a misura del moto, quale intorno al centro G falli, l'acqua in Y procurerà di calare; nuove Cellette si presenteranno in BB, e novello aere accrescerà la sua molla, per rispignerla, e sostenerla nell'altezza sufficiente, perche il suo peso sia continuamente superiore alla resistenza, nello stesso tempo, che l'aere dilatato ripiglierà il suo primo volume, come appunto lo contengono le Cellette, passando per l'acqua della conserva &c, & indi per l'aere, dove interamente si rimette, per esser di nuovo dilatato in ogni qualvolta dette Cellette ritornino in BB: perciocche secondo la prima, e la quarta sperienza, l'aere aumenta la sua molla in una quantità equivalente ad un peso di 11. piedi, & 8. dita di altezza di acqua: Or secondo la regola del Signor Mariotte per la pression dell'aere di detti 11. piedi, & 8. dita, solo 10. dita, & un terzo sono impiegati per la pressione necessaria a far luogo all'accrescimento de' volumi dell'aria dilatata dal calore del fuoco, quali uniti a 5. piedi, 6. dita e mezzo, che questo accrescimento fa perdere alla

Memor.

L

mol.

molla dell'aere dilatato, secondo il V. Corollario della Sperienza prima, fanno in tutto 6 piedi, 4 dita, 10 linee, che tolti da 11 piedi, 8 dita, rimangono pure 5 piedi, 3 dita, 2 linee d'altezza, nella quale la molla dell'aere dilatato con calor uguale a quello dell'acqua bogliente, può sostenere l'acqua in Y.

Frattanto per lo precedente Problema, la resistenza applicata in alcun punto della circonferenza, che passa per lo mezzo delle cellette 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. è al peso di quest'acqua, quasi come 11, a 14; e se tal peso sia di 12 migliaja, questa resistenza sarà di 9428 $\frac{2}{3}$. Dando dunque 12 piedi di diametro al Tamburro formato dalle cellette 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. u di una simile lunghezza di 12 piedi, e 2 piedi di profondità presa a lato del centro della Ruota, queste cellette comprendono lo spazio di 754 piedi cubi $\frac{2}{3}$, quarto del quale è 188 $\frac{2}{3}$, che moltiplicato per 70 l., peso di un piede cubo di acqua, fanno 13200 l.; ma poiche nelle Machine la forza movente deve essere superiore alla resistenza, perche vi bisogna sempre superar qualche fregamento, le 1200 l. devono essere tenute per tal conto; Sicche l'effetto di questo movimento può computarsi per 9428 $\frac{2}{3}$, locche si uguaglierebbe per lo meno, secondo la V. Sperienza alla forza di 157 Cavalli, se la resistenza facesse una lega di cammino per ora; ma convenendo perciò, che tutta questa machina facesse 400 rivoluzioni. per ora, cioè impiegasse nove secondi per ciascheduna; quando che secondo la Sperienza III, non ve ne può impiegare meno di 36; ne nasce quindi, che questo modo terrebbe luogo per lo meno di 39 Cavalli, ovvero di 234 Uomini, secondo la Sperienza VI., qual suppone, che il grado del calore sia uguale a quello dell'acqua bogliente; poicche in contrario, l'effetto sarebbe più
con

considerabile, quanto più tal grado di calore si avanzasse, e l'utile, che avrebbesi nell'adoprar tal sorta di Mulino a fuoco, sarebbe altrettanto più vantaggioso, quantochè 'l prezzo del legno, che in 24 ore si consumerebbe, non monterebbe a 78 f; & altrettanto più, quanto che detto travaglio non impedirebbe l'uso di detto Forno per altre cose, come a far vetri, fonder metalli, & ad altre operazioni di Chimica, o di Meccanica, per cui il fuoco si adopra.

Non avendo altra mira frattanto, che di provare la possibilità di adoperare il fuoco, per muovere le machine regolatamente, come io credo di aver bastantemente fatto; e' mi sembrarebbe ora inutile l'entrare in un più minuto rapporto di tal costruzione; tanto più, che le difficoltà, che potranno indi essermi opposte, mi daran l'occasione di ridurla a perfezione. Mi piace sì di solamente dire, che conviene formar le Cellette, quali contengono l'aere di lastre grandi di rame ribadite, e saldate, e che tutto 'l rimanente, fuor de' docci di comunicazione, possa esser di legno.

I vantaggi di tal machina sono.

1. Il poter lasciare, e ripigliare la fatica quando si voglia, senza il peso della diligenza, e del nutrimento de' Cavalli, e la perdita, o malattia di essi.
2. L'aver sempre una potenza uguale senza interrompimento, & a piacere, locchè non può tenersi; servendosi de' Mulini a vento, ovvero ad acqua; rimanendo sovente i primi per mancanza di vento, & i secondi per lo ghiaccio, e sgorgamenti di acqua.
3. Il non essere in fine soggetto a' luoghi, rinvenendo da per tutto materie combustibili.

DESCRIZIONE
DELLA LIVELLA
DEL SIGNOR COUPLET.

IL Sig. Abbate *Picard* ha ben dimostrato, che la sua livella giugneva a tutta la possibile minuta precisione. Io la ho adoperata con lui, per la ricerca, e guida delle acque di *Verfailles*, e di *Seaux*, e con tale istrumento io diedi il punto della divisione delle acque del Canale di *Orleans*, o i punti della livella, per un Canale di sette leghe. La necessità però, che tale istrumento tiene, di due Ingegneri, per assistere i punti della livella a' Portatori del legno, il vicendevole dubbio, che può tener l'uno dell'osservazione dell'altro, il momento de' patti, che insieme devon farsi, e più ancora quella di non poter mettere ne tale istrumento in opera, ne altri con perfezion inventati, senza degli Artefici istruiti nell'Accademia delle Scienze, il tempo considerabile, che bisogna per l'esecuzione esatta, donde gran parte della giustezza delle operazioni dipende, il bisogno di talvolta trasportarlo, dove sia avvenuto qualche accidente: Tutti questi ostacoli (dico) quasi che insuperabili, convenendomi livellare 150 leghe da Parigi, mi obbligarono a pensare a quest'altro istrumento, che io feci lavorare da un semplice Calderajo, di cui mi servj per molti Anni appresso in molti livellamenti considerabili.

La

* 27 Giugno 1699.

* La prima Tavola dimostra la mia Livella in ordine.

Nella seconda, AB è 'l cannone del mio occhiale, quale è di piastra di ferro brunito, con dentro il Diafragma, e la Lente obiettiva in A, siccome suole: L'oculare io la metto nel fine del doccio C, & in questo vi s'entrare un'altro capo del doccio D, quale ha nell'imboccatura D un capello, che passa per lo diametro di esso, venendo disteso, e fermato in due fessure dalla cera fondutavi sopra. Questo capo D s'introduce verso G sin'attanto, che riguardando per lo doccio C si distingue nettamente il capello, e di poi tutti due ben fermi insieme, come se fusse un solo, si ficcano nel capo del Cannocchiale B.

Il Trattato della Livella del Sig. de la Hire pienamente ne istruisce di tali spezie di occhiali, e di quanto io qui suppongo, che debba saperli, per l'uso di essa.

Ho qui aggiunta una scala, che regolerà con esattezza tutte le misure della mia livella, quale può farsi a piacere più, o meno grande.

E rappresenta un capo del mio Cannocchiale, sopra di cui è saldato un cerchietto di ferro circa mezza linea grosso.

O rappresenta la mezza Luna di rame tre, o quattro linee larga, e mezza linea grossa, con due fessure, nelle quali entrano a festa l'estremità de' cerchietti. Questa mezza Luna è, come si vede, inoastata nella parte alta del coperchio di un vaso di rame, o di ferro bianco composto, parte cilindrico, e parte di un cono troncato: chiamo questo vaso *Calbassa*.

L 3

Ia

* Fig. 1.

In F, e G sono saldati i cerchietti, l'estremità de' quali entrano nella fessura della Lunetta incastrati su l'alto del coperchio OB, OC, quali lettere significano obiettiva, & oculare.

Non bisogna, che le fessure della mezza Luna siano così lunghe; che il doccio del Cannocchiale cada su'l fondo di essa.

HI è la sezion verticale de' vasi, che si veggono nella prima Tavola disegnati O. Questi vasi son pieni d'acqua, la quale si comunica dall'uno all'altro per mezzo de' due docci, che l'uniscono, e perciò li chiamo, Canali.

In questo Canale nuotano le Calbasse OB, OC, da per tutto ben saldate, con sopra'l loro Cannocchiale, e dentro picciole palle di quel piombo, che dicesi cenericcio, introdotto per una picciola buca aperta vicino alla saldatura della mezza Luna; e quando esse son molto caricate da tal peso, (locche scorgerassi da quello, che io dirò più appresso,) si riscalda questa buca, e si tura con cera bianca molle.

Bisogna, che la distanza de vasi M, N; *Tavola prima*, o de' vasi H, I, *Tavola seconda*, sia tale, che le Calbasse appiccassero a' cerchietti del doccio del Cannocchiale, che an sopra, nuotino precisamente nel mezzo di questi vasi: Ha ciascuno di essi vasi H, I, quattro punte su de' loro quattro lati, come la figura dimostra, che sporgono al di dentro intorno ad una linea, e diminuiscono l'ampiezza di essi: Perciò la figura cilintrica, o'l fodero di ciascheduna *Calbassa* ha intorno a quattro linee meno di diametro della lunghezza di ciaschedun lato del quadrato, che forma la parte superiore di questi vasi.

Queste 8 picciole punte, che sporgono nel
cana-

canale , non devono essere aguzze , ma rintuzzate , e pulite su la pietra di Levante.

Le fascie delle Calbasse, che nuotando possono urtare in dette punte , devono essere lavorate , e pulite , affine che dette punte non incontrino alcun' intoppo sopra di esse ; ma le respingano , allorché vengono ad urtarle.

Se il piombo introdotto nelle Calbasse , si affi in tal fatta accozzato , che 'l centro della massa impedisse il nuotar dritto ; dando alcun colpo su' l lato opposto alla parte , dove si è raccolto , si scuota un poco , e si raddrizzi : locche mi ha fatto anteporre una tal specie di peso a tutti altri.

KL è una tavola di noce , o di altro legno , che io chiamo sostegno del canale : Era ella su le prime grossa tre dita , oggi il di lei piano , e 'l profilo dimostrano , come l'abbia resa più leggiera.

In K, & L si sono trasforati due quadrati , ne quali il Canale entra sino a suoi confini , o risalto MN , come si vede nella prima , e nella seconda Tavola.

Nel mezzo di questa Tavola , vi è succhiata una buca di circa due dita : Ne' capi di questa stessa si sono inchiodate due maniche di rame , per dove due Uomini possano prenderla , e portar detto frumento in qualunque luogo , con un vaso d'acqua ancora : io mi servo d'uno di rame.

P. è il piano di circa il quarto di una sfera fatta di legno di noce , o d'altro.

R, è 'l profilo di esso ; e nel centro di tal porzione di sfera , vi sono tre braccia di ferro , come si vede in P . Queste son fabricate di un solo capo di verga piana , aventino in ciascuno de' loro capi un ganghero , & una grossa vite : Sono esse inchiodate sotto di tal porzione di sfera , & i tre loro gan-

L 4 .

gheri

gheri devono incontrarsi negli angoli d'un triangolo equilatero delineato nel piano di questa porzion di sfera.

T, V, X sono tre bastoni lunghi circa tre piedi, quali in ciascuno de' loro capi ferrati an la Chioccioia, in cui si mettano le tre viti, che formano il piede dell'Istrumento.

Non ritrovai vantaggioso, che gli altri capi de' bastoni fossero di ferro.

Per rendere più sicura, e far che abbia minori fregamenti il piede della mia livella; si è fatta la cavità 2, e 3 di più picciola sfera della convessità R.

Portato in alcuna Camera alta per assellar questo istrumento; si metta l'occhio nel Cannocchiale, e tenendo la mano all'appoggio, si giri per un verso, e per l'altro, sin'attanto che s'incontri qualche notabile oggetto molto distante, su di cui si fermi il capello, che stà nel fuoco della lente oculare.

Avendo ritrovato tale oggetto, si osservi, se il capello ritorni in quel punto, donde s'ismuove con picciolo colpo, appena sensibile, dato al canale istesso (giacche spesso son costretto, dopo tal colpo metter il dito sopra una delle Calbasse, per arrestare le loro vibrazioni); io metto la Calbassa OC dell'oculare nel luogo della Calbassa OB obbiettiva, e questa quì nel luogo dell'altra, osservando parimente, che le lettere OB, OC siano nel medesimo sito, nel quale erano nella prima operazione: Riguardo poi, se il capello si rimetta su l'istesso oggetto: se questa mutazione di Calbasse fa vedere l'obbietto più alto, o più basso del capello, non si deve conchiudere ancora, che e' non sia livellato con l'occhio; nè che e' lo sia, se 'l capello fusse precisamente di sopra: Può solamente conchiudersi
nel

nel primo caso , che le Calbasse non sono di ugual peso , e nel secondo , che le sono.

Se il capello si mette più alto , o più basso , io avverto a un dappresso (locche basta per lo caso presente) il mezzo di questa differenza ; e dopo di aver scemato il piombo da una delle Calbasse , o aggiunto all'altra , rimetto il suo turacciolo di cera , e riguardo , se il capello si metta su di quel che io avea stimato mezzo di questa differenza : Fo tali operazioni sin'attanto che mutando le Calbasse , vegga il capello mettersi nel mezzo di tal differenza . Un tetto di tegoli (non così distante , che non ne possa contar le fila) , sembravami comodo per questo principio di assestamento delle Calbasse.

Prendo indi un'altro obietto molto distante , di mira cui assesto questo mio capello : cambio di luogo le Calbasse , come ho detto ; e poi riguardo , se egli sia nell'istessa positura , e se vi ritorni dopo di averlo smosso . Se non sia nell'istesso luogo , io aggiungo , o scemo peso ad una delle Calbasse , sin'attanto che mi assicuri , che l'una , o l'altra Calbassa su l'oculare , o su l'obiettiva , mi diano l'istesso punto , tutto che distante a segno , che possa distinguerso : Sicuro dopo di ciò , che le Calbasse ugualmente s'immergono , io schiaccio bene il turacciolo di cera.

Spesso io metto piuttosto del piombo in una delle Calbasse , che tolga dall'altra ; poicché egli è bene , che siano immerse nell'acqua il più che si possa , senza però , che 'l Cannocchiale , che an sopra , per le loro vibrazioni possa toccare l'orlo del canale.

Rimane a mettere il Cannocchiale in istato di alloggiare sempre il suo capello su de' punti della livella ; giacché sino al presente non ho parlato di
altro.

altro , che delle Calbasse, per renderle gravi ugualmente , e che ugualmente s'immergano.

Per ciò fare , poco , o nulla mi apparto da quello , che ho insegnato per alsestare altre livelle.

Fd , dico , portar il piede dell' Istrumento in una Campagna aperta , o piuttosto su le sponde di un Fiume , donde io possa vedere due Portator di segni distanti da una parte , e dall' altra zoo , 300 , e meglio 500 passi dalla mia livella , quali mi mostrano i loro segni in distanze precisamente uguali.

Io mi servo per segno di un quarto di foglio di ferro bianco tinto nero da una banda . Riguardo col Cannocchiale il segno , che un mi presenta , e comando con due fischiare , o in altra guisa , che l'alzi , e con una sola , che l'abbassi ; e questo fin' attanto che il capello rada l'orlo del suo segno ; rivolto di poi l'obiettiva del mio Cannocchiale verso l'altro Portator de' segni , a chi ordino dell' istessa maniera , fin'attanto che il mio capello si rasente l'orlo del suo segno . Prendo per ordinario l'orlo di sopra , che si vede per quel di sotto ; poichè il mio Cannocchiale, essendo formato da due vetri , capovolta gli obietti.

Avendo fatte , e replicate queste operazioni, fino al rimaner contento dell' aggiustaro confronto di questi due orli de' segni , che sono due punti della livella ; io fd portar l'istrumento a piedi d'un di questi Uomini , e misuro ivi , come l'orlo del suo segno sia precisamente più alto , o più basso del capello del mio occhiale; e vo dipoi ad alzare, o bassare l'orlo dell'altro segno, altrettanto precisamente , quanto ho ritrovato questo più alto , o più basso , e così questi due orli son pur in livella . Torno indi a riguardare nel Cannocchiale, se l' capello

pello sia rasente l'orlo di quest'altro segno, essendo pur sicuro che'l capello sarà più basso; perciocchè io ho saldato su 'l fine del Cannone in AF, un pezzetto di stagno più grave de' due piccioli termini del doccio CD, posti come ho detto, in B. Vedendo dunque il mio capello più basso, dell'orlo da livellarli col capello dell'occhiale, scemo un poco di questo stagno, & a poco a poco, fin attanto che in fine detto capello sia rasente l'orlo di detto segno, quale è 400; 600, o 1000 passi di spazio, dove io fò l'operazione.

Fà al proposito, l'arrestare questi segni nella loro altezza livellata, come abbiám detto, per ripigliare questa operazione da uno ad altro segno; & egli è necessario a coloro, che livellano di accertarsi di due punti fissi della livella, in luogo comodo, per confrontare spesso, & avverare gl' Istrumenti di qualunque altra costruzione.

Noi abbiám in *Charenton* un cammino, la di cui chiusura è livellata con una linea del crociato della Torre Orientale delle Osservazioni. Quantunque mi serva questa per pruova della mia livella, prima di trasportarla in Campagna per alcun livellamento, che abbia io a fare; non lascio però, giunto su 'l luogo di rifar le pruove quì sopra descritte; affinché se sia avvenuto alcun cambiamento, più facilmente possa rifarlo. Essendo un giorno caduto nel Fiume il mio Cannocchiale, mentre io livellava *Moret* con *Montargis*, io mi servj d'un semplice Cannone senza vetri, appiccando a due capi di detto doccio due fili bianchi, che acconciati paralleli, aggravando un capo di questo doccio collo stagno, qual poi a poco a poco stremando fin a tanto che questi due fili mi dassero un punto di livella, allorache di due compariva un sol filo.

La cassa nella quale io trasporto tutta la mia livella è due piedi lunga, nove dita larga, & alta un piede, rinchiudendovi ancora il piombo minuto, la saldatura, un ferro da saldare, alcun foglio di ferro bianco, alcuni segni, una catena, un piede &c.

Q U A D R A T U R A D' U N A I N F I N I T A'

*Di Segmenti di Settori, e di altri Spazj della
Cicloide volgare.*

Del Signor BERNOULLI Professor di Matematica
in *Groningae*.

* **E** Gli è appunto un secolo, che questa famosa curva fu immaginata, secondo *Toricelli* dice, dal *Galileo* di lui Maestro, a chi sembra, che attribuisca egli una tal invenzione. Che che ne sia, con verità posso affermare, che in *Francia* particolarmente ella montasse nella sua più grande riputazione; essendo ben fermo, che l' *P. Mersenne* primo la pubblicò, in proponendola a tutti i Geometri del suo tempo; quali a gara applicatifi, vi fecero per allora delle molte scoperte, in maniera che molto difficile si rese il giudizio, a chi dovesse rifondersi l'onore del primo ritrovato: Di là nacque la celebre gara tra' Signori *Roberval*, *Toricelli*, *Descartes*, *Lalouera*, &c. che se tanto rumore tra' Dotti. Dopo di ciò non vi fu Matematico, ancor que' di picciola levatura, che non sperimentassero le proprie forze sù di tal linea, procurando di
sco-

• 11. *Luglio 1699*

Scoprirvi alcuna novella proprietà. I Signori *Pascal Huygens, Wallis, Wren*, & alcuni altri ne an lasciate le più belle. Sua identità con la sviluppata, le cadute in tempi uguali per gli archi ineguali di tal curva, e la più veloce calata, in cui l'abbiam ritrovata propria in questi ultimi tempi, senza verun contrasto, sono le più notabili; e più utili agli usi, che possan farli di essa nella Meccanica; come si vede nell' ammirabil ritrovato de' Pendoli.

Intorno alle proprietà pure speculative, non vi ha simile, che abbia tanto risvegliata l'ammirazione de' Savj, quanto la quadratura di un solo segmento nella Cicloide; e più perche si dimostra, che l'indisfinita quadratura di essa, sia impossibile, senza di quella del Cerchio, da cui ella dipende: Questa proprietà parve troppo bella all'istesso Signor *Wallis* (geloso della gloria di sua Nazione) da accordarne al Signor *Huygens* la prima invenzione; essendosi a tutto potere avvacciato di risponderne al suo Sig. *Wren* l'onore. Quindi il Sig. *Leibnitz* prese l'occasione di avanzarsi più nella ricerca di quest'altro segmento quadrabile obliquo, che e' pubblicò ne' Giornali. Ma questi due segmenti son quelli in tutto, che finora, si son creduti, quadrabili nella Cicloide ordinaria; e l'istesso Signor *Tschirnhaus* persuadevasi con tutta sicurezza, che questi soli fossero capaci di quadratura, sino ad arditamente asserir negli atti di *Leipsik* dell' Anno 1687. pag. 536., che la Cicloide non avesse un numero infinito di spazi quadrabili.

Per far dunque ricredere que', che potran esser dell'istesso suo sentimento, vedomi qui nelle strette di mostrarvi il contrario, con le scoperte fatte da me, già qualche tempo è intorno alle quadrature di una infinità, non solamente di segmenti,

ti, ma di Settori ancora, e di altre sorti di spazj di tal curva, rimettendo la difamina, e 'l giudizio all' Illustre Accademia delle Scienze, prima di darla fuori: Conciosia cosa che secondo tutte le apparenze, essendo questa l' ultima osservazione, che in questo secolo siasi fatta intorno alla nostra Cicloide; è ben dovere, che dopo di cento anni, ne' quali ha di continuo ella tenuto in esercizio li Matematici di tutta l' Europa, riporti infine gli ultimi suoi lumi in Francia, dove cominciò a nascere.

* Sia dunque la Cicloide comune EAG, base di essa sia EG, l' asse AF, il Circolo, che la genera ALF: Dico, che se a piacere si tirino due ordinate IB, KD, in maniera, che la distanza IH di una di esse dal centro, sia uguale alla distanza KA dell' altra dalla sommità: La retta BD, (qual suppongasi menata per l' estremità di tali ordinate), taglierà un segmento Cicloidale BCDB quadrabile. Questo segmento BCDB, sarà uguale alla somma de' triangoli rettilinei LFI + MFK. (Fig. 19. T. 3.), ovvero alla differenza degl' istessi LFI - MFK (Fig. 18): Che così dimostro.

Siano NAO parallela alla base EG, BN, DO parallele all' asse AF, & HL, HM raggi. Primieramente quando le ordinate IB, KD (Fig. 19.) sono in differenti lati dell' asse, il segmento BCDB si ritrova uguale al Trapezio BNOD diminuito da due trilinei ANB, & AOD; ma il Trapezio BNOD $= \frac{1}{2}BN + \frac{1}{2}DO \times NO$ (perciocchè HI = AK) = $\frac{1}{2}HA \times NO = \frac{1}{2}HA \times NA + \frac{1}{2}HA \times OA$. Or per natura della Cicloide $\frac{1}{2}HA \times NA = \frac{1}{2}HA \times$ dell' arco $\frac{2L + LI}{2} =$ al settore LHA + il Triangolo LHF =

* Tav. 3. Fig. 19.

al settore LFA; si dimostrerà parimente, che $\frac{1}{2}HA \times OA =$ al settore MFA. Dunque il Trapezio BNOD $=$ alli due settori LFA + MEA. Frattanto per la proprietà della Cicloide già divisa, il Trilineo ANB $=$ al segmento circolare AIL, & il Trilineo AOD $=$ al segmento circolare AKM. Dunque avendo dal Trapezio BNOD didotti i due Trilinei ANB, AOD; E da Settori AFL AFM i due segmenti circolari AIL, AKM; si avrà il segmento Cicloidale BCDB $=$ a due Triangoli rettilinei LFI + MFK. Locche &c.

Ma se le ordinate IB, KD, siano da un istesso lato (Fig. 18.) il segmento BCDB $=$ al Trapezio BNOD — il Trilineo ANB + il Trilineo AOD; Secondo l'ordine della dimostrazion precedente, si ritroverà il Trapezio BNOD $= \frac{1}{2}HA \times NA - \frac{1}{2}HA \times OA =$ al settore LFA $=$ il settore MFA. Dunque avendo sostituiti i segmenti circolari AIL, AKM nel luogo de' Trilinei ANB, AOD ad essi uguali; si avrà il segmento Cicloidale BCDB $=$ alla differenza de' due Triangoli rettilinei LFI — MFK. Locche &c.

COROL. I. Concorrendo, e confondendosi i punti K, & I nel mezzo del raggio AH, è chiaro, che la corda BD (Fig. 19.) farà allora perpendicolare all'asse AF, e passerà per lo stesso punto della metà del raggio (caso particolare del Signor Huygens) il segmento BADB divenendo in questo caso uguale al Triangolo equilatero inscritto nel circolo generatore, ovvero (che è lo stesso) al mezzo Esagono inscritto nell'istesso circolo.

COROL. II. Se li punti K, & I, sian distanti l'uno dall'altro, quanto mai possan farsi, cioè se K cada alla sommità A & I al centro C; il segmento BCDB tralignerà in quello, che fù dal Signor

Leib-

Leibnitz ritrovato, e sarà uguale al solo triangolo LEI (svanendo l'altro MFK) ovvero al quarto del quadrato inscritto nel circolo generatore: Che è lo stesso.

* Passo frattanto ad una general determinazione di una infinità di settori della Cicloide, quadrabili tutti, quali, come spero saranno ugualmente curiosi, che i segmenti. Sian, come sopra supposti i punti K , & I in ugual distanza dalla sommità A , e dal centro H : Dal punto I sian tirate due linee rette IB , ID alle due estremità dell' ordinata BKD : Formeranno queste un settor Cicloidale $IBADI$, quale io dico ancora quadrabile, essendo uguale al Triangolo Isoscele LFM . Non aggiungo la dimostrazione, che può facilmente dedursi dalla precedente: Bisogna solo, in passando, osservare, che i due casi particolari de' Signori *Huygens*, & *Leibnitz* vengano compresi in questa determinazione generale, essendo chiaro, che il settore $IBADI$ prenda la forma del segmento del Signor *Huygens*, quando i due punti K , & I si confondono; e si cambj ne' due segmenti obliqui del Signor *Leibnitz* quando I cade in A , & K in H .

Non sarà fuor di proposito il dire, che abbia io ritrovato un metodo singolare affatto, in di terminare altri spazj Cicloidali quadrabili per mezzo dell' Algebra. Per cagion di esempio, posso tirare due ordinate KD , 19 (*Fig. 18.*), quali comprendendo uno spazio $KDCBI$ quadrabile, dimostrino nell' istesso tempo, che possa ciò in infinite maniere praticarsi; Sicche lo spazio $KDCBI$ sarà sempre differente secondo le diversità delle radici delle equazioni Algebraiche, ora più ora meno ele-

* *Fig. 17.*

elevate : Poicche bisogna avvertire , che tutti questi spazj non possono essere determinati da universal costituzione , come si sono li segmenti , e settori anzidetti . Quando io saprò , che la dimostrazione Sintetica di questa quadratura generale avrà avuta la sorte di piacere all' Accademia ; li comunicherò ancora il metodo analitico poc' anzi detto .

M E T O D O

PER RIDURRE A CENTRO

I CRISTALLI DE' CANNOCCHIALI NEL
LAVORARLI.

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

* **D**Opo di aver conosciuto il modo da distinguere l'inequal grossezza de' Cristalli , de' quali fan uso , per formar l'Obbiettive de' Canocchiali ; non sarà difficile di situarli in centro , in lavorandoli ; cioè di far in maniera , che la grossezza maggiore del Cristallo si ritrovi nel centro della figura , quando verrà digrossato .

† Primieramente nel pezzetto del vetro , di cui vuol farsi un obbiettiva , tagliato in forma circolare , si segnerà il centro , come in C , e secondo il metodo da me dato , e come spiegherò in appresso per uso di ciò , si disegnerà sù di tal Cerchio il Dia-

Memor.

M

me-

* 22. Luglio 1699.

† Fig. 20.

metro AB, quale ditterminerà la maggior sua dop-
piezza in B, e la minore in A.

Secondamente: Comincerà a foggjarsi il Cri-
stallo, secondo quella figura, che se si vorrà dare,
sminuendo a poco a poco la parte B tanto, quanto
a un da presso ella può essere più grossa del la par-
te A; compiuto intieramente, e pulito questo lato
del Cristallo, si staccherà, e si elaminerà se siavi
luogo ancora più grosso, o se sia egli uguale da per
tutto. Quando egli è lavorato da un lato, potrà
determinarsi il centro con l' istesso metodo, cioè,
si potrà notare il punto, ove sia la maggior
groschezza di detto cristallo, col delinear prima un
diametro, come sopra, nel quale la linea o bian-
ca, o nera non appaja moltiplicata, come può
sempre ritrovarsi; E se in tutti i diametri tal linea
non si vedesse duplicata; allora può con sicurezza
tenerli, che 'l vetro sia ben livellato, e che si pos-
sa per l' altro verso lavorare, e ridurre a perfe-
zione: Ma se su'l Cristallo vi si delinei un altro dia-
metro DE, perpendicolare ad AB, ove l' immagine
della linea bianca, o nera non si vede moltiplicata;
e che l' immagine di questa istessa linea apparisse
moltiplicata nel diametro DE; all' ora sarà chiaro,
che 'l vetro non sia ben livellato. Bisogna dunque
far comparire l' immagine sudetta parallela al dia-
metro DE, e muoverla tanto, che non si veggia
più moltiplicata, facile per altro ad eseguirsi, &
allora si avviserà questa linea, come in FG, sù la
superficie del Cristallo, che ad angoli retti seghe-
rà il diametro AB nel punto H, centro di detto
Cristallo: Frattanto si trasporterà la grandezza CH
nell' altro lato del centro in CI, su'l diametro AB;
& avendo incastrato il vetro, come prima, si co-
mincerà a lavorar dal lato, qual' è ancora piano,
& a

& a poco a poco a consumare la sua parte verso B più di quella, che è verso A; in maniera, che essendo quasi che tutto sfericamente roso, non vi rimanga altro, che 'l picciolo punto I sù la superficie, che non lo sia: Et allora può questa parte del vetro perfezionarsi con sicurezza, che sarà al centro.

* Sù la superficie del Cristallo lavorata prima, potrà incollarli un pezzetto di carta bianca, sù di cui si segni il punto I, per riguardarlo sempre, in lavorando l' altro lato.

La dimostrazione di tal pratica non è ella difficile; perciocche sia ABMN figura della sezione del vetro fatta dal diametro AB perpendicolarmente alla superficie piana AB; Se s'immagini un piano parallelo a detta superficie, che tocchi in O il lato NOM del vetro lavorato; egli è chiaro, che 'l punto O sarà il centro del vetro, ovvero H punto a questi apposto: E poicche il punto C è nel mezzo del diametro AB, se si prenda CI uguale a CH, e che si faccia in maniera, che 'l punto I sia il luogo, ove la curvatura PIQ uguale, e simile ad NOM tocchi il piano AB, la linea IO venendo segata ugualmente in K, darà il punto K per centro di tal Cristallo. Locche bisognava ritrovare.

Frattanto per quel che riguarda al modo di poter ritrovare la maggior grossezza del Cristallo; trattandosi di una sola moltiplicazione, converrà solamente servirsi della riflessione di una linea bianca nell' oscurità, o della negra nel giorno chiaro.

† Deve perciò esponderli uno de' lati del vetro AB, alla linea nera, o bianca RS, in maniera che
M a egli

* Fig. 21.

† Fig. 22.

egli sia perpendicolare al piano, che passa per l'occhio O, e per la linea RS, e che detta superficie del vetro sia parimente pochissimo inchinata a detta linea, per divisarne più facilmente l'immagine; & allora che l'immagine AB della linea RS apparirà semplice, il diametro AB del pezzetto del Cristallo circolare determinerà la maggiore, o minor sua grossezza; ma se l'immagine AB apparirà duplicata, e che la più viva delle due sia verso X, e la più debile verso Y; così la parte X del Cristallo farà più grossa della parte Y, come ho dimostrato.

M E T O D O

COMUNE ALL' EQUAZIONI DEL SECONDO, E TERZO GRADO,

*Per averne la soluzione con una semplice
trasformazione del primo lor termine
fatta secondo l'ordinario.*

DEL SIGNOR VARIGNON.

* **F** Ra i molti Metodi finora da me ritrovati intorno a questo istesso soggetto, ho conosciuto il presente così naturale, e facile, che ho stimato, con dettarlo, perche si consideri, di far cosa grata a coloro, che sì fatte materie amano.

S E C O N D O G R A D O.

1. Sia $ax + px + q = 0$ equazione da sciogliersi.
Pren-

* 5. Agosto 1699.

Prendete $z = x - y$ (si assumerebbe $z = x + y$, se l'equazione avesse $-p$); & avrete $zz = xx - 2xy + yy = xx - 2xy + yy - yy = xx - 2yz - yy$: O per conseguenza ancora $zz + 2yz + yy = 0$. Quale equazio-

ne, confrontati termini con termini (secondo la maniera del Signor *Descartes*) con la proposta, $zz + pz + q = 0$, darà 1° , $pz = 2yz$, ovvero $y = \frac{1}{2}p$; & $x = \sqrt{\frac{1}{4}pp - q}$; dunque $z(x - y) = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}pp - q}$. Che bisognava primieramente ritrovare.

Li tre altri casi di questo grado compiuto, daranno parimente qualche siegue.

COROLLARIO.

Equazioni.

Radici.

$$zz + pz + q = 0 \dots\dots z = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}pp - q}$$

$$zz + pz - q = 0 \dots\dots z = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}pp + q}$$

$$zz - pz + q = 0 \dots\dots z = \frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}pp - q}$$

$$zz - pz - q = 0 \dots\dots z = \frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}pp + q}$$

TERZO GRADO.

II. Sia parimente $z^3 + pz + q = 0$ a scioglierla si. Prendete ancora $z = x - y$ (si prenderebbe pur $z = x + y$, se l'equazione avesse $-p$): Et avrete similmente $z^3 = x^3 - 3xxy + 3xyy - y^3 = x^3 - 3xy \times x - y - y^3 = x^3 - 3xyz - y^3$, & in conseguenza ancora $z^3 + 3xyz + y^3 = 0$: Qua-

le equazione confrontata, termini a termini con la proposta $z^3 + pz + q = 0$, darà 1° , $3xyz = pz$, ov-

vero $y = \frac{p}{3z}$, & 2° , $q = y^3 - x^3 = \frac{p^3}{27z^3} - x^3$;

M 3 102

ovvero $x^6 + qx^3 = \frac{1}{27} p^3$: Donde risulta (art. 1.)

$x^3 = -\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{3}qq + \frac{1}{27}p^3}$: E poichè $q = y^3 - x^3$

(potrebbe pur servirsi di $y = \frac{p}{x}$, per venir subito

alle formule ordinarie, che da quì si cominciano):

Si avrà parimente $y^3 = q + x^3 = \frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{3}qq + \frac{1}{27}p^3}$;

dunque $z(x-y) = \sqrt[3]{-\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{3}qq + \frac{1}{27}p^3}} -$

$\sqrt[3]{\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{3}qq + \frac{1}{27}p^3}}$. Che bisognava ritrovare.

Gli altri tre casi di questo terzo grado, senza secondo termine, daranno similmente qualche siegue.



COROLLARIO II.

Equazioni.

Radici.

$$x^3 + px + q = 0 \dots x = \sqrt[3]{-\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} - \frac{3\sqrt[3]{-\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}}{p}$$

$$x^3 + px - q = 0 \dots x = \sqrt[3]{\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}} - \frac{3\sqrt[3]{\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3}}}{p}$$

$$x^3 - px + q = 0 \dots x = \sqrt[3]{-\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3}} + \frac{3\sqrt[3]{-\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3}}}{p}$$

$$x^3 - px - q = 0 \dots x = \sqrt[3]{\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3}} + \frac{3\sqrt[3]{\frac{1}{3}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3}}}{p}$$

Sù di ciò potran farli le solte riflessioni; non avendo quì avuta altra mira, che li far conoscere la facilità del metodo proposto.

OS.

OSSERVAZIONI
SOPRA QUELLA SORTA D' INSETTI

Che comunemente chiamano

SCORPION MARINO.

DEL SIGNOR HOMBERG.

IO non farò quì l'intiera descrizione di tutto l'Animale , bastando l'ingiunta figura , per distinguerlo dagli altri Insetti : Ne descriverò solamente le parti , che si appartengono principalmente alla mia osservazione ; e poiche vi sono differenti specie di Scorpioni Marini , così per la grandezza , come per lo colore , e per la struttura del corpo , sarà bene lo specificare alle prime quelli , di cui dovrò parlare ; giacchè non mi è venuto in concio di osservarle tutte.

I maschi , e le femmine sono di un'istessa grandezza , cioè lunghi circa 20. linee , e 'l corpo dell' uno , e dell'altra è ugualmente gracile , eccetto la punta della coda , o l'estremità del ventre della femmina *b* , qual'è più grossa di quella del maschio *a* . Tutti e due però son vivacissimi , e soggiornano nelle rive de' Fiumi.

Li maschi son tinti a color violato lucido in tutto 'l corpo , le loro quattro ale sono trasparenti , leggermente dorate con una gran macchia violata

• 22. Agosto 1699.

ta, come'l loro corpo, quasi nel mezzo di ciascun' ala, rendendosi perciò questa parte opaca. Vedi *Fig.e*.

Le femmine son colorate in tutto'l loro corpo d'un grigio dorato lucido inchinante al verde: Anno le quattro ale trasparenti dell'istesso colore, senza macchie. Vedi *Fig.f*.

Quando sono in riposo, o che non volano, le quattro loro ale si adattano, e sì dappresso si uniscono l'une all'altra, che sembrano una sol'ala; quando allo 'ncontro molte altre specie di esse tengono sempre le loro ale distese, o che posino, o che volino.

La testa di detto Animale, che a proporzion del corpo è molto grossa, si attacca al suo petto per mezzo di un filo molto sottile. Il ventre *ac*, cioè quella parte, che si unisce al luogo, su di cui son le ale infino all'altra estremità, è diviso in dieci articoli, che si muovono dall'alto al basso, e dal basso all'altro, ma non già da un lato all'altro.

Quella parte, su la quale son piantate le ali, chiamerò petto dell'istesse.

Dappresso al mezzo del suo ventre verso *b* sono i pulmonì, divisandosi in questo, che tal parte si gonfi un poco, e si abbassi continuamente per piccioli intervalli; come nella respirazione avvenir vediamo.

Il fin del ventre del maschio *a*, ovvero il decimo articolo del suo ventre, è un'anello semplice, che forma il forame dell'ano, & è armato da quattro uncini, due più grossi sopra, lunghi quasi una linea, e due più piccioli sotto, che può egli aprire, e chiudere, come i granghi fan le loro branche. Vedi *Fig.a*.

L'estremità del ventre della Donna *b*, sembra
bra

bra formata da due docci, l'un su dell'altro adattati (vedi *Fig.b.*) quel di sotto è 'l forame dell'ano, donde si scarica delle sue fecce, & è situato come quello del maschio; l'altro di sopra è la parte femminile, o l'apertura della matrice. Quest'ultimo è lungo quasi una linea, e prende la sua origine dalla parte bassa dell'ottavo articolo del ventre. Questi due canali anno su 'l fin di ciascheduno due molto picciole punte, quando il forame dell'ano del maschio è guernito di quattro uncini. Questi due capi di docci allogati un su l'altro, rendono l'estremità del ventre della femmina più grossa, e più ottusa di quella del maschio.

Ho veduta in detti Animali un'operazione, che mi sembrò molto straordinaria, donde io mi mossi a curiosità di esaminarla con attenzione: Ella si fù, che'l maschio ritrovata la femmina assisa su di foglia, o ramo, vicino alla sponda dell'acqua, volando la prese con gli uncini dell'ano per lo collo, testa, e petto, e la trasportò così pendente col fin della sua coda.

Credei prima, che fossero questi due differenti spezie di Animali, che si cacciassero; ma non osservando resistenza alcuna, che per uno di essi si facesse, a fin d'impedire la violenza; & allo'ncontro, vedendo, che l'una presentavasi, facendo mostra di attender l'altro, per esser più comodamente trasportata, cambiai pensiero. In seguitandoli, viddi 'l maschio non lungi fermarsi su di un giunco, e nello stesso tempo alzar sua coda, con la quale teneva la femmina per lo collo, per posarla su l'istessa pianta: La femmina essendosi pur ella assisa dietro al maschio, curvò il suo ventre, facendolo passare per le di lei gambe, & il fine di esso con le sue parti accostò al petto del

maschio , dove gli organi genitali si osservano , (vedi la *Fig.g.*) : sostenendo in tutta questa azione il maschio la testa della femmina con l'estremità della sua coda.

Tennero questa positura intorno a tre minuti , indi sollevò il maschio con forza il suo petto , e le parti genitali di questi due Animali si divisero , come se si fossero svelti gli uni dagli altri : La coda del maschio rilasciò nello stesso tempo la testa della femmina , & all'istante sen volò via.

Rimasta in libertà la femmina , si rimise , e stiede immobile nell'istesso luogo , per un buon mezzo quarto d'ora , dopo del quale pur ella scappò via.

Presi io molti di questi Animali , per esaminare le parti loro genitali ; & eccone il minuto . La parte di sopra del ventre , così de' maschi , come delle femmine è in tutta la sua lunghezza convessa ; la sottana di esso è piegata , e ricurvata al di dentro , e foggia un canale in lungo , niente dissimile dalla parte inferiore di una penna fra le sue due barbe . Questo canale comincia nel maschio dalla terza giuntura , e si stende insino all'ano . Il primo articolo del suo ventre , che si attacca al petto , è un' anello rotondo , e molto stretto , della larghezza quasi d'una grossa spilla , quale non mostra di aver altr'uso , che dare moto più libero , e più grande al rimanente del ventre.

Il secondo articolo ne' maschi *c.* ha due linee di lunghezza incavato molto al di sotto , che forma una specie di fondo di sacco , i di cui orli son guerniti di pelo , & il fondo è verso il petto . Vedi la *Fig.c.*

Dal fondo di questo sacco sorge un picciolo corpo duro , e nero della grossezza di una setola di porco ,

porco , lungo due linee, con una picciola perla su'l fine , quale è dura , e molto bianca : sembra egli impiantato nel petto del maschio , e fare l'ufficio di verga : E' piegato per lungo su'l fondo di detto sacco , in maniera che sempre si vegga la picciola perla bianca : Qualora con una punta di penna si preme il fondo di detto sacco , esce di per se la verga nella lunghezza di una linea ; come pur avviene , qualora si preme il suo ano . Ho segato il petto del maschio per la parte di sopra delle ali , & ho ritrovato nella parte carnuta del di dentro una cavità a forma di cono , la di cui base era verso la testa dell' Animale , e la punta imboccava interiormente nella radice della verga ; Spinfi con picciolo stiletto la punta del cono vota , donde uscì la verga dal fondo del sacco , intera , quanto era lunga.

Aprii il petto a molti maschi , per disaminare tal cavità , ma non mi venne fatta di ritrovarla , che in due solamente , avendo gli altri il petto ripieno. Uno di questi due, di fresco si era congiunto , quando io lo presi , e l'altro mi venne a caso . Tal differenza mi ha fatto pensare , che questa cavità potesse ben'essere la conserva del seme di tal animale , la quale vorata di fresco , dimostrava ad occhi veggenti la cavità ; ma prima del congiungimento , o dopo di alcun tempo , essendo questo luogo ripieno ; i pareti di questo vaso , perche dan giù ; non rimanga vestigio sensibile di essa . Il fin del sacco , dove si alloga la verga , è una continuazione del canale , che si distende lungo il ventre al di sotto , con la differenza , che in tal parte egli è più profondo , e più largo di quel che non sia in tutto'l rimanente della sua distesa ; e che egli è ornato di peli , quandoche tutto'l rimanente è senza di questi.

La

La parte sottana del ventre delle femmine , è parimente piegata in gronda , quale comincia in esse dal secondo articolo del ventre , senza peli , come anno i maschi ; (*vedi la Fig.d.*) e per sei articoli discendesi.

I penultimi due articoli delle femmine contengono al di sotto le parti genitali esteriori , vedi la *Fig.b*: elleno sono in tal maniera formate. Il nono articolo hà sottana un'apertura , guarnita per ogni lato da picciole ale grigie biancastre , quali alette cuoprono detta apertura , e possono aprirsi , e chiudersi ; & allorache son chiuse , par che formino un picciolo doccio . Vedi *Fig.i*.

Nella radice dell'ottavo articolo , si erge un rilievo sino alla radice del nono articolo : su l'estremità di questo son piantate due picciole corna uncinatate , nere , molto dure , e poco più lunghe di una linea , foggiate a un dapresso , come i denti falcati della Vipera , un pò più curvi , le di cui punte son verso l'ano rivolte ; sono esse articolate , & anno moto per tutti i versi , stando per ordinario piegate su le alette pur ora descritte , sotto delle quali intieramente nascondonfi , e per la molto vicinanza , fan veduta di un solo uncino.

Io credo , che questi due piccioli corni possono avere i due usi , che sieguono . Primieramente , giacendo essi fra le due alette , che cuoprono le parti femminine , & avendo un movimento per tutti i versi , possono , in discostandosi l'uno dall'altro , aprire dette alette , e scoprire con ciò gli aditi di dette parti . Il secondo uso puol'essere di raddrizzare gli organi della femminuccia nel congiugnimento verso quelli del maschio in questa maniera.

Abbiain veduto , che gli organi del maschio
lian

sian molto vicini al petto, cioè nel secondo articolo del suo ventre in *c*; quando che que' della femmina son posti nell'estremità del ventre *b*; in maniere che nel congiugnimento vien la femmina ad incurvare il suo ventre, a farlo passare per mezzo delle sue gambe sotto 'l petto, per poter incontrare le parti del maschio, come nella *Fig. g* si osserva; qual positura è molto fastidiosa, come in quella, che potrebbe spesso non incontrare gli organi del maschio, senza l'aiuto di dette due corna, le quali elevandosi al di sotto delle alette, adattano la convessità loro al canale, che forma tutta la parte sottana del ventre maschile, nel quale eglino molto facilmente s'immettono, e dopo di essere entrati in detto canale, servono per infallibil guida alle parti della donna, a rigiugnere sicuramente quelle del maschio.

Ho conservate molte di dette femmine, per vedere se producessero uova; ma perciocchè avean bisogno di nutrimento, qual ricusavano nella loro prigione, periron tutte; e la mia diligenza non potè farci altro.

Nelle altre molte sezioni, che io feci, non rinvenni mai delle uova, locchè mi fè credere, che le femmine poco dopo del congiungimento si nascondessero, per far lor'uova, & indi perissero; come credo, che avvenga del maschio, ben tosto dopo, che si è congiunto; persuadendomi a ciò, l'aver ritrovato in differenti luoghi quantità delle ale de' maschi, morti fermamente in dette parti; e poichè non vi ritrovai de' corpi; molto verisimile è, che altri insetti se l'avessero mangiati.

Mi sono avveduto, che i primi di questi Animali presi su le 18. di Luglio di detto Anno, particolarmente i maschi, si erano più lunghi, e più forti

forti di que', ch'io 15 giorni appresso ebbi: Che dopo tre settimane non apparivano più, e que' che ritrovavansi, erano molto miseri; donde credei, che questi Animali non dischiudessero le loro uova in un'istesso tempo, e che i primi schiufi fossero migliori degli ultimi.

OSSERVAZIONE

D'UN' ECLISSE DELL'OCCHIO DEL TORO

ALDEBARAN, ovvero PALLCIUM.

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

* **A** 19 Agosto su 'l mattino vedevasi la Stella Aldebaran vicino alla Luna, in maniera che verso 30' dopo mezza notte sembrava, che dovesse essere rincontrata dalla Luna per l'orlo suo Settentrionale, apparenza, che poteva cagionarsi dalla poco elevazione di essa su l'orizzonte, dove la parallasse era molto grande. Attento dunque mi diedi ad osservar questo Eclisse, e vedere, se avvenisse di questa Stella qualche il Rev. P. Feuille de' Minimi tempo fà aveva osservato in un'altra Stella, che toccava l'orlo della Luna.

* Alzandosi questa su l'orizzonte, e sminuendosi la parallasse, la Stella toccò il confin luminoso della Luna, in un luogo distante dal corno Settentrionale circa 30 gradi. Osservai primamente che
la

* 22 Agosto 1699.

l. * Fig. 23. Tav. 3.

la Stella era in A, in una linea, che toccava l'orlo Orientale della Luna, parallela a quella, che passava per le corna, ad un'ora 18'. 0" dopo mezza notte, e che era in B su l'orlo luminoso, ove tutto d'un colpo disparve, che è il momento dell'immersione, ad 1^h. 41'. 31". La distanza, che vi era allora dalla linea tirata per lo corno Settentrionale perpendicolare alla linea delle corna, era 2' 59" osservata col Micrometro. Quel che mi sembrò più considerabile in questa osservazione, si fù, che 'l corpo della Stella appariva su l'orbita illuminata della Luna; in maniera che la distanza tra 'l centro di essa, e l'orlo della Luna, era a un dappresso uguale ad un diametro, e mezzo dell'apparente circonferenza della Stella; come può vedersi nell' a 24 figura: Ma in un momento appresso disparve. Tale osservazione si fece con un'ottimo Cannocchiale di 16 piedi: Aveva io prima osservato, che la Stella molto ugualmente camminava verso l'orlo della Luna, prima della sua immersione; sicche non poteva io suspicare, che vi fusse intorno a detta Luna alcuna Atmosfera, o più rara, o più densa del rimanente etere: Et io credo, che l'apparenza del corpo di essa su l'orbita della Luna rischiarata, come il P. Fuillee l'osservò, debba rifondersi al lume del corpo della Luna, che appariva sempre più grande di qualche in fatti non è, osservato ancora con un gran Cannocchiale; e che così possa vedersi il corpo della Stella molto più chiaro, e brillante del corpo della Luna attraverso di questo falso lume apparente; e che in fine l'Eclisse facciasi, quando la Stella tocca il vero orlo della Luna.

Osservai inoltre l'emersione della stella nella parte oscura C, su le 2^h 19' 32", quale pur avvenne in un momento, ricomparendo la Stella in un

Memor.

N

istante

istante brillante così, come suole; qual cosa deve attribuirsi al gran moto della Luna, riguardo alla picciolezza del corpo della Stella; donde farsi, che ella tutto in un subito si disbrighi dal corpo della Luna. L' emersione fu osservata con un buon Cannocchiale di soli 6. piedi, per poter meglio distinguere l' orlo oscuro della Luna, che vedevasi un poco rischiarato dalla riflessione luminosa della terra; non potrei però dire, che tal emersione sia fatta dall' orbita apparente della Luna; perciocchè questa parte era men rischiarata delle rimanenti, le quali pur molto debolmente l' erano.

In fine giunse la Stella in D sù la linea parallela a quella delle Corna, che passava per l' orlo occidentale della Luna, a $2^h 29' 30''$.

Osservai, che'l diametro apparente della Luna era di $32' 3''$ dopo l' immersione, stando la Luna alta sù l' Orizzonte 26° della parte d' Oriente. Tale osservazione è stata fatta esattamente col Micrometro.

L' intiera durata di di questo Eclisse è stata $38' 1''$, la sua metà a $2^h 0' 31''$.



DISAMINA DELLA FORZA DELL' UOMO

Per muovere pesi, o con levarli, o portandoli, o tirandoli, considerata assolutamente, o comparata con quella degli Animali, che portano, e tirano, come i Cavalli.

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

Suppongo primieramente, che un Uomo di mezza taglia, ma forte, pesi 140. libbre di nostra ragione. Considero ancora, che un simigliante Uomo, tenendo le due ginocchia a terra, sempre uniti, appoggiandosi su le sole punte de' piedi, possa rilevarsi; e poicche tale sforzo si fa da' muscoli delle gambe, e delle Coscie; egli è chiaro, per la supposizione sudetta del suo peso, che detti muscoli avran la forza di levar su 140. l. . . .

Ma tenendo questi le gambe un pò piegate, tuttocche egli sia gravato da un peso di 152. l., può insieme col peso del suo Corpo, che insieme alza, raddrizzarsi; sicche la forza de' muscoli delle gambe, e delle Coscie può levar su un peso di 290. l., cioè 150. l. di carico, e 140. l. peso del di lui Corpo, quando l' elevazione non monta più di 2, o 3. dita.

Inoltre, questo istesso, secondo la supposizione ora fatta, e come verrà in appresso sempre considerato, può parimente alzar di terra un peso di 100. l., che tien a suo' piedi, con piegare solamen-

N 2

14. Nov. 1699.

te il Corpo, e prendere detto peso con le mani, o con gli uncini, & indi raddrizzarsi. Donde viene, che i soli muscoli de' Lombi anno la forza di rilevare un peso di 170. l., cioè 100. di peso, e 70. l. metà del proprio peso del Corpo; dovendo non solamente innalzare il peso di 100. libbre, ma tutta la parte ancora superiore del suo Corpo dal cinto in sù, che lo stimo di 70. l., giacche egli si è curvato, per prendere detto peso.

Per quel che riguarda alla forza delle braccia per tirare, o per alzare una soma, può ella valutar si 160. l., nascendo da' muscoli delle spalle, e delle braccia; perciocche, se un Uomo con le due mani aggravi un Corpo fisso, allogato sopra della sua testa; potrà egli molto facilmente con lo sforzo delle sole sue braccia alzare tutto 'l suo Corpo, e 20. l. ancora di più, se ne fusse egli caricato. Facilmente può farlene la sperienza; perciocche se sia un pelo di 160. l. attaccato all' estremità di una fune, qual passi per una carrucola; e che un Uomo, qual pesa solamente 140. l. tiri l' altra estremità di detta Corda, egli è chiaro, che non potrà mai innalzare il peso di 160. l.; e tutto quello che potrà mai fare, sarà di appender si a detta Corda, giacche il peso attaccato all' altra estremità, essendo maggiore del di lui Corpo, lo terrà sospeso; perciocche la carrucola altra cosa non è, che una bilancia sempre di braccia uguali: ma se si aggiungano a quest' Uomo 20. altre l. di peso, si farà per questo uguale a quel dell' altro lato, e per poco, che si aggiunga a detto peso di 20. l., egli rileverà l' altro opposto; poicche li muscoli delle sue spalle, e delle braccia anno bastante forza per innalzare tutti detti pesi.

Quantunque i muscoli di ciascuna parte del
Cor-

Corpo sian capaci di sforzi così grandi , per rilevare sorme ; non deve però la forza dell' Uomo misurarsi per quella di tutti i muscoli insieme ; quando ancora gli Spiriti , che fan gonfiare i muscoli destinati al movimento in generale , col raccorciare , e stirare i loro tendini , potessero ugualmente distribuirsi in tutte dette parti , come in una parte sola ; giacche ciascuna parte sostiene per ordinario quella , che l'è unita . Per cagion di esempio , li muscoli delle braccia , e delle spalle possono alzare un peso di 160. l. ; ma se 'l corpo sia piegato , le braccia non potranno sostenere detto peso , per lo men se i muscoli de' lombi non abbiano in un istesso tempo il vigore di sostenere la parte superiore del corpo con il peso , da cui vien gravato ; e se le gambe ancora fossero piegate , bisognerebbe allora , che i muscoli di esse , e delle coscie facessero uno sforzo maggiore , dovendo sostenere il peso di 160. l. , e nell'istesso tempo quello di tutto 'l corpo : In tal disposizione dunque distribuendosi la forza per mezzo del ripartimento de' spiriti in tutte le parti , un Uomo non potrà alzar di terra un peso di 160. l.

Non è , che non possano ritrovarsi Uomini , i Spiriti de' quali scorrano in sì gran copia , e con tanta celerità ne' loro muscoli , che faccian crescere la loro forza tre , e quattro volte più dell' ordinaria ; donde a mio parer dipendono le maravigliose forze , che in alcuni si osservano , quali portano ; ed alzano sorme difficili a sostenerli da due , e tre Uomini insieme , quantunque sian questi alcuna volta di mezza taglia , & al di fuori faccian veduta piuttosto di deboli , che di forti . Non ha guari , che vi fù in questo Paese Uomo , che portava una grossa ancudine di Maniscalco , per quel che si disse , di cui narrano ancora molte azioni di

straordinaria forza: Et io in Venezia viddi un altro Giovane, che sembrava non aver vigore da reggere il peso di 40, o 50 l. con tutti i possibili vantaggi, il quale salito sù d'una picciola tavola, levava di terra, e sosteneva sospeso in aria un Asino con una cigna larga, che passava per sotto al ventre dell'Animale, & era attaccata coll' estremità ad uncini, che si appiccavano a' capi di due picciole treccie fatte di funicelle, e di pochi capelli delle parti laterali della testa di questo Garzone; e pur tutta questa gran forza dipendeva da soli muscoli delle spalle, e de' lombi, perciocche egli si abbassava, mentre si appiccavano gli uncini alla cigna, dopo di che egli rialzavasi, e levava l'Animale da terra, appoggiando le sue mani sù le ginocchia. Nell'istessa guisa alzava altri pesi, che eran più gravi di detto Animale, e diceva, che egli durava minor fatica con questi; perciocche l'Asino, perdendo, terra si dimenava.

Esaminiamo ora lo sforzo d'un Uomo nel portare una soma sù le spalle: Dico dunque, che il peso di questo puol essere di 150 l. col qual carico puo egli molto facilmente camminare sù di un piano orizzontale, purché non dilunghi il passo; ma che in niuna maniera possa salire una Montagna, o scala con l'istesso peso; perciocche l'azione del camminare, portando la soma sù le spalle, deve esser considerata, come un moto circolare del centro della gravità di un corpo, e del peso unito insieme su 'l piede, che si mena avanti, & è centro dell'arco di tal movimento; e che lo sforzo de' muscoli dell'altra gamba serva solamente a spingere detto centro in avanti; che se l'arco, qual descrive detto centro, è picciolo, lo sforzo della gamba di dietro non deve esser grande; poicche deve far

far levare tutta la forma del corpo, e del peso, secondo la sola quantità del seno verso della metà dell'arco: Che in questo caso non è considerabile, riguardo all'arco, o cammino fatto da tutta la forma.

Vedesi perciò, che un Uomo ben carico, può tanto più facilmente camminare, quanto che fa passi più stretti; poichè il seno sarà altrettanto più picciolo: Et allo 'ncontro facendo questi più grandi, non potrà reggere; perchè lo sforzo della gamba di dietro non potrà innalzare la forma del corpo, e del peso a proporzione del seno verso dell'arco, che sarà la metà del moto.

Facilmente pur si comprende, perchè tal Uomo in niuna guisa salir possa le scale, ovvero un altura molto erta con tal carico; perciocchè secondo quello, che poc'anzi si è spiegato, lo sforzo de' muscoli delle sue gambe, che possono rilevare un peso di 150 L. solamente all'altezza di due, o tre dita, nol potrebbero già a quella di cinque, ordinaria altezza de' scaglioni; ne pure salire una Montagna, se non faccia per lo meno passi così minuti; che non si levi più di due, o tre dita per ciascheduno.

Mi rimane in fine a considerare lo sforzo dell'Uomo, che nel tirare, o spingere orizzontalmente, impiega. Per rendere più chiaro, ed intelligibile questo spiegamento, io considero la di lui forza adattata al manico di una ruota, asse della quale sia orizzontale, su di cui si avvolga una fune, che sostenga un peso, data la distanza dal centro della ruota fino alla punta del manico uguale al semidiametro di detta ruota, affinchè senza alcuno vantaggio per parte della machina, si metta in agguaglio con la forza applicata; non avendo io qui

riguardo al fregamento dell'asse, nè alla rigidezza della corda in piegandosi.

Primieramente è chiaro, che se il braccio del manico sia orizzontale, e nell'altezza delle ginocchia, lo sforzo dell'Uomo, che lo alza in tirandolo, possa levare nell'istesso tempo il peso di 150.l. attaccato all'estremità della fune, con tutti i vantaggi possibili; poicche è l'istesso, che alzare detto peso, come poc' anzi ho detto. Ma se ciò facciasi coll'abbassare il manico, lo sforzo suo deve essere di 140.l., peso appunto di tutto 'l suo corpo, che può adattare con appoggiarvisi, quando però non sia caricato; poicche allora farebbe egli uno sforzo più grande.

Secondamente, se 'l braccio del manico è verticale, e sia all' altezza delle spalle, è certo, che un Uomo non potrà fare alcuno sforzo, per farlo girare, o che lo tiri, o che lo spinga con le mani, se li due piedi sian giunti, e 'l corpo sia dritto, come si vede nella *fig. 25. Tav. 3.* nella linea AP, rappresentando la linea AM orizzontale le braccia, che formano un angolo retto con AP: Nella qual positura, nè la forza di tutto 'l corpo, o delle sue parti, nè il suo peso possono fare alcuno sforzo per spignere, o per tirare: cosa ben conosciuta nella *Mecanica*; poicche io considero la larghezza de' piedi, come un sol punto P. Ma se il manico sia più alto, o più basso dell' altezza delle spalle; allora la linea, che dalle spalle v' alle mani, come AM, e quella, che v' dalle spalle a' piedi, come AP, faranno un angolo ottuso, ovvero acuto, e potrà l'Uomo aver qualche forza per tirare, o per ispignere il manico, dipendendo tal forza dal solo peso del corpo: locche è facile a comprenderfi, e dimostrarsi; Dovendosi considerare detto peso, o for-

za, come riunito nel suo centro di gravità, quale è un dappresso all' altezza del bilicolo per al di dentro del corpo. Ho detto, che bisogna aver mira al solo peso del corpo, per dimerminar l'equilibrio; perciocche lo sforzo de' muscoli delle gambe, e delle coscie serve solamente, per conservare detto equilibrio, in camminando.

* Sia nella *fig. 26.* il manico *D*, nell' altezza delle spalle *A*; e 'l centro della gravità del corpo sia in *C*, stando detto corpo molto inchinato verso il cennato manico, la punta de' piedi sia in *B*; bisognerà considerare, 1. il punto *P*, come punto di sostegno della lieva, ovvero verga diritta *PCH*, quale passando per lo centro della gravità *C* di tutto 'l corpo, incontri la linea delle braccia *MA* nel punto *H*. 2. che detto punto *C* della lieva sia caricato del peso di tutto 'l corpo 140 l., con la direzione sua naturale; l'estremità *H* sia sostenuta con la direzione orizzontale *MAH*; donde facilmente potrà conhiudersi, secondo la *Mecanica*, quale sforzo possa fare su 'l manico, per la direzione orizzontale *DH*, il peso del corpo in *C* con la sua natural direzione.

Perciocche primieramente sia *PH* di 140 parti, e *PC* di 80. Essendo lo sforzo di tutto 'l corpo al punto *C* di 140 l., nel punto *H* sarà di sole 80 l., come se nel punto *H* vi fusse un peso di 80 libbre, e che vi fusse sospeso con la sua direzione naturale, come deve essere nella supposizione, che abbiain fatta, perpendicolare ad *MA*. Quindi è, che se dal sostegno *P* si tiri la linea *PE* perpendicolare sopra di *MAF*, il peso di 80 l. in *H* con la direzione sua naturale, sarà allo sfor-

zo di questo istesso, secondo la direzion orizzontale MAH su 'l manico, nella ragione di PF ad HF; donde si diminuisce molto lo sforzo di 80 l. in una mediocre inclinazione del corpo ACB. Che se noi prendiamo per esempio, che la linea PCH faccia con MAH l'angolo PHH di 70 gradi, la linea del corpo ACB, sarà allora inclinata all'orizzonte, ovvero con MF d'un angolo maggiore di 60. gradi, quale al più più è l'inclinazione, in cui può esser il corpo, per poter camminare; & il seno di 70. gradi, qual'è PF, sarà al seno del suo compimento, qual'è HF, come quasi 7 a 1, & in conseguenza lo sforzo di 80 l. in H, secondo la natural direzione sarà a quello, che faranno, secondo la direzion orizzontale il terzo di 80 l., poco meno di 27. l.

Que', che non an fatta sperienza della forza di un'Uomo nello spingere orizzontalmente con le braccia, o nel tirare camminando una fune orizzontale, tenendo il corpo inchinato per lo davanti, o che la corda sia attaccata verso le spalle, o nel mezzo del corpo, niente perciò variando lo sforzo di un'istessa inclinazion di corpo, perciocchè il seno d'inclinazione, e quello del compimento, son sempre nell'istessa ragione; non saprebbero persuadersi, come tutta la forza dell'Uomo si riduca a non tirar orizzontalmente più di 27 libbre.

Non è già, che un'Uomo stando chino non possa sostenere peso molto più grande di 27 l., poichè se la linea PH facesse con HF un'angolo di 45 gradi; egli è certo, che'l peso del corpo sosterrrebbe 80 l.; m se fusse piegato, come la linea AB, e s'inclinasse all'orizzonte meno di 45 gradi; egli è certo, che a malpena potrebbe reggersi, non che camminare.

La stessa dimostrazione serve parimente a far
c9.

conoscere, che un'Uomo avrà molta maggior forza, se tirerà rinculando, che spignendo avanti; perciocchè in questa situazione di corpo, la linea PCH (nella 27 figura), che passa dalla punta de' piedi per lo centro della gravità C , donde l'accrescimento della forza dipende, sarà sempre inchinata all'orizzonte più che la linea del corpo ACB , tutto al contrario di quel che era nella positura precedente.

Questa maniera però di tirare non saprebbe metterli in pratica, se non se per tirar una corda. Gli Uomini stando sempre nell'istessa situazione, potrebbero prendere tal positura, giacche la natura, e l'esperienza ne anno insegnati di prendere tutti i vantaggi possibili nelle operazioni ordinarie.

Per l'istessa ragione i nostri Marinaj, e tutti que', che si servono de' remi in Mare, tirano quasi sempre d'avanti in dietro; perciocchè maggiore è la forza, di quella che, se li spignessero per avanti, nascerebbe come i Guidatori delle Gondole fanno in Vinegia, forse per non altra ragione, che per quella di vedere i luoghi, dove vadano; cosa, che molto più loro importa, che la gran forza, per i frequentissimi andirivieni, che lor conviene scorrere ne' canali; e per sfuggire gli urti delle altre Gondole.

Si rimane in fine di mettere in confronto la forza degli Uomini con quella de' Cavalli nel tirare, come essi, che sono i più forti di tutti gli Animali in questa parte; Ma poicche non dipende ella dal peso di essi, come quella dell'Uomo; ma principalmente da' muscoli de' loro corpi, e dalla general disposizione delle parti, vantagiosissime per spingere in avanti; dobbiam contentarci delle spe-

pienze comuni, donde s'appara, che un Cavallo tira orizzontalmente altrettanto, che sette Uomini; e così un Cavallo può tirare orizzontalmente poco meno di 200 L., e non già, che, sendo caricato, ne possa tirar di vantaggio: Questo però è lieve cosa riguardo all'Idea, che si tiene della gran forza di tal'Animale: Ma se si voglia considerare, come per ordinario, questa adattata a qualche macchina a ruote, quali sono le Carrette; non saprei farne una giusta misura; poicche su di un piano sodo, & orizzontale, bisogna loro tanta forza di più, quanta è necessaria, per vincere lo sfregamento degli Asini.

Può avvertirsi ancora, che tre Uomini faranno più di un Cavallo, alloracche si tratterà di portare una soma su di un Monte un poco erto; perciocche tre Uomini caricati ciascheduno di 100 L., monteranno più velocemente, e più facilmente, che un Cavallo gravato da 300; addivenendo ciò per la disposizione delle parti del corpo dell'Uomo, che sono più proprie a salire, di quelle del Cavallo.

Da questa dimostrazione ancora si vede, che que', ch'an creduto di poter tirare un grandissimo vantaggio dal peso del Cavallo, applicandolo in una Machina all'altaleno, per servire al moto dello stantuffo d'una Tromba, non an ritrovato negli effetti tutto ciò, che col calcolo del peso di detto Animale computarono; poicche a ciascun passo loro sarà convenuto di cambiar moto,



**OSSERVAZIONE
DELL' ECLISSE DEL SOLE**

A 23. Settembre 1699.

DEL SIGNOR CASSINI.

I L principio dell'Eclisse ad 8^h 15' 0" del mattino
con quattro Cannocchiali differenti.



Dite

108 *Memoria dell' Accademia Reale*
Dita eclif-
face

late

Su la carta con un Cannocchiale di 45 piedi.	Col Micrometro.	Per lo passaggio, per lo filo orizzontale, e per lo verticale.	Per la figura tirata dall' Ipotesi.
--	-----------------	--	-------------------------------------

	H.min.	Sec.	H.min.	Sec.	H.min.	Sec.	H.min.	Sec.	
1	8	30	40	8	20	16	8	31	0
2	8	26	40	8	26	58	8	27	30
3	8	34	10	8	33	15	8	33	10
4	8	40	29	8	40	2	8	40	0
5	8	46	28	8	46	28	8	46	30
6	8	53	1	8	52	43	8	52	45
7	8	59	53	8	59	4	9	0	0
8	9	8	25	9	7	56	9	7	30
9	8	15	53	9	16	6	9	16	0

Oscrazione la più grande di 9, 29'

			9	27	9	39	10	9	31	0		
9			9	39	33							
8			9	48	24	9	43	20	9	48	0	
7			9	55	44	9	56	17	9	55	30	
6			10	4	19	10	3	27	10	2	45	
5			10	11	5	10	9	55	10	10	15	
4	10	17	37	10	17	58	10	17	58	10	17	0
3	10	24	33	10	25	4	10	23	54	10	24	30
2	10	31	14	10	31	57	10	31	55	10	31	0
1	10	37	38	10	37	37	10	37	37	10	38	15
	10	44	56	10	44	58	10	45	5	10	45	0

Fine

R I F L E S S I O N E

* S O P R A Q U E S T O E C L I S S I .
D E L S I G. C A S S I N I .

L'Eclissi del Sole avvennuto a 23 di Settembre di questo Anno 1699 è uno de' più memorabili , che da lungo tempo in quà sia stato.

Avvenne nell'equinozio di Autunno , nel tempo, che'l Sole passava per l'Equinoziale, e dall'Emisfero Settentrionale giva al Meridionale . Il suo centro l'avea passata nella notte antecedente ad ore 9 , e minuti, dopo mezzo giorno al Meridiano di Parigi ; e l'orlo suo Settentrionale lasciolla ad un'ora , & un quarto dopo mezzo giorno delli 23 , quando l'Eclissi finì di comparire per tutta la Terra.

Il Sole dunque nel tempo di tal'Eclisse illuminava debilmente più d'un'Emisfero della Terra , compreso fra li due Poli . Il Polo Settentrionale era rischiarato dalla parte Settentrionale del Sole , e la Meridionale dalla Meridionale.

La Luna nel tempo dell'Eclissi era ancora nella parte Settentrionale del Cielo , e giunse all'Equinoziale con l'orlo suo Meridionale , fu 'l fin dell'Eclissi .

Quindi è , che in passando fra'l Sole , qual'era in una altezza incomparabilmente più grande , e l'Emisfero Settentrionale della Terra , occupò ella
suc-

* Queste riflessioni , che si erano dell'edizione di Parigi ommesse qui , si ritrovano nel fine delle Mem. nell'istessa edizione.

ſucceſſivamente una gran parte del Sole nella region Settentrionale, laſciandolo libero a que' della Meridionale.

Vi furono luoghi, che ſi ritrovarono precipitamente nella linea retta, qual paſſava per lo centro del Sole, e della Luna prolungata fino alla ſuperficie della Terra. Detti luoghi ebbero per un'istante l'Eclifſe centrale, e fu ciaſcheduno ſucceſſivamente, come in un punto d'ombra, qual'è il termine di queſta linea. Cambia ella di continuo ſito, riguardando alla Terra, per un movimento compoſto di due contrarj, uno è l'univerſale comune al Sole, & alla Luna, per cui queſti due Pianeti in ciaſcun giorno girano la Terra da Oriente in Occidente; e l'altro è particolare della Luna ſotto del Sole, da Occidente in Oriente, con una dechinazione, che in queſto Eclifſe era verſo mezzo giorno, come ſempre dell'Eclifſi Solari di Autunno avviene.

Quantunque il periodo di queſti movimenti particolari, ſia molto più lento dell'univerſale; nientedimeno l'ombra fa nell'ifteſſo tempo ſu la ſuperficie della Terra più cammino per lo moto particolare, che per l'univerſale; Ond'è, che'l particolare lo ſupera, e fa ſegnare ſu la ſuperficie della Terra per un velociffimo moto da Occidente in Oriente, dechinante in queſto Eclifſe verſo mezzo giorno, un ſentiero oſcuro, che paſſa per luoghi, quali vedono ſucceſſivamente l'Eclifſe centrale. E'dunque egli veduto piuttosto nelle parti Occidentali della Terra, che nelle Orientali; quando che il ſolo moto univerſale lo farebbe vedere piuttosto agli Orientali, che agli Occidentali.

Il Sole, e la Luna ſendo diſtanti dalla Terra nel principio di queſto Eclifſe in una proporziata diſtanza al loro diametro vero, apparve la Luna
ugua-

uguale al Sole ; & i luoghi , che si ritrovaron precisamente a linea retta con questi Altri , poteron vedere per un'istante l'Eclissi totale.

Ma poicche la Terra è un globo , che ha parti , alle quali la Luna in un medesimo istante è più vicina , che ad altre , avviene , che nello stesso tempo , alcuni possan veder la Luna così grande , come 'l Sole ; & altri , o più grande , o più picciola.

Que' , che an veduto il Sole eclissato , dopo 'l levarsi , l'avran veduto così grande , come la Luna ; perciocche l'una , e l'altro apparivan'allora di 32' 8". Que' , che l'an veduto eclissato vicino al mezzo giorno , avran veduta la Luna (che allora era loro più prossima) più grande di più secondi : E que' che an veduto l'eclisse prima di tramontar il Sole , l'an veduta più picciola di alcuni secondi . Quest'ultimo effetto addiveniva dal moto particolar della Luna , che nel tempo di tal'Eclisse si discostava di più in più dal centro della Terra verso il suo Apogeo con un moto composto di periodi differenti , che rendeva lo scemamento apparente del diametro della Luna quasi d'un secondo per ora , e la doveva far apparire più picciola nel tramontare , che non era comparsa nel sorgere . In tal guisa alcuni avran potuto veder detto Eclissi totale per un'istante ; altri poco più , & altri l'avran potuto osservare a forma d'anello , dove la Luna nella sua congiunzione centrale , non avrà potuto occupare tutto 'l Sole , ma ne avrà lasciato l'orlo luminoso , a simiglianza di un grande anello .

Sarebbe faccenda di una strema sottigliezza , se in questo Eclisse , in cui il diametro del Sole , e della Luna apparivano quasi uguali , differendo di alcuni secondi , con molta giustezza si distinguessero

Memor.

O

sero

fero i luoghi, che l'an potuto veder contrale in dette tre differenti maniere, non solamente per le ipotesi; ma per le osservazioni ancora, che se ne son fatte ne' luoghi, ove l'Eclisse fù parziale.

Nell'immagine del Sole formata nel fuoco di un'occhiale di 45 piedi, la Luna appariva alle volte uguale al Sole, alle volte un poco più picciola, & alle volte un pò più grande. Quando l'Eclisse giunse a 9 dita, si prese la distanza de' punti nella circonferenza del Sole di 155 gradi: Ella avrebbe dovuta apparire di 151 gradi, se la Luna non fosse comparsa più grande del Sole; Ma 10' dopo, la distanza sudetta fù presa di 145 gradi; & ella avrebbe dovuta essere più grande di 151, se la Luna non s'avesse veduta più picciola del Sole: Una tal differenza devesi attribuire alla somma difficoltà, che vi era di seguire il Sole con sì gran Cannocchiale così esattamente, come richiedevan le misure da giustamente prenderli. Questa difficoltà scemava l'evidenza, e l'esattezza, che la grandezza dell'istrumento facea sperare.

La Luna negli altr'istrumenti si vidde parimente ora uguale al Sole nel tempo dell'Eclisse, ora poco più picciola, & ora poco più grande; ma ella apparve per lo più maggiore di 10 secondi.

Il Sig. *Chazelles*, il P. de *Laval*, e'l P. *Fouillée* in *Marsiglia*, allorache l'Eclisse era di 6 dita, osservaron il diametro della Luna di 31' 15", quello del Sole di 32' 8". Egli è facile a vedere in tal' adombramento di 6 dita, se 'l diametro della Luna sia uguale a quello del Sole; poicche allora li punti dell'Eclisse devono essere d'anti 120 gradi dalla circonferenza del Sole; siccome nel 9 dito, devono essere, secondo il calcolo 151 gradi, supposta l'istessa uguaglianza.

Il P. *Becatelli* in *Parma* osservò il diametro della Luna più grande di quello del Sole $\frac{12}{1398}$, che fanno 17 secondi.

Il Sig. *Manfredi*, e *Stancari* in *Bologna* in varie parti delle fasi dell'Eclisse, osservaron il diametro della Luna maggiore di quello del Sole di 8, o di 10 secondi, locche s'accorda perfettamente col mio calcolo.

Avvertirono essi, che in quasiche tutte le fasi dalla metà infino al fine il diametro della Luna era un pò più grande di quello, che dal principio infino allà metà era apparso; locche pur si confronta col mio calcolo, essendo loro la Luna più prossima verso il fine, quando si avvicinava più al mezzo giorno, di quello, che non era verso il principio.

I luoghi, che erano intorno a quello, cui toccò di vedere l'Eclisse centrale, nello stesso istante l'osservaron parziale.

Que', che potevan vedere l'Eclisse nel medesimo istante, sono compresi in un recinto formato da raggi, che vengono da ciascun punto della circonferenza del Sole visibile alla Terra, passando per i punti opposti dell'orlo della Luna, prolungati infino a quelle parti della superficie della Terra, che possono incontrare.

L'ampiezza del paese da tal recinto contenuta, priva di una parte de' raggi del Sole, che vergon rotti da qualche porzion della Luna, è in una specie d'ombra, verso il mezzo densa, e verso l'estremità rara. I Moderni la chiamano Penombra.

Alle volte quantità di questi raggi passano, senza incontrar la Terra, come in questo Eclisse è avvenuto nella parte Settentrionale di là dal Polo.

In tal regione detta Penombra era legata dall'orizzonte della Terra apparente al Sole.

Quando ella cade su la circonferenza della Terra; se la linea, che passa per i centri del Sole, e della Luna è perpendicolare alla Terra, la di lei figura è circolare; in altro caso ella è bislunga, & irregolare, per la diversa inclinazione de' raggi, da quali vien formata, alla superficie della Terra; come è avvenuto nel nostro Eclisse, in cui era ella sfigurata, per la parte, che le mancava dal lato di Settentrione.

Questo ricinto è mobile su la superficie della Terra, dipendendo dal movimento del raggio centrale, che nel nostro Eclisse velocemente da Occidente scorreva in Oriente, declinando verso mezzodì; & in questo moto ella si cambia velocemente, secondo che gli ultimi raggi, che sono su la linea del suo movimento, incontrano più, o meno obliquamente la superficie della Terra.

Formasi ancora per tal moto su di detta superficie una figura bislunga, che occupa tutti i luoghi, quali possion vedere l'Eclisse, parte in un'istesso tempo, e parte succettivamente l'un presso l'altro.

L'abblam noi descritta su di una carta Geografica dalle nuove osservazioni corretta, ricercando tanti punti della sua circonferenza, quanti n'abbisognavano; diterminandoli tutti, secondo la loro longitudine, e latitudine.

Ha ella per termine nell'Occidente que'luoghi, che appena an veduto il fin dell'Eclisse, su l'alzar del Sole: Quali appunto sono le parti Orientali dell'America Settentrionale, & un gran tratto del Mare del Nord: Da mezzodì è terminata in que' luoghi, che appena an veduto oscurato l'orlo
Me-

Meridionale del Sole, e questi sono tra le Canarie: e le Isole di Capoverde, a quali sieguono gli Abitatori della metà dell'Africa, e 'l Mar dell'Indie: Da Oriente son que', che an veduto appena cominciar l'Eclisse al tramontar del Sole, come la parte Occidentale di Sumatra, parte de' luoghi tra Metagui, e Malaca, parte del Golfo di Siam, di Camboya, della Concincina, della parte Occidentale della China, e della Tartaria Chinesa: Da Settentrione, sono i luoghi, donde si sarebbe potuto veder l'Eclisse per molto lungo tempo, mentre che 'l Sole scorrea dappresso l'orizzonte dal lato di mezzodì, maggior parte de' quali è nel Mar glaciale. Quindi si avvisa, che tal'Eclisse sia stato veduto da una parte dell'America Settentrionale, da tutta l'Europa, dalla parte Settentrionale dell'Africa, e molti gradi più in là dell'Equinoziale, nel Mar dell'India, e dalla maggior parte dell'Asia.

La refrazione, che i raggi del Sole, e della Luna soffrono, in obliquamente incontrando la superficie dell'aere, fa essi visibili a que' luoghi, che per mezzo de' raggi diretti non li vedrebbero; e' si saran perciò dilatati i termini divisi un poco più; Ma poicche in tali ultimi confini non vi sono Osservatori, che possano di ciò render conto, stimo inutile il determinar tal variazione in detti luoghi particolari con maggior minutezza.

Nelle Zone temperate la refrazione non giugne ad un grado. Noi abbiám calculata quella, che fassi nel Circolo Polare Artico, secondo le osservazioni fatte in Bosnia dal sù Rè di Svezia, e suo' Matematici, comunicate a noi.

Molto più preme il rinvenir i luoghi, che an potuto vedere l'Eclisse Centrale, e que', che an veduta la metà del Sole eclissato, così da mezzo gior-

no, come da Settentrione; Donde potrà stimarsi la grandezza dell'Eclisse, qual'in altri luoghi si sarà scorta.

Difaminando il moto composto della retta linea, che per i centri del Sole, e della Luna passa, e le orme, che descrive su la superficie della Terra col suo movimento, ond' ella fa vedere l'Eclisse centrale; ne abbiain diterminati tanti punti, quanti per descriverla con tutta giustezza abbisognavano.

Abbiain primieramente diffiniti i luoghi, dove tal linea su le prime ha incontrata la Terra, e calcolata la sua longitudine, e latitudine, quali trasportate nelle Carte Geografiche ultime corrette, ricade in un'Isola della Groenlandia. Calcolata di poi la variazione della longitudine, che fa in ciascun grado di variazion di latitudine, e trasportate ancora dette longitudini, e latitudini su l'istessa Carta, abbiaino osservato, che ella sia passata da' lati Settentrionali della Scozia per la parte Meridionale di Danimarca, e per le Settentrionali di Pomerania, tra la Polonia, e la Transilvania, per la picciola Tartaria, per lo Mar Nero, e per l'Armenia, per la Persia, e per lo Regno del Mogol, per l'Indie Orientali, sino a confini del Regno di Siam.

Un tal cammino ha ella fatto con un moto molto ineguale, assai più veloce verso il fine, che verso il principio, per la diversa obliquità, con la quale incontrava ella successivamente diverse parti della Terra. In que' luoghi, che an veduto questo Eclisse totale, si sarà fatta una picciol'ombra della Luna su la Terra, simile a quella, che i Satelliti di Giove fanno nella di lui orbita, quando tra'l Sole, e questo Pianeta passano.

Avrà

Avrà dett'ombra scorsa tutta l'ampiezza del Paese pur ora descritto in due ore , e tre quarti , senza por mente alla refrazione , che avrà potuto accrescere detto tempo di 7, o 8 minuti. Se tal'ombra fusse passata per lo centro dell'orbita della Terra esposta al Sole , l'avrebbe scorsa in tre ore, e due terzi ; tempo quasi , che l'ombra del terzo Satellitè di Giove impiega a trapassare la di lui orbita, quando và per lo centro . Una palla da Cannone non giugne alla velocità , con cui si muove detta ombra su la superficie della Terra.

L'accrescimento del diametro apparente della Luna , per cagion della sua elevazione in quel luogo , dove l'Eclisse è stato centrale, nella più grande altezza (che noi troviamo essere stata di 45 gradi , e 45 minuti) non è stato più di 12 secondi : Egli verso l'orizzonte faceasi lentamente ; e più presto nelle maggiori alture ; quandoche lo scemamento cagionato dal moto verso l'Apogeo , giungeva appena ad un secondo per ora , e con movimento meno ineguale : Ciocche non avrà impedito l'Eclisse di essere totale in que' luoghi , che avevan l'Eclisse centrale vicino al Meridiano.

I luoghi vicini a que' , che eran sotto l'ombra centrale compresi nello spazio dell'Eclittica , anno veduto 'l Sole altrettanto più eclissato , quanto che eran più prossimi a detti luoghi.

Senza la curvatura della superficie della Terra, che ne' moti composti del Sole , e della Luna , riceve i loro raggi con una obliquità variabile , la parte del diametro del Sole eclissato avrebbe avuta la stessa proporzione a un dapresso alla parte del diametro rimasta illuminata nel mezzo dell'Eclisse in ciascun luogo ; che la distanza fra 'l luogo , e 'l termine più prossimo alla Penombra , alla sua distan-

za dal segno dell'ombra. Questa proporzione fu in Parigi, come quali 19 a 5.

La variazione dell'obliquità di questi raggi nel moto composto, ha fatto svariare tal proporzione, donde siamo stati astretti di descrivere tre altre tracce. Una passa per i luoghi, che an veduta la metà Settentrionale del Sole eclissata, e questi sono al Sud dell'Eclisse centrale; un'altra passa per i luoghi, che an veduta la metà Meridionale, e sono al Nord della traccia centrale; Un'altra in fine pe' luoghi al Settentrione, che an veduto l'Eclisse di 5 dita, e mezzo.

Si determinò la longitudine, e la latitudine di tanti luoghi, che si son rincontrati su di tal traccia, quanti erano necessarj, per descriverli nella Carta Geografica.

La traccia meridionale di 6 dita cominciò nell'Oceano fra l'Isola di Terra nova, & Azores, ove levossi 'l Sole metà eclissato; ella passò al Settentrione di queste Isole per mezzo di Portogallo, e di Valenza, al Settentrione di Algieri, & al mezzodì di Tunisi, per mezzo l'Egitto, per la parte Meridionale dell'Arabia, e terminò nell'Oceano di quà delle Maldive.

La Settentrionale traccia di 6 dita cominciò nel Mar glaciale vicino al Polo: Ella passò pe' lati Meridionali di Spitherg, per la Russia, e per la Tartaria.

Quella di 5 dita, e mezzo al Nord occupò una picciola parte di Tartaria. Dal confronto de' luoghi di queste tracce su le Carte divise, può a un dappresso conoscersi la grandezza dell'Eclisse in tutti i luoghi, che l'an potuto vedere con quella esattezza, che le Carte soffrono.

Ci saremmo dal vero molto appartati, se si
fus.

fussero adoperate le Carte comuni, nelle quali la differenza delle longitudini in tal distesa di Paesi, che an veduto l'Eclisse, giugne fino a 40. gradi. L'esattezza della Geografia è ugualmente necessaria, che quella dell'Astronomia, per ditterminar con giustezza le varie apparenze dell'Eclisse per tutta la Terra.

ECLISSE DEL SOLE

Arvenuto nel mattino de' 23. Settembre 1699.

OSSERVATO NELLA TORRE ORIENTALE
DELL' ACCADEMIA,

Su l'altura della Gran Sala.

DEL SIGNOR DE LA HIRE.

* **E** Ssendo stato il Cielo serenissimo, e molto tranquillo in tutta la durata di questo Eclisse, poterono farli le osservazioni con tutta la possibile giustezza. Io mi servj d'un'occhiale di sette piedi, a cui adattai un Micrometro per ditterminar le apparenze. Per avere però più giustamente il principio, e 'l fine di detto Eclisse, mi servj d'altro di 16 piedi.



25 Novembre 1699.

Dita

Dita Eclissate

Tempo

0 principio	8 ^h 14'	59 ^a
0 $\frac{1}{2}$	8 16	54
1 0	8 20	9
1 $\frac{1}{2}$	8 24	0
2 0	8 27	11
2 $\frac{1}{2}$	8 30	25
3 0	8 32	27
3 $\frac{1}{2}$	8 36	0
4 0	8 38	47
4 $\frac{1}{2}$	8 41	45
5 0	8 44	57
5 $\frac{1}{2}$	8 48	36
6 0	8 52	9
6 $\frac{1}{2}$	8 55	43
7 0	8 59	4
7 $\frac{1}{2}$	9 3	1
8 0	9 6	52
8 $\frac{1}{2}$	9 10	53
9 0	9 15	47
9 $\frac{1}{2}$	9 ^h 23'	7 ^a

9^d 39' per la più grande
oscurezza.



Dita

Dita Eclissate

Tempo

9 $\frac{1}{2}$	9 ^h 30' 38"
9 0	9 37 34
8 $\frac{1}{2}$	9 42 20
8 0	9 47 28
7 $\frac{1}{2}$	9 51 8
7 0	
6 $\frac{1}{2}$	9 57 23
6 0	10 1 57
5 $\frac{1}{2}$	10 5 54
5 0	10 10 46
4 $\frac{1}{2}$	10 14 28
4 0	10 17 36
3 $\frac{1}{2}$	10 20 47
3 0	10 24 46
2 $\frac{1}{2}$	10 28 45
2 0	10 32 7
1 $\frac{1}{2}$	10 35 34
1 0	10 39 0
0 $\frac{1}{2}$	10 41 38
0 nel fine	10 44 59

Offervai il diametro del Sole con l'istesso Micrometro, e lo ritrovai 31' 58".

Essendo avvenuto detto Eclisse vicino all'Equinozio, il moto apparente della Luna fu l'orbita del Sole è stato per linea retta.

Bisogna avvertire, che nella più grande oscurità di questo Eclisse, appena rimaneva poco più della quintesima parte dell'orbita del Sole illuminata, e' frattanto il lume di esso era ancor molto grande.

SAG.

S A G G I

SOPRA LE INJEZIONI NOTOMICHE

DEL SIGNOR HOMBERG.

• **D**Esiderano i Notomisti , per introdurre ne' vasi del corpo umano , materie , che scorran facilmente dalla Sciringa nell' estremità de' vasi , e che in essi possan sostenerli , senza romperli: per ordinario e' si servono della cera del Mercurio del Terebinto cotto &c. , quali corpi soddisfano alla prima idea di scorrer bene , ma non hanno consistenza , poichè la Cera, e 'l Terebinto in tempi un pò freddi , molto facilmente frangonsi , e 'l Mercurio per picciole aperture trapela , e va via , a cui se si aggiunga un poco di metallo per ratte- nerlo , divien così grave , che frange i vasi , nè più giova al proposito , almeno per i vasi estremamen- te sottili ; convenendo ancora , che detti vasi siano superficiali , poicche tal materia non può soffrir scarnameuto .

Mi sono io servito altre volte d' una mesco- lanza di alcuni metalli , che con calore molto dol- ce , dal non bruciare i vasi , fondeasi , e che non co- sì facilmente, piegandosi, viene a rompersi: Ho que- sta adoperata particolarmente ne' vasi un pò grossi , quali sono i rami dell'arteria Tracheale ne' polmo- ni ; l'aere però , che in detti vasi rincontrasi , col rarefarsi prontamente al calor del metallo fonduto , impedisce per ordinario il getto di riuscir bene ; poic-

• 28. Nov. 1699,

poicche o gonfia troppo i vasi, e questi crepano, & rispigne il metallo, ovvero lascia scorrere parte del metallo, & urta al rimanente, donde falsi, che i rami del getto non siano uguali, & uniti.

Alle volte mi è ben riuscita, benchè raramente, & ho immaginato, che sia egli addivenuto dalla molta apertura degli estremi vasi, donde ha potuto scappar via l'aere rarefatto; avendo in tal caso fatto l'ufficio di ventose al getto.

Hò creduto riparare a tal inconveniente dell'aere ne' vasi ritenuto, col mantenere questi per lungo tempo gonfi di detto aere; per qual effetto hò appiccato un polmone al capo del Doccio di un Mantice; ma perche l'aere continuamente svaporava pe'l traverso di essi, sono stato costretto di applicare al braccio del mantice, perche lo muovesse per alcun tempo, una machina, che io accavallava 7. o 8. volte per giorno, e questa era una di quelle, che dicono Tornaroli di d'Allegna a molla, quale in luogo dello schidone faceva girare una ruota verticale di un piede di diametro, che avea 6. denti soli, con cui abbassava regolarmente un braccio di una lieva; e l'altro con la punta menava il mantice, quasi per un' ora in ogni volta, che la machina era incavallata.

Pretendeva io primieramente dilatare un poco, & asciugare l'interne pareti de' vasi, affinche il metallo più liberamente potesse corrervi, & indi dilatare un poco l'estremità di essi, perche lasciassero più facilmente uscir l'aere rarefatto per lo getto.

Il fatto non mi riuscì male; ma perche reca infinito scomodo lo star di continuo ad accavallare la machina per 3, o 4 giorni, & il buon effetto non si uguaglia alla pena, che si soffre, io l'abbandonai.

Co-

Costretto di poi a travagliare sù di tal materia, mi venne in pensiero maniera di adattare questi vasi alla Machina Pneumatica, e di farvi entrare il metallo fonduto per la prestion dell'aere di fuori; perciocche recando il più grave imbarazzo, nell'adoperar nostra materia metallica, l'aere contenuto ne' vasi, qualora saran voti, certo è, che la sudetta mistura non si rimarrà per altro ostacolo.

Per ciò fare presi una Campana di vetro, che nella sua sommità avea un collo simile a quel di un fiasco, e nel collo un cocchiere di rame, l'esterior capo di cui è formato ad imbuto, e l'estremità dell'altro capo, che entra nella campana a chiocciola al di dentro; perche vi si possano adattare docci di rame di differenti grossezze, secondo i differenti vasi, a' quali si vuol introdurre il metallo: si fè entrare il capo di uno di detti docci in quel vaso, che si voleva riempire, ligandoli insieme con uno spago; avendo indi posto il cocchiere nel collo della campana, si adattò il picciolo doccia di rame alla chiocciola nel fin di detto cocchiere, che entra nella Campana, donde il vaso rimase sospeso in essa, e sostenuto dalla chiave.

Allora si applicò la Campana alla machina Pneumatica, e dopo di averne votato l'aere, aperto il cocchiere, si versò il metallo fuso nell'altro capo di esso foggiato ad imbuto, il metallo scorre fino all'estremità de' vasi, e senza alcun vano. Si scarnò indi tal getto, e si tenne indi la figura metallica de' vasi, quale pur si conserva, e si maneggia quanto si vuole, senza rompersi.

La composizione di tal metallo, è una mescolanza di parti uguali di piombo, stagno, e bismuto: fonduti insieme, e ben mischiati su 'l fuoco, donde fassi una specie di metallo, che si mantiene
sciolt.

sciolto molto liquido in un calore men forte di quello , che potrebbe far divenir rossa una Carta.

Offervili quì , che 'l cocchiume di rame , e 'l collo della Campana, devono essere tutti due molto caldi , non solamente prima di versarvi il metallo , ma prima ancora di mettere il cocchiume nel Collo ; altrimenti la Campana si romperebbe; come ancora , che nel tempo , che si vota la Campana , bisogna toccare la chiave con un ferro caldo , per mantenerlo nel calore a un da presso uguale a quello del metallo fonduto , affinchè questi non si rappigli nell' imbuto : Egli è ancor bene di fregare il cocchiume nella parte di dentro con la terra d'ombra , per impedire al metallo , che non vi si attacchi : Bisogna ancora ugnere detto cocchiume con cose untuose, poichè in contrario, per molto efatti , che siano , dan luogo all'aere di trappelarvi; e poichè detto cocchiume deve esser molto caldo, bisogna prender cura, che l'untume, qual si suole adoperare , abbia un pò di consistenza, perche non iscorra molto ; e parimente , che non crosci al caldo , poichè così romperà il collo della campana: Io non ho ritrovato migliore dell'olio di lino , ovvero di olive , facendo bollire due parti di essi con una di minio a durezza d' unguento denso , e nero , il quale non così facilmente scorre nel calore, e non iscoppia per la lunga cozione, che ha consumata qualche porzione acquosa , che potea esser nell' olio .

Ho detto, che bisogna riscaldar separatamente il cocchiume , e 'l collo della campana , come cosa molto necessaria ; perciocchè non avendo usata tal diligenza , il collo d'una Campana si rompe , e la campana ancora : E' probabile, che ciò sia avvenuto dall'esserfi il fin dell' imbuto di rame riscaldato.

scaldato prima, donde sendosi accresciuta la di lui ampiezza, & avendo troppo dilatati i pareti del collo, stando il vetro ancor freddo, l'abbia perciò rotto.

Bisogna por mente, che' vasi, ne' quali si vuol far l'operazione, non sian immollati nell'acqua; ovvero, se vi sian stati, bisogna per un' intero giorno sospenderli nella machina Pneumatica, la quale li rasciuga meglio di ogn' altro argomento; poicche altrimenti l'acqua, che si ritrovarebbe ne' vasi, rarefatta dal metallo caldo, recherebbe per lo meno altrettanto ostacolo al getto, quanto l'ac-
re istesso fa, se fuori della machina Pneumatica li operi.

STRANI EFFETTI DELLO SCORBUTO

Avvenuto in Parigi nel 1699.

DEL SIGNOR POUPART.

I Signori Amministratori dell'*Ospedal di Dio* sendosi avveduti dal gran numero de' Malati Scorbutici, che giornalmente capitavano in detta Casa, de' strani accidenti, e delle pericolose conseguenze di tal contagiosa malattia, fecero quest' i trasportare nell'*Ospedale di S. Luipi* a 12. di Marzo, dove molti si trattennero fin al fine del mese d'Agosto dello stesso Anno.

11

28. Nov. 1699.

Il rumore di sì grande malattia erasi già sparso, quando io andai in detto Ospedale, su 'l disegno di farvi le mie osservazioni: Il Signor *Tibault* allora primo Chirurgo del luogo ben volentieri me 'l permise; & io non molto ristetti ad avvedermi, che 'l male avea qualche cosa della crudel peste, da cui gli *Ateniesi* † furono sì infelicamente afflitti.

La malattia di cui imprendo a parlare, era intanto un vero Scorbuto, poicché gl' Infermi, come i Scorbutici ordinari soffrivano dolori nelle Coscie, nelle polpe delle gambe, nel ventre, nello Stomaco, e le membra perdevano il moto, e non già 'l senso: Avevano mal di testa, convulsioni, e sì grandi rodimenti di gengive, che i bambini strappavan le fasce con l'unghie: Il sangue, che n' usciva era acquoso, salito, e corrosivo, e l'alito della bocca insoffribile: Avean macchie dure, e livide nelle gambe, e nelle Coscie, sbocchi frequenti di sangue per lo naso, e per le morici, & una debolezza così grande nelle ginocchia, che faceva loro andare a onda: Questo era comune; vediamo ora qualche avean di particolare.

Quando detti Malati si scommovevano, sentivansi le ossa crocchiare: il Signor M. V. Medico nella *Roccella* ha fatta parola nel suo *Trattato dello Scorbuto* di ciò, confessando di non saperne la vera cagione: Eccola qual' io l'ho ritrovata.

Nell'apertura di tutti i cadaveri, ne' quali questo picciolo rumore sentivasi, io avvisai, che l'Epifisi erano intieramente divisi dalle ossa, quali, in fregandoli l'un contro l'altro, cagionavano tal rumore.

Memor.

P

Fe.

† *Lucret. l. 6.*

Fecimo la sezione di molti Giovani, ne quali parimente sentivasi un picciolo sordo rumore nel respirare; & in questi ritrovammo le cartilagini dello sterno separate dalle ossa delle costole, e poicche le cartilagini sono di una sostanza più molle dell' epifisi, il crocchiare, che 'l fregamento di esse cagionava, era minore di quello, che fregandosi contro l' Epifisi udivasi.

Que', che tal rumore in respirando rendevano, perivan tutti, fuor che un Giovane, le di cui costole si riunirono sensibilmente alle cartilagini; imperciocche dopo la guarigione non più sentivasi tal rumore. Tutti que', ne quali ritrovavasi marcume, o sieri nel petto, avevano le costole divise dalle loro cartilagini, e le parti ossee di queste vicine allo sterno erano intarlate nella lunghezza di quattro dita; donde misurasi l'estrema forza caustica della linfa, di cui tai corpi erano imbevuti.

La maggior parte de' cadaveri aperti aveva le ossa nere, & intarlate.

Molti di questi Malati camminavano vacillando, accidente comune, & ordinario a' scorbutici, conosciuto a' Medici, ma la ragione che reco non già. Egli è certo, che la fermezza degli articoli nasca dalla forza della molla de' ligamenti, che stringon le ossa l' un contro l' altro: Or questi, essendo rosi negli Ammalati, rallentansi le ossa, e si dividono: la rosione avviene, perche negli articoli, invece della dolce oliosa linfa, quale per ordinario si scevera, per render lubrico, e facile il moto, vi si sequestra un'acqua verdognola, e caustica, a segno che rode i ligamenti, e distrugge in conseguenza la forza della loro molla.

Tutti i Giovani sotto a' dieciotto anni avva-

no in parte l' Epifili separate dal corpo dell' ossa, & al minimo sforzo se le divideano intieramente: la ragione si è, perche in quella età l' Epifili non son molto attaccate alle ossa; sicche per poco, che siano imbevute di linfa rodente, che nelle giunture trovasi, non è difficile, che la forza di tali liquori, li stacchi intieramente dalle ossa.

Tutte queste, che si ritrovavan intieramente separate dalla loro Epifili, erano più del doppio grosse dell' ordinarie, poicche distaccavansi l' Epifili da quelle, che erano più imbevute d' un acqua, nella lor sostanza penetrata, la quale esse gonfiava.

Gli ossi de' Convalescenti rimasero pur doppi, senza cagionar loro dolore, saran forse diminuiti col tempo, come avviene a' Figliuoli, annodati, ne' quali a poco a poco le ossa li disseccano, a proporzione, che essi crescono.

Que', che duravan fatica a respirare, avevano il petto ripieno di linfa, o di marciume, quali inondavano spesso i polmoni, più, o meno, secondoche i Malati erano oppressi.

Noi ne osservammo alcuni cotanto affannati, che perirono in un subito; frattanto nel petto non se le ritrovò serosità alcuna, e nè pur ne' polmoni; ma il pericardio era a questi attaccato intieramente, & i polmoni alla pleura, & al Diafragma, e tutte le parti sì fattamente mischiate, e confuse insieme, che formavano una sola massa cotanto intrigata, che a mal pena poteasi distinguere l' una dall' altra.

Ritrovandosi i polmoni compressi nel mezzo di detto ammassamento, non potean più muoversi, Ond' è, che l'Infermo, per mancanza di respiro, dovea soffogarsi. L' attacco, e confusione, che

vedeanfi fra tutte queste parti , addiveniva dall' esser esse ulcerate, donde non potea farli a meno, che non si combaciassero .

Gli ordinarij Scorbutici anno le glandole del Misentero ostrutte, e gonfie; questi aveano il fegato in parte corrotto, con ascessi nella sostanza.

Alcuni avevano il marciume indurito, e quasi impletrato nel fegato: la loro milza era più grossa del naturale tre volte più, che, in trattandola, si faceva in pezzi, come, se fosse composta di sangue rappreso; & alcune volte i Reni, e'l petto eran ripieni di ascessi .

Si ritrovaron Cadaveri, fino all'età di 15. anni, a' quali premendo fra due dita il fin delle costole, che cominciavano a separarsi dalle cartilagini, gemeva indi quantità di umor guasto, qual' era la parte spugnosa dell' osso, in maniera che dopo la premitura, non rimaneva della costola altro, che due picciole lamine ossee .

Abbiamo veduti Ammalati, che altro segno di Scorbuto non avevano, se non se leggieri ulcerazioni alle gengive: Sopravenivano a questi dipoi piccioli tumori rossi, e duri, sù la mano, e sù 'l collo del piede, & in qualche altra parte del corpo, indi grossi Ascessi nell'Inquinaja, e sù l'ascelle, accompagnate da molte macchie pavonazze per tutto 'l corpo, quali erano antecedenti segni sicuri della morte. In questi si videro le glandole delle Ascelle molto grosse, circondate di marciume, così ancora i muscoli delle braccia, e delle coscie fra gl'interstizj loro. Si osservaron parimente altri, che avean le braccia, le gambe, e le coscie, come se fossero bruciate, rosse, annerite; la cagione di questo, era un sangue nero, e rappigliato, che ritrovammo sempre sotto la pelle, .

*Et simul ulceribus, quasi inustis orane
rubere corpus . . .*

Ritrovammo ancora muscoli gonfiati, e duri come legno, per lo fissamento del sangue nel corpo di essi, di cui ne erano alle volte così ripieni, che le gambe rimanevan loro piegate, senza potersi distendere.

Osservammo, che le macchie pavonazze, rosse, gialle, e nere su 'l corpo de' Scorbutici ordinarij, si facevano dal sangue stravasato sotto la pelle, il quale se conservava il proprio color rosso, la macchia era rossa, se egli era nero, e rappigliato, era ella pur nera, e quando con bile mescolavasi; si tingeva ad un nero giallo; sicche a proporzione, che mescolavasi il sangue con altri umori di svariati colori, le macchie apparivano ancora di differenti colori.

Talvolta si osservavano su 'l corpo di questi Infermi, piccioli tumori, che di giorno in giorno divenivan più grossi; vi si applicavano sopra degli unguenti mollitivi; per addolcirli; e' però rodendo aprivansi la via, formando un ulcere, chiamato scorbutico, che addiveniva dal sangue, di cui il tumore era ripieno; perciocche ogni volta, che l'empiaastro toglievasi, si ritrovava di sotto una radunanza ben molta di sangue congelato. Rimettendo l'empiaastro, e di là a non molto rilevandolo, si ritrovava del nuovo sangue rappreso, e replicata più volte questa maniera di trattar detto tumore col solo scemar il sangue, votavasi intieramente il tumore, e l'Infermo guariva.

Ad alcuni Vecchi sopravvenne un sì largo flusso di sangue per lo naso, e per la bocca, che ne perirono, senza poter mai arrestarsi per la linsa, che in detti Ammalati era sì corrosiva, come si è già

detto, che solocchiava le tuniche delle vene : Era ancora altrettanto più difficile a frenarsi , quanto che il sangue de' Vecchi è più fluido , e più acquoso di quello de' Giovani , quali non soffrirono mai tal accidente.

*Sudabant etiam fauces intrinsecus atro
Sanguine ; & ulceribus vocis via capta coi-
bant*

*Aut etiam multus capitis cum saepe dolore
Corruptus sanguis pletis ex naribus ibat.*

I Giovani , & i Vecchi , così Uomini , che Donne , avevano tali soccorrenze , e sì grandi , che i più deboli non potendo reggerle , morivano ; ma i robusti con molta felicità , e prestezza ne guarivano .

*Quorum si quis , ut est , vitarat funera leti :
Visceribus tetris , & nigra proluvie alvi.*

Vi erano degli Ammalati stitichi , che senza qualche ajuto di rimedio , non si scaticavano .

Molti , per tutto 'l corpo avean de' gonfiori , così nelle mani , come nelle braccia , & ne' piedi , che sembravano di essere stati soffiti : Guariron molti di questi , con medicine , lavativi , e giulebbi raddolcenti .

Un Figliuolo di dieci anni avea le gengive molto gonfiate , & ulcerate , & i denti erano rosi nella radice , e cadevano , e l' alito era sì greve , & insoffribile .

Spiritus ore foras tetrum voluebat odorem.

Raucida quo perolent projecta Cadavera risu.

Il Chirurgo fu obbligato a svelle tutti i denti di detto Ammalato , per meglio curare la bocca , quantunque sarebbero essi di per loro caduti : Le gengive guarirono , e sopravvenne all' Ammalato un tumore della grossezza di una nocciuola a lato della
lin.

lingua: Nel mezzo di questo si avvisava una cavità livida, che divenne ulcere, quale rodè la metà del tumore, rimanendo intiera l'altra: Alcun tempo dopo si vidde altro simile sù la guancia d'una straordinaria durezza, e livido nel mezzo, come 'l primo, parimente ulcerato: Morì tal Giovane in un subito, quando che men si credeva, e si offeraron tutte le interiora del suo corpo corrotte.

Tutti i Malati, che perivan di subito, senza che apparente cagione si avvisasse, avevano le orecchie del cuore così grosse, quanto un pugno, ripiene di sangue grumolo, che impediva la circolazione; donde l'inevitabil morte.

Sù le guancie di molti infermi sorgeva un ulcere bianco, intorno duro, a qual tosto arrestare, se non si teneva cura, & svellere con lo spirito di vitriuolo, molto presto allividiva, e con gran puzzo anneriva, rosicchiando detta guancia in maniera, che tutti i denti apparivano.

Abbiain veduti molti Ammalati dall'età di 18. anni fino a 20. con indolenza, smagati, stupidi, e senza moto, con bocca aperta, occhi incavati, guardo spaventevole, sicche facean veduta più di statue, che d'Uomini.

*Atque animi prorsum vires totius, & omnis
Languēbat corpus, leti iam limine in ipso.*

*. . . . Cavati oculi, cava tempora frigida
pellis.*

Duraque: Inhorrebat rictum

Questi tutti altro morbo apparente non avevano, che le gengive ulcerate, osservandosi la di loro pelle senza macchie, senza durezza, e bella; E pur noi rinvennimmo i muscoli di essi cancerenati, inaffiati da un sangue nero, e corrotto, e nel trattarli, si sbriciolavano fra le mani.

Un Uomo avea su'l collo del piede una specie di gavoccio, i labbri, e le ale del naso fendevansi, gemendo lentamente le narici un siero putido: stralcind' egli una moribonda vita per buon tempo, e 'l suo cadavere il paventava sì, che io non osai aprirlo.

Un Giovane, che al di fuori non sembrava aver molto male, subitanamente morì, e noi osservammo il pericardio roso in maniera, che poco di esso rimaneva, e 'l cuore tutto allo 'ntorno molto ulcerato profondamente.

Sogliono i Scorbutici passarla bene più nella State, che nell' Inverno, forse per lo molto svaporamento; ma questi per lo contrario dal mese di Aprile, infino al principio di Giugno stiederò migliori, essendo guarite le macchie, le durezza, e tutto ciò, che lo Scorbuto ha seco, quali ritornaron tutti col caldo più grande. Que', che sentivansi in vigore da poter uscire dall' Ospedale, infermaron di nuovo, divenendo le gambe, e le coscie tutte nere, dando il compimento alle loro miserie spesso la morte. Potea ciò avvenire dalla molta copia della linfa corrosiva, impossibile a votarsi tutta per lo svaporamento; sicche ristagnando in questi, ove ella era dal gran calor riscaldata, fermentava ivi, rendeasi acuta, e corrompevasi; donde l'erosioni, le ulcere, gli ascessi grandi, le corrottele, e gli altri accidenti pur detti, avvenivano.

Tutta questa povera gente divorava sino agli ultimi momenti di lor vita, qual fame canina facevasi da un umor acre, che loro sempre nel ventriglio rinvenivasi, quale risvegliava detto appetito.

Non vi è cosa, che possa corrompere il sangue più

più facilmente , quanto che le lunghe carestie , nelle quali i pessimi alimenti si prendono ; il freddo arresta la circolazione del Sangue nelle parti , ove s'inagria , e corrompe ; la malinconia , l'avvilimento dello spirito , che a tale miserie succede , vince ogni altra cagione ; può misurarsi qual forza insieme tutte unite abbiano , qualora sù di questi mal avventurati si ragunano : Produrranno esse linfe di svariati colori , di cui il ventre , il petto , e molte altre parti del loro corpo si riempino , quale è sì caustica , che dopo di aver intinte le mani ne' Cadaveri , queste intieramente si scorticano , e la faccia si riempie d'ulceri , in maniere che nella notte siam costretti ad alzarci , e lavarla con acqua fresca , per iscemar l'ardore , e l'infiammazione.

Quello , che deve sorprendere in così gran malattia si è , che 'l cervello di questa povera gente è sanissimo , e bello . Ecco debolmente espressi gli effetti di un mal sì crudele , che gli occhi non poterono guardare , senza che 'l cuor si affliggesse ,



RIFLESSIONI

SU DI UNA LETTERA

DEL SIG. FLAMSTEED AL SIG. WALLIS

*Intorno alla Parallaxe Annuale della Stella
Polare.*

DEL SIG. CASSINI FIGLIO.

LE variazioni osservate altre volte nell'altezza della Stella Polare, delle quali si fe' parola nel viaggio di Uranibourg, e nelle Memorie dell' Accademia dell' Anno 1693 a 31 Luglio, avevan dato luogo di esaminare, se addivenissero esse da Parallaxe alcuna, che potesse mai detta Stella avere, riguardo al giro Annuale della Terra, secondo l'ipotesi di Copernico.

Avendo però ritrovato, che alcune osservazioni accordavansi a queste, & altre l'eran contrarie; si è cercato di rinvenir conghietture, e porgerle su la cagione, donde addivenir potessero.

Il Sig. *Flamsteed* in una lettera, che'l Sig. *Wallis* nel 3. Tomo delle sue opere pur or pubblicate, trascrive, pretende per molte osservazioni in diverse Ragioni fatte dall' Anno 1689, sino al 1697, che tal Parallaxe della Stella Polare siavi; donde io mi diliberai ad usarvi diligenza: Et avendo veduto, che dette osservazioni si accordavano con quel-

lo

5 Dicembre 1699.

le fatte nell'Accademia; fummo di avviso a disaminare il Metodo, di cui si serviva, per dedurne la Parallasse.

In brieve restringerò quel ch'è dice nella sua lettera.

Le osservazioni, che egli ha fatte con un'istrumento murale di 7 piedi di raggio, il di cui lembo era di 150 gradi, dan la distanza dalla Stella Polare al Zenit, quando ella è nella parte superiore del suo circolo nel Mese di Luglio, Agosto, e Settembre più picciola di quella, che è nel mese di Novembre, e Dicembre; & allora che si ritrova nella parte inferiore del suo circolo nel Mese di Novembre, Dicembre, e Gennajo più picciola, che nel Mese di Aprile, e Maggio; donde si avvisa, che la Stella Polare è più distante dal Polo nel Mese di Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, e Settembre, che nel Mese di Novembre, Dicembre, e Gennajo: Tra Settembre, e Dicembre ritrova la Parallasse di 25 a 30 secondi, tra Dicembre, & Aprile da 30 a 35., e tra Luglio, e Dicembre, ovvero tra Dicembre, e Maggio, da 35, 40 a 45 secondi.

Da queste osservazioni conchiude, che la maggior variazione della distanza della Stella Polare dal Polo sia da 40 a 45 secondi; in maniera che il diametro del Circolo, che intorno al Polo descrive, nella State sia più grande di quello, che descrive nell'Inverno di un minuto e 20 secondi, ovvero 1' 30"; locche dice egli accordarsi col sistema del moto della Terra, siccome con la figura che è recata, intraprende a provare.

* Sia, dice egli, O il Sole posto nel centro del cerchio della Terra IODR. Sia I luogo della Terra nel mese

* Fig. 28. Tav. 4.

meſe di Giugno, quando il Sole ſi vede nella ſteſſa longitudine, che la Stella Polare; D luogo della Terra nel Dicembre, allorache il Sole è nel punto oppoſto.

Sia S la Stella Polare, a cui ſian tirate le linee SI, SD; ſi vede, dice egli, che l'angolo SIE latitudine della Stella Polare nel Meſe di Giugno, ſia più picciolo dell'angolo SDE latitudine nel Meſe di Dicembre; e per conſeſenza la declinazion ſua è più picciola, e la ſua diſtanza dal Polo più grande nel Meſe di Giugno, che in qualunque altro Meſe dell'Anno.

Per conoſcere, ſe ſi poſſa dedurre tal conſeſenza da queſte oſſervazioni, farà bene di eſaminare quel che riſulta dall'ipoteſi del moto della Terra, riguardo alle Stelle fiſſe, & a' Poli apparenti della Terra, e dell'Eclittica.

* Sia S centro del Sole, IODR l'Eclittica, O l'orbita annuale della Terra, il di cui diametro è ISD, I & D, la Terra in due ſituazioni oppoſte di Cancro, e di Capricorno, TCG, ovvero HKF circolo perpendicolare all'Eclittica, o Coluro de' Solſtizj nel globo della Terra, che paſſa per i Poli A, o B della Terra, il di cui Aſſe è DA in una poſitura, & IB nell'altra.

Il punto G, ovvero F dell'Eclittica, il più proſſimo al Polo Boreale della Terra A, ovvero B rappreſenti il principio di Cancro, & il punto T, ovvero H, che n'è il più diſtante, il principio di Capricorno. Se ſi alzinò ſu'l piano dell'orbe annuale, com'è quel dell'Eclittica, le perpendicolari DCE, SOM, IKL, rappreſentano queſte l'Aſſe dell'Eclittica, e determinano nel Cielo il Polo di queſta E,

sta E, M, L rispetto al Sole posto in S, e della Terra in D, & I. Così parimente se si tiri dal Sole S una linea SP parallela all'Asse della Terra, e che si prolunghino le linee DA, IB, che rappresentino l'Asse del Mondo, queste determinano nel Cielo il Polo del Mondo N, P, Q, rispetto al Sole in S, e della Terra in A, & B; di maniera che supponendo il Sole immobile, l'Asse dell'Eclittica tirato per lo centro della Terra, descriverà con la revolution sua annuale il circolo EL, e l'Asse della Terra descriverà altro circolo NQ, quale nella superficie delle sfere si riduce ad una Curva; Sicche una Stella supposta fissa, come in V si ritroverà per questa revolutione, ora più vicina, ora più lontana dal Polo apparente del Mondo.

* Sia dunque nella superficie della sfera P Polo dell'Eclittica, A quello del Mondo, la linea AP tira a per questi due punti, rappresenterà un'Arco de' Colori del Solstizio di 22 gradi $\frac{1}{2}$. Il circolo BFD rappresenti la revolutione annua del Polo dell'Eclittica, & il circolo CEI, la revolutione annuale del Polo della Terra. La Stella Polare si confronta presentemente a 22 gradi di Gemelli con 8 gradi del principio di Cancro: Avendo dunque fatto l'angolo D¹S di 8 gradi, e tirata la linea PS, la Stella Polare è in questa linea: E' ella parimente distante dal Polo dell'Eclittica 24 gradi; dunque avendo presa PS di 24 gradi sopra la linea ASM, si avrà la Stella Polare in S.

La Terra è in Cancro quando il Sole vien veduto in Capricorno, locche avviene verso il fine di Decembre, e nel principio di Gennajo, & allora ne' circoli descritti nella superficie della sfera per lo

moto

* Tav. 4. Fig. 30.

moto annuale, divisi per segni, i Poli della Terra, e del Zodiaco sono parimente in Cancro. La Terra, & i Poli dell'Eclittica, e dell'Equinoziale sono in Capricorno, quando il Sole è veduto in Cancro, come avviene verso il fin di Giugno, e principio di Luglio; donde siegue, che 'l complimento della latitudine della Stella Polare nel Mese di Giugno rappresentato per SB, sia più grande del complimento della di lei latitudine nel Mese di Dicembre rappresentata per SD, cioè, che la latitudine della Stella Polare sia più picciola nel Mese di Giugno, che nel Mese di Dicembre.

Il Sig. Flamsteed conchiude da ciò, che la declinazione sia più picciola nel Mese di Giugno, che in qualunque altro Mese dell'Anno.

Ma se si ponga mente alla figura, si vedrà, come possa ben'avvenire, che la latitudine sia più picciola in un tempo dell'Anno, che in un'altro, senza che perciò la declinazione siegua l'istessa regola. Supponiamo, per cagion di esempio, che la Terra sia in Ariete, come la è nel Mese di Settembre; allora il Polo apparente dall'Eclittica sarà nell'Ariete nel picciolo circolo BFD, & il Polo del Mondo sarà in Ariete nel suo picciolo CIE. Quando la Terra sarà in Cancro, come la è nel fine di Dicembre, i Poli dell'Eclittica, e del Mondo, saran parimente in Cancro. Tirando dunque dalla Stella Polare S le linee SF, SD, queste rappresentano il complimento di sua latitudine; e tirando dall'istesso punto S le linee SE, SI, rappresenteranno queste il complimento di sua declinazione, e li vede, che SF, complimento della latitudine nel Mese di Settembre, è più grande di SD, complimento della latitudine nel Mese di Dicembre; quantunque SE, complimento della declinazione nel Mese di Settembre

bre, sia più picciola di SI, complimentò della declinazione nel Mese di Dicembre; locche niente si uniforma alla supposizione del Sig. Flamsteed.

Per ritrovar dunque il luogo, ove secondo l'ipotesi del moto della Terra, la Stella Polare debba essere più, o menò distante dal Polo, bisogna tirare da S per lo centro A la linea SOC, che segghi 'l c'rcolo CIE ne' punti O, e C; SC sarà la più gran distanza della Stella Polare dal Polo, & SO la più picciola: E poicche detti punti son prossimi ad Ariete, e Libra; quando la Terra è in Libra, cioè su 'l fin di Marzo, e principio di Aprile, la distanza della Stella Polare dal Polo deve esser la maggiore; & allora che ella è nella parte opposta in Ariete, cioè su 'l fin di Settembre, e principio di Ottobre, detta distanza è più picciola: Locche non si accorda con le osservazioni del Sig. Flamsteed, secondo le quali la Stella Polare è quasi nell'istessa distanza dal Polo, e dal Zenit nel Mese di Aprile, e di Settembre. Non può dunque conchiudersi dalle sue osservazioni la Parallasse Annuale della Stella Polare; poicche richiede ella una differente variazione da quella, che si osserva.



DUE MODELLI
DI RUOTE
DA VOTAR L'ACQUA
DEL SIGNOR BILLETES.
P R I M O.

• **E** Questa una Ruota tutta chiusa per un lato da un circolo di 8. piedi di diametro, fatto da tavole della grossezza di un dito, e mezzo, conficcate sopra di 8. pezzi di legno posti a grate, che nel centro della loro unione lasciano una buca quadrata di 8. dita, nella quale si congegna il capo di un Tronco di ugual grossezza, che girando faccia parimente girar la Ruota. L'altro lato opposto è voto, dal centro fino a quasi 13 dita presso della circonferenza. Questo spazio di 13 dita viene occupato da 14 secchie inchiodate sù le tavole, quali sono a forma di scatole, aventino al di dentro 15 dita di lunghezza, 14 d'altezza, e 11 di larghezza. Per lunghezza s'intende lo spazio, del giro della circonferenza. Per altezza, la perpendicolare elevazione su 'l piano, e per la larghezza lo spazio tra la circonferenza, e 'l centro di esse: La Tavola esteriore è di lungo stremata di qualche dito, lasciando perciò l'apertura, per dar libera l'entrata all'acqua, a misura che ciascun vaso s'immerge; rimanendo li cinque altri lati esattamente chiusi. Quel-

la che cuopre la loro altezza, è di due pezzi, uno immobile, e l'altro è a questo unito con due gangheri, affiuche possa aprirsi, e serrarsi, come gli ordinarij coperchi de' Forzieri. Sù di questo vi è adattato un saliscendi simile a quel delle Porte ordinarie, quale premuto da molla posta su'l medesimo coperchio, s'intrude, o inforca un monachetto di ferro attaccato alla tavola dalla parte del Vaso, che riguarda 'l centro, o 'l vano della Ruota: Et essendo così, l'acqua, che nel vaso è entrata per l'apertura, vi si mantiene, fintantoche 'l saliscendi ritiene il coperchio; ma quando li itacca dal monachetto, il peso di dett' acqua, incontanente fa, che la versi nel Trogolo, che l'è di sotto: Et questi un piede alto, e due largo, cui fermamente un uncino di ferro si adatta sì, che siccome la Ruota gira, egli, l'uncino, aggavigni successivamente tutti i saliscendi de' vali, e forzando la loro molla, li faccia uscire dal monachetto, che tengono i coperchi serrati. Quando poi la Ruota continua a tuffarsi, i coperchi li serrano, sì per lo peso proprio, come per quello dell' acqua, che di fuori li preme, dando con ciò la libertà alla molla, che rispinga i saliscendi su'l monachetto.

SECONDA RUOTA.

Questa è men composta dell'altra, venendo formata da due circoli, che paralleli la comprendono; e fra di essi contengono un numero arbitrarjo di vali da Colombaja chiusi nel fondo, ne' lati, e nel fine, ma aperti tutti nella circonferenza della Ruota. Quello, che ha di più particolare si è il Trogolo curvo, che abbraccia i due piani con una porzion di circolo di quasi 100 gradi, in for-

Memor.

Q.

ma

ma che da basso formonti un poco il raggio orizzontale della Ruota ; e con ciò leva quant' acqua ella vota a certa altezza , dove ha ella un angolo , donde l'acqua si scarica in alcun fosso preparato per ciò .

Il vantaggio della seconda Ruota sopra alla prima, si è, di esser più semplice nella struttura; ha però ella maggiori fregamenti per lo Trogolo, che con molta esattezza deve combaciarsi co' lati , se non si voglia far perdita di molt' acqua . Il fregamento sudetto è molto più considerabile su 'l fine del votamento dell'acqua , la quale essendo molto abbassata , fa , che si debba inchinare la Ruota all' orizzonte; quando la prima non ha nè fregamento, nè perdita d'acqua ; sicche a buon conto ella sembra la migliore . Con tutti due si possono tirare 5000 botti d'acqua per ogni ora.



DELLA RESISTENZA
CHE INCONTRASI
NELLE MACHINE,

*Si per lo fregamento delle parti, che le compongono,
come per l'intirizzimento delle corde, che vi
si adoperano, col modo da calcolare l'uno, e
l'altro.*

DEL SIGNOR AMONTONS.

* **I**L sommo uso, che tutte le arti son costrette di fare delle Machine, è una convincente pruova della precisa loro necessità; e senza affannarmi inutilmente su di tal verità, basta qui dire, che se il nome di Machina è talvolta preso in mal senso, e perciò riesca dispreggevole, altro in parte nol faccia, che le poche regole, quali nella Meccanica abbiamo, non sempre sufficienti a far prevedere sicuramente l'effetto, che le Machine proposte debbano produrre, nel mettersi in opera; donde spesso avviene, che molti, che l'ignorano, riputansi, con ragion diliberati, a non appararle; cadendo perciò in strani affardj. In fatti non vi è, fra tutti gli Autori, che anno scritto delle forze moventi, un forse, che abbia avvertito bastantemente su gli effetti de' fregamenti delle Machine, e sopra la resistenza cagionata dall' intirizzimento delle funi, e che ce n' abbia date regole, per conoscer l'u-

Q 2

no,

* 19. Dec. 1699.

no, e l'altro, e calcularli; abbenche tal conoscenza non sia men necessaria, per ben giudicare dell'effetto di una Machina, di quella delle differenti ragioni delle parti, che la compengono; essendo pur troppo vero, che 'l difetto di tal cognizione sia sempre nelle Machine uno scoglio altrettanto più da temersi; quanto che sinora non ben si sà la di lui grandezza.

Che serve, per cagion di esempio, il sapere, secondo i principj della *Mecanica*, che per tirare la Trave AB, secondo la direzione del piano inclinato CD, vi bisogni una potenza capace a superare la trentesima parte del peso di detta Trave, quando il seno retto dell' angolo dell' inclinazione di detto piano è la trentesima parte del seno tutto: Se allo 'ncontro s'ignori, che la resistenza, cagionata dal fregamento di detta Trave contro la Terra, possa essere non solamente uguale a detta potenza, ma in considerabilissimo numero di volte vincerla: Egli è certo per molte costantissime sperienze, che se 'l peso di detta Trave sia per cagion di esempio di 3000 libbre, bisognerà una potenza capace a vincere non solamente 100 libbre, come per lo semplice calcolo *Mecanico* sufficiente appariva; ma proprio a superare 2250 libbre, che s'aria molto nel conto, per altro verissimo; avendo dimostrata la sperienza, che la resistenza dal fregamento del legno contro della Terra cagionata, sia circa il $\frac{3}{4}$ della forza, da cui è premuta, come per altre sperienze, che si addurranno appresso: è considerabilissimo ancora la resistenza, che l'intirizzimento delle corde produce.

Egli è dunque necessario, se si voglia evitare, di formar giudizio men retto sull'effetto, di una
Ma-

Machina, ad attentatamente avvertire non solamente alle differenti ragioni, che le parti della machina, quali comunicano il moto une alle altre, anno; ma ancora alla resistenza cagionata dal fregamento di dette parti, e dalla rigidezza delle funi, qualor vi s'impiegano; ma poicche questa cognizione dipende da altre molte cagioni Fisiche, gli effetti delle quali non si possono ben diterminare, senza la sperienza; ecco quelle, che sù di tal soggetto ho fatte, e le regole, che se ne posson dedurre.

E S P E R I E N Z A.

Del fregamento di diverse materie une contro l'altre.

* Sù de' piani AA posì del rame, del ferro, del piombo, del legno, immastriciati con grasso vecchio, e sù di altri piani BB simiglianti materie di svariate grandezze; premel l'une sù l'altre con molla simile alla rappresentata quì per CCC, la quantità della di cui pressione era nota: Cambiai questi piani in tutte le possibili maniere; ora mettendo que' del ferro sopra di que' del rame, del piombo, e del legno; & ora questi ultimi sopra que' del ferro, e per ogni volta con una statera a molla D avvertj alla quantità della forza necessaria per muoverli; & ho ritrovato.

1. Che la resistenza cagionata dal fregamento si accresca, e diminuisca a proporzione delle pressioni più, o meno grandi, secondo che le parti, che fregano anno maggiore, o minore estensione.

2. Che la resistenza prodotta dal fregamento, a un da presso sia l'istessa nel ferro, nel rame, nel piombo,

Q 3

nel

Fig. 22. Tav. 4.

246 *Memoria dell' Accademia Reale*
nel legno, in qualunque maniera si varino, quando
dette materie sono inmastriciate con untume vec-
chio.

3. *Che detta resistenza è quasi uguale al terzo*
della pressione: A queste osservazioni conviene anco-
ra aggiungere la quarta, che dette resistenze sono
tra di loro in ragion composta de' pesi, ovvero pres-
sione delle parti, che s'ingansi, de' tempi, e delle
velocità del loro moto.

* Perciocchè se, per cagion di esempio, il pia-
no A, vien premuto sù 'l piano orizzontale BBBB
da una quantità uguale a 20 libbre; secondo la ter-
za osservazione, vi bisognerà una potenza uguale
a 10 libbre per muoverlo, o che detto piano sia mol-
so, secondo alcuna qualunque linea retta, come
AD, ovvero secondo una linea circolare, come
AE; perciocchè può supponersi detto piano A, co-
sì picciolo, che la determinazione intorno al cen-
tro C, non produca effetto, che sensibilmente dif-
ferisca da quello, che produrrebbe secondo la di-
terminazione della linea retta: Or egli è chiaro,
che se in vece di applicare la potenza in A, o in
qualunque parte del raggio CA, si applichi in F,
ovvero in altra parte del raggio FC in ugual di-
stanza dal punto C, con quella parte, dove detta
potenza avrebbe dovuta essere applicata sù 'l raggio
AC; questo non farà variar la cosa, e 'l piano sa-
rà sempre mosso ugualmente, o che la potenza sia
applicata verso A, o verso F, purché sia ciò in
ugual distanza da detti punti, o dal centro C; ma
perchè vien dimostrato nelle Meccaniche, che due
forze operino ugualmente, quando son tra loro
in ragion reciproca della lor distanza dal centro, o
sostegno; ne siegue, che se la potenza applicata in
A, qua-

* Fig. 33. Tav. 4.

A, quale si uguaglia alla resistenza prodotta dal fregamento del piano A, sia di 10 libbre, ella dovrà essere di 20 libbre per uguagliarsi a quest' istessa resistenza, quando detta potenza sarà applicata in G, di maniera che GC sia ad AC, come 1 a 2: Al contrario supponendo la resistenza in G, e la potenza in A, questa dovrà essere di 5 libbre per uguagliarsi a detta resistenza; e se tanto in A, quanto in G si supponga una pressione uguale a quella del piano A, la potenza, che sarà applicata in A, ovvero in F, dovrà essere di 15 libbre, per uguagliarsi a queste due resistenze prodotte da due pressioni, ciascuna di 20 libbre; donde si conosce, che tali resistenze sono fra di esse, quando le pressioni sono uguali, in ragione de' spazj scorsi in un istesso tempo; e che per conseguenza sono ancora tra di esse in ragione inversa de' tempi de' loro moti, quando i spazj trascorsi sono uguali; e quindi nasce, che se un piano sia doppiamente premuto, e scorra uno spazio doppio nella metà meno di tempo, che un'altro piano; lo sfregamento del primo sarà uguale 8 volte a quello dell'ultimo.

Con tal raziocinio, secondo i principj anzi detti, veniamo in cognizione, che l' fregamento nello strascino, cagioni una resistenza per lo meno uguale al terzo del peso dello strascino, e della somma, di cui vien caricato; e che nella Carretta tal resistenza sia minore, secondo la ragione della circonferenza della Ruota, alla circonferenza della buca del mozzo, che riceve l' Asse; e che se tal ragione sia come 18 ad 1, la resistenza prodotta dal fregamento è nella Carretta uguale a $\frac{1}{18}$ parte del peso del Corpo della Carretta, e della somma, dond'è caricata.

Infine per questi principj ancora sappiamo perche in tutte le le Machine , & in tutte le sime , che orizzontalmente si muovono sopra di un Perno , lo sfregamento sia appena considerabile , come quello delle bilancie , per molto greve , che sia la soma; perciocche la ragion della grossezza della parte del Perno , che frega , alla lunghezza della lieva , donde opera la potenza , è sì picciola , che quasi è insensibile .

Abbenche tutte le poc' anzi riferite sperienze, sembrano di bastantemente provare, che la resistenza prodotta dallo sfregamento della superficie sia maggiore, o minore, secondo le pressioni maggiori, o minori, e non già secondo le maggiori, o minori estensioni di detta superficie; Poicche ciò non sempre basta per convincere uno spirito ragionevole; Egli è ancor bene di rassodar questa verità col dimostrarla .

Se noi dunque attentamente meditiamo sù la natura del fregamento, ritroveremo , che non sia altra cosa , se non se *l'azione per la quale un Corpo premuto contro di an' altro , vien mosso sù la superficie di quel ch'è tocca*; E poicche le superfici, che fregansi l'una contro l'altra, non possono in altra guisa esser considerate, che, o come ruvide, & inequali, o come perfettamente unite; e che egli sia impossibile nel primo caso, che dette ineguaglianze non siano parti convesse, e parti Conca-ve, sicche le prime entrando nelle seconde, producano una certa resistenza, nel volerle muovere, bisognando loro per ciò rilevare quel peso, che strigne l'una contro l'altra, quale è l'azione di tali ineguaglianze; altrimenti l'effetto, che essi possono produrre, sarà l'istesso, che quello de' piani inchinati, de' quali si fa uso, per rilevare le sime;
Quin,

Quindi nasce, che quanto più la pressione è grande, più è considerabile la resistenza nel moto: Aggiungi allo 'ncontro, (come nel caso presente deve supponersi), che la pressione sia ugualmente distribuita in tutta l'estensione delle superficie; ne nasce ancora, che molte superficie di differenti estensioni premute da pesi uguali, ciascuna delle parti, che compongono le grandi, è premuta meno di ciascuna delle parti dell'istessa estensione, che compongono le piccole, e tutto ciò, secondo la ragione, che an tra loro tali superficie: Che perciò, se una, per cagion di esempio, di un piede quadrato, ovvero di 144 dita quadrate sia caricata di un peso di 144 l., ogni dito quadrato sarà caricato di una l., quandoche questo stesso peso di 144 l., venendo sostenuto da una superficie di un solo quarto di piede, ovvero di 36 dita quadrate, ciascun dito quadrato sosterrà 4 l.; E poicché è l'istesso il rilevare in una certa altezza per un tempo determinato 36 volte 4 l., e l'alzare in un istesso tempo 144 l. alla medesima altezza: quindi ancor viene, che la resistenza cagionata dal fregamento di superficie di estensioni differenti, sia sempre l'istessa, quando ella è premuta da pesi uguali, o (che è lo stesso) quando le pressioni sono uguali; e poicché, qualora le pressioni sono ineguali, le forze, che bisognano, per alzar differenti pesi in una medesima altezza in certo tempo, sono fra di loro come questi pesi, o queste pressioni; ne si segue parimente, che le resistenze prodotte da differenti pressioni, sono fra di loro come questi. Locche &c.

PRIMA OSSERVAZIONE.

* Questa dimostrazione sussiste sempre , o che le ineguaglianze vengano supposte dure , o capaci di molla ; poicche la potenza , che supera la rigidità di una molla , e che la farebbe muovere , per cagion di esempio da A in B, non differisce punto da quella , che rilevarebbe in uguale altezza un peso uguale alla forza di tal molla.

SECONDA OSSERVAZIONE.

Che se supponansi le superficie , che si fregano , essere senza alcuna ineguaglianza , e che si considerino come piani puramente Matematici ; si ritroverà pur detta proposizion vera ; poicche per facile , che sia il moto laterale de' corpi gravi , che non si discostino dal centro della Terra , le leggi del moto n'insegnano , che quanto è maggiore il peso di detti corpi , altrettanto è la resistenza nel muoverli : aggiungi , che non è egli assolutamente vero , che due piani matematici possono l'uno sù l'altro esser molli , in qualunque situazione si pongano , senza che uno de' due , più , o meno si allontani dal centro della Terra , secondo la situazione di detti piani ; e che quanto più i pesi , donde vengon gravati , son grandi , più ancora deve esser la forza per ismuoverli ; -locche non ricerca dimostrazione.

TER.

* *Tav. 4. Fig. 34.*

TERZA OSSERVAZIONE.

Quantunque abbia io dimostrato , che la resistenza de' fregamenti si accresca secondo la pressione , e non già secondo l'estensione delle superficie, che si fregano; un particolarissimo caso però, sù di cui, se non si faccia bastante attenzione, sembra che li sia contrario. Siano tanti piani, quanti se ne vorranno , come * AAAA premuti fra gli altri come BBBB dal peso C preso a piacere. Se li piani AAAA possino esser tirati tutti insieme da una stessa potenza D, senza che i piani BBBB possano in altra guisa smuoversi , che per comunicar la pressione del peso C a tutti i piani AA, & BB; supponendo altronde tutti detti piani senza alcun peso , e conosciuta la resistenza cagionata dal fregamento di uno de' piani A , contro un' altro de' piani B per la pressione del peso C ; la potenza in D , che vincerà la resistenza del fregamento di tutti detti piani , sarà al peso C , moltiplicato dal numero di tutti i piani AA , BB , men uno ; come la resistenza nel fregamento de' due piani A , & B , dal peso C premuti , è all' istesso peso C: E se la resistenza particolare del fregamento di due di detti piani , sia per cagion di esempio , come 1 ad 1 , e che 'l numero de' piani sia 11 , la potenza in D dovrà superare il peso C per 10 volte ; donde nasce , che picciolissima pressione può cagionare una resistenza maggiore , e maggiore fino all' infinito , accrescendo il numero de' piani , che l'uno sù l'altro si fregano. Locche a prima veduta sente del Paradosso , quantunque facilmente conoscesi la verità , considerando,

* Tav. 4. Fig. 25.

do, che per superar la resistenza particolare del fregamento di due piani, come A, e B, bisogna, che la potenza, qual ti ra un di essi, faccia sollevare il peso C in certo grado, e converrà ancora, che la potenza, quale dovrà molto maggior numero di detti piani muovere, rialzi detto peso in un grado doppio, triplo, quadruplo, secondo che 'l numero delle superficie fregantisi, sarà doppio, triplo, quadruplo, dovendo dette potenze esser tra di loro come le altezze, dove rialzano il peso. Or poicche è l'istesso, rilevare un certo peso ad una altezza doppia, tripla, quadrupla di un'altra altezza, e 'l rialzare il doppio, il triplo, il quadruplo di detto peso a tale altezza nelli stessi tempi; nasce quindi, che la grande elevazione del peso C nel presente caso tien quì luogo, di peso; e perciò egli è sempre vero, che la resistenza del fregamento varja a proporzione delle pressioni più, o meno grandi, e non già secondò l'estenzion delle superficie, che si fregano.

Può tutto quel, che si è avvisato intorno alla somma resistenza, che sperimentasi, qualora varj piani son tra loro intrigati, benchè premuti da picciolissimo peso, può, dico, maravigliosamente giovare, ad ispiegar la cagione della durezza de'corpi, che diconsi duri; e quella allo 'ncontro della fluidità, o liquidezza di que', che chiamansi fluidi, o liquidi; Ma di questo altrove.

Dopo di aver bastantemente stabilito cosa sia fregamento sua natura, e sue leggi, non rimane altro, che diffinire alcune regole, per le quali possa ridursi a calcolo, da conoscerne la quantità nelle Machine più composte.

REGOLA PRIMA.

Nelle Machine , dove molti fregamenti sono; con ordine , devono esaminarsi gli uni appresso gli altri , cominciando da più vicini alla forza motrice , comparandoli con essa , & indi tutti gli altri con detta prima forza , per conoscerne il valore di ciascheduno in particolare .

Quest'ordine è altrettanto più naturale , quanto che esse son le parti le più vicine alla forza motrice , che tramandano il moto alle altre : Giacchè non vi è affatto fregamento , come si è dimostrato, dove non vi è moto .

REGOLA SECONDA.

Potrà tenersi il valore del primo fregamento d'una Machina , comparando lo spazio scorso dalla parte , che frega , con lo spazio scorso dalla forza motrice in un istesso tempo, prendendo ne' $\frac{1}{3}$ della forza movente la convenevol parte proporzionale .

Facilmente potrà comprendersi la ragion di ciò , se si avverta , che nella sperienza pocanzi rapportata de' fregamenti , la potenza era immediatamente adattata alla parte , che cagionava il fregamento , e che gli spazj da detta parte scorsi , e dalla potenza nel medesimo tempo , erano in conseguenza uguali , e che nel calcolo del fregamento necessariamente debbasi aver mira a tal circostanza , essendo chiarissimo , che se lo spazio scorso dalla parte , che si frega , sia , per cagion d'esempio , la metà di quello , che sarà corso dalla potenza nell' istesso tempo , il fregamento sarà ancora la metà di quello che sarebbe stato , se avesse scorso lo spa-

spazio uguale, per l'assioma, che gli effetti son proporzionali alle cagioni, che li producono; e che perciò un fregamento per uno spazio metà meno di un'altro in tempi uguali, sia un'effetto metà meno dell'altro; locche si è dimostrato in altra maniera in conseguenza della quarta massima dell'esperienza sudetta: Ma per la terza massima, il fregamento delle parti è uguale al terzo della loro pressione, la quale nella parte d'una Machina più vicina alla forza motrice essendo sempre doppia di tal forza, perciocche la resistente fa un simile sforzo, che la Motrice su di detta parte; ne siegue, che il primo fregamento della Machina sia sempre uguale a due terzi di tal forza motrice, qual ora lo spazio scorso da questa è uguale allo spazio scorso dalla parte, che frega in tempi uguali, e che tal fregamento è minore de' due terzi di tal forza, a proporzione che 'l primo spazio è minore del secondo, & al roverscio; e questo secondo la ragione de' spazj scorsi dall'uno, e dall'altro in tempi uguali.

REGOLA TERZA.

Potrà conoscerfi 'l valore della forza motrice; quando non sarà data altra, che quella sola della resistenza, calcolando, e comparando, secondo i principj della Meccanica lo spazio, che detta forza motrice deve correre, secondo la disposizione della Machina, con lo spazio, che 'l peso, o la forza resistente deve camminare nello stesso tempo: su di che si avverta, che quando la forza resistente, o la motrice è un peso, lo spazio, che devono scorrere, si misura sempre con una linea a piombo; quandocche se siano altre potenze, detto spa-

spazio si misura secondo la ditterminazione del moto di dette potenze.

REGOLA QUARTA.

Il valor totale de' fregamenti di una machina si avrà, dopo di aver comparato ciascun fregamento col primo, e più prossimo alla forza motrice; aggiungendo in una somma tutti i particolar fregamenti; senza però far altro, che arrogiare alla forza motrice una quantità uguale a detto valore, che sia bastante, a superar la forza resistente; perciocche tal aggiunzione alla forza motrice, produce un nuovo fregamento, di cui bisogna trovare il valore, & indi ancora dell'accrescimento di questo, e così di mano in mano, fin attanto, che tal quantità di fregamento proveniente dall' accrescimento, che farsi in ogni volta alla potenza, sia sì picciolo, che non se ne debba più aver cura: Per cagion d' esempio, se la forza resistente fosse 100, la motrice 64, il valor totale de' fregamenti 16, questa addizione produrrebbe ancora un nuovo fregamento, il valor del quale farebbe 4, e di più questo quì un' altro, il di cui valore farebbe 1; in maniera che, per superare la forza resistente, e tutti i fregamenti della Machina, la motrice dovrebbe essere uguale a $64 + 16 + 4 + 1$, cioè uguale ad 85, e più.



S P E R I E N Z A

Dell' intirizzamento delle Corde .

* **H** O appiccate ad alcuna cosa fissa , come ad una soffitta di una Camera , l' estremità AA di due funi AC , AC , l' una dall' altra distante 5 , ò 6 dita , che con l' altre estremità libere di sotto sostenevano il guscio D d'una bilancia .

A dette Corde ho attaccato un cilindro di legno BB , col fare per un istesso verso una rivolta a ciascun Capo del cilindro nella maniera rappresentata , *Fig. 36* . Ho posto in D un molto considerabil peso ; & attortigliata verso il mezzo del Cilindro con contrario avvolgimento a qualche la corda AE FG faceva , cioè per lo verso EGF , una fettuccia di filo molto pieghevole , all' estremità della quale era un' altro picciolo guscio di bilancia , che pendeva liberamente in H , nella quale mettevo pesi bastanti , per far calare il Cilindro BB , non ostante la resistenza cagionata dall' intirizzamento delle funi AC , AC .

Tali esperienze ho fatte con cilindri , e corde di differenti grossezze , aggravati con differenti pesi ; e dopo di aver ridotta l'azione del peso H ad una distanza uguale al punto del toccamento E in tutti i Cilindri ; avendo riguardo al peso di ciascun Cilindro , e delli gusci H , e D ; ho ritrovato , che a mezzo dito di distanza dal punto E , 45 oncie vincevano la resistenza di due corde , ciascuna di tre linee di diametro , caricata d'un peso di 20 l. , e rav-

* *Fig. 36. Tav. 42*

ravvolte intorno ad un Cilintro di mezzo dito; che 90. oncie superavano detta resistenza, essendo il peso di 40 l., &c

135 oncie essendo il peso di 60 l.

Donde siegue, che la resistenza cagionata da intirizzimento delle corde, intorno d'una istessa, o in uguale girella, crescano a proporzione de' pesi, che pendono al fin delle corde.

Continuando l'esperienza, ho ritrovato, che sempre nel mezzo dito dal punto E

30 oncie vincevano la resistenza di due funi, ciascuna di due linee di diametro, caricate intorno all'istesso Cilintro.

15 oncie superavano la resistenza di due corde d'una linea di diametro caricate similmente in D con peso di 20 l., e ravvolte intorno allo stesso Cilintro.

Donde nasce, che la resistenza cagionata dalla rigidezza delle corde, cresca non solamente a proporzione de' pesi pendenti nell'estremità delle corde; ma a proporzione ancora della grossezza delle corde, e che perciò su di girelle uguali, dette resistenze sono fra di esse in ragion composta de' pesi, e delle grossezze delle corde.

Devesi avvertire, che la resistenza, che dalla grossezza delle corde viene, debba risponderli a che tal grossezza dilunghi, o avvicini l'azion de' pesi al punto d'appoggio, e non già alla maggiore, o minor quantità di materia, che contiene; perciocche se questo fusse, crescerebbero le resistenze, o mancherebbero, secondo i quadrati de' diametri.

Continuando l'esperienza, ho avvisato, che sempre a mezzo dito dal punto E.

90 oncie superavano la resistenza di due corde di tre linee di diametro, aventi in D un

R

peso

peso di 60 l. , e ravvolte intorno ad un Cilindro di un dito e mezzo di diametro; che

114 oncie vincevano detta resistenza con l'istesso peso, e corde ravvolte intorno ad un Cilindro di un dito di diametro, e

135 oncie le corde ravvolte intorno ad un Cilindro di mezzo dito di diametro.

Donde siegue, che la resistenza dell'intirizzimento delle corde di ugual grossezza, aggravate da pesi uguali, cresca a misura, che 'l diametro delle girelle, intorno alle quali si adattano, diminuisce, ma non secondo l'istessa proporzione; poicche nel presente caso, quantunque i diametri delle girelle siano fra di loro come i numeri 1, 2, 3, le resistenze frattanto aumentano secondo i numeri 90, 114, e 135; quando che avrebbero dovuto crescere, secondo i numeri 90, 180, 270; se avessero dovuto seguire la proporzione delle girelle.

Il di più dell'esperienza vedrassi nella Tavola che siegue



Pesi attaccati alle due corde.	Resistenza delle corde intorno ad un Cilindro di mezzo dito di diametro.	Resistenza delle corde intorno ad un Cilindro di un dito di diametro.	Resistenza delle corde intorno ad un Cilindro di mezzo dito di diametro.	Grossezze delle corde.
--------------------------------	--	---	--	------------------------

60 libbre	135 oncie	114 oncie	90 oncie	3 linee
	90 . . .	76 . . .	60 . . .	2
	45 . . .	38 . . .	30 . . .	1
40 libbre	90 . . .	76 . . .	60 . . .	3
	60 . . .	50 $\frac{1}{2}$. . .	40 . . .	2
	30 . . .	25 $\frac{1}{2}$. . .	20 . . .	1
20 libbre	45 . . .	38 . . .	30 . . .	3
	30 . . .	25 $\frac{1}{2}$. . .	20 . . .	2
	15 . . .	12 $\frac{1}{2}$. . .	10 . . .	1

Per ben determinare la proporzione della resistenza, dall'intirizzimento delle corde prodotta di grossezza uguale, aggravate da pesi uguali intorno a girelle di ugual grossezza, si richiederebbe maggior numero di sperienze di quelle, che io qui reco; ma intanto, che queste si facciano, per ritrovar tali resistenze, come ancora per ritrovar tutte le altre, di cui pocanzi ho fatta parola, potranno adoperarsi le regole seguenti.

Regole per lo calcolo dell'intirizzimento delle funi nelle Machine.

Nella difamina, e nel paragone, che si farà della resistenza, dall'intirizzimento delle corde d'una machina cagionata, si terrà l'istesso ordine

R a

con

con quello de' fregamenti, servendosi della prima, terza, e quarta regola, poc'anzi dette a lor proposito, quali convengono ugualmente all'una, & all'altra; tralasciando di quì ripeterle: Per avere però la prima resistenza di tal'indirizzimento, si dividerà la forza movente per 10, e si moltiplicherà il quoziente per la quantità delle linee del diametro della corda; indi si prenderanno li $\frac{3}{4}$ del prodotto, se'l diametro della girella sarà di sole 6 linee; e $\frac{2}{3}$ se ne avrà 12; e $\frac{1}{2}$ se ne avrà 18, e più: si dividerà quest'ultimo prodotto per quella quantità di dita, che'l diametro della girella contiene, & il quoziente della divisione darà quel che si cerca: La ragion di questo è, che la resistenza cagionata dalla rigidità delle corde, crescendo secondo la ragione de' pesi, donde son carichi, e secondo i diametri delle corde per l'esperienza di sopra, il peso pendente nell'estremità di una corda di una linea di diametro essendo di 10 l., quando la resistenza è di 7 oncie e mezza, sopra di un Cilindro di mezzo dito; di 6 oncie, & $\frac{1}{2}$ sopra un Cilindro di un dito; e solamente di 5 oncie sopra un Cilindro d'un dito e mezzo, e più; ne siegue, che dividendo per detto peso di 10 l. il peso uguale alla forza movente, si tien la ragione di detto peso al peso dell'esperienza, e la ragione ancora composta di detti pesi, e delle grossezze delle corde, moltiplicando il quoziente per lo numero delle linee, che'l diametro della corda contiene, in maniera che il prodotto di tal moltiplicazione esprima l'accrescimento della resistenza dell'indirizzimento delle corde, che anno più di una linea di diametro, e che son caricate di più di 10 l.: Ma poicche secondo l'esperienza sudetta, questa resistenza è di 7. onc. e mezza su di una girella di mezzo dito, di 6. onc. su di una girella di

un

un dito, e di sole 5 oncie, su di quella di un dito o mezzo, e più; ne viene, che secondo il diametro della girella, non occorre altro, che moltiplicar l'una, o l'altra di dette quantità per questo prodotto, ovvero, che è lo stesso, prendere, o le $\frac{1}{12}$, ovvero le $\frac{1}{12}$, o pure le $\frac{1}{2}$ per aver la quantità di tal resistenza: Ma perchè in questa esperienza, la distanza dell'azione di tal resistenza dal punto d'appoggio, ovvero la lunghezza della lieva, per cui ella resiste, è di mezzo dito; conviene avere ancora riguardo a quello della girella, che se 'l di lui raggio, o lieva sia più di mezzo dito, cioè se la girella abbia più di un dito di diametro, dividere ancora l'ultimo prodotto, per lo numero di mezzo dito, lunghezza del semidiametro; ovvero (che è lo stesso) per lo numero d'un dito, cioè di tutto'l diametro.

Che se la divisione del peso uguale alla forza motrice per 10 l., (qual'è il peso minore, siccome una linea è la minor grossezza della corda nell'esperienza, che serve per fondamento a tal calcolo) nella moltiplicazione del quoziente per le linee del diametro della corda, avesse luogo, perciocchè l'uno, e l'altro, o un de' due solamente puol'esser minore; non occorrerebbe altro, che prender la parte proporzionale della minor resistenza, che si osserva nella Tavola di detta esperienza: Per cagion d'esempio, se si volesse sapere la resistenza, che una corda di una linea di diametro faccia, caricata solamente del terzo di 10 l., converrebbe prendere il terzo, o di 7 onc. e mezza, se 'l diametro della girella fusse di $\frac{1}{2}$ dito, ovvero il terzo di 6 oncie, e $\frac{1}{2}$, se detto diametro fusse di un dito, o 'l terzo solamente di 5. onc., se quello fusse di 1 dito e $\frac{1}{2}$ e più, avendo in oltre ancora riguardo al diametro della girella, cioè dividendo parimente il quoziente per

lo numero delle dita , che 'l diametro della girella contiene , intorno alla quale si adatta la corda ; e se 'l peso non solamente fusse minore di 10. l. , ma che la corda ancora avesse men di una linea di diametro ; bisognerebbe , dopò di aver presa la parte proporzionale del peso , come qui sopra , senza por mira alla diminuzion della corda , prendere ancora dal quoziente una parte proporzionale per la diminuzion di detta corda ; per cagion di esempio , se la fune caricata di sole 3 l. e $\frac{1}{2}$ fusse della grossezza di mezza linea , dopo di aver preso il terzo , o di 7. onc. e $\frac{1}{2}$, o di 6 onc. e $\frac{1}{2}$, o di 5. onc. come sopra , converrebbe ancora prendere la metà dell'una , o dell'altra di dette quantità , e dividerla per lo numero delle dita , che 'l diametro della girella contiene , per avere la resistenza cagionata dalla rigidezza di detta corda intorno ad essa.

Per render facile il calcolo della resistenza delle corde delle machine , si è formata la seguente Tavola , nella quale si ritroveranno tali resistenze in tutte sorti di grossezze di funi , da una linea sino a 30 linee di grossezza , caricate di tutte sorti di pesi da una l. , sino a 10000 l.



T A V O L A

DELLA RESISTENZA CAGIONATA NELLE MACHINE

Dall'intirizzimento delle corde, che si adoperano, di qualunque grossezza elle siano, da 1 linea fino a 30. di diametro, e da qualunque peso sian aggravate da 1 l. fino a 100000; purchè dette corde si avvolgano intorno a girelle, che abbian per lo meno 18 linee di diametro, e più, e che vi sia sempre una parte della corda, che si dirizzi, mentre che l'altra s'incurva.

DEL SIG. AMONTONS

USO DELLA SEGUENTE TAVOLA.

Ricercate nel margine di detta Tavola il diametro, ovvero grossezza della fune espresso in linee, e nell'alto della Tavola i pesi sostenuti da detta corda; riducete in una somma que' numeri, che voi ritroverete sotto di ciascun peso nelle celle, che corrispondono a quelle del diametro della corda, e dividerela per la quantità delle dita, che 'l diametro della girella contiene; nel quoziente di detta divisione, rinverrete la resistenza prodotta dalla rigidezza di detta corda.

E S E M P I O.

Si cerca la resistenza della rigidezza della corda

R 4

da

264 *Memoria dell'Accademia Reale*

da di 18 linee di diametro, caricata d'un peso di 12393 l., che passa intorno a girella di due dita di diametro.

Per 10000. l. si ritroverà nella Celletta al di sotto, che corrisponda a quella di 18 linee.

		5625	
Per 2000		1125	
Per 300		168	12
Per 90		50	10
Per 3		1	11

Aggiunte tutte queste somme insieme fanno 6971 l. Quali divise per due dita di diametro della girella, donano 3485 l. 8 onc. e $\frac{1}{2}$, per la resistenza, che si domanda.

Ma poiché un istessa corda in tutta la sua estensione non è ugualmente flessibile; non devesi promettere, che il calcolo sempre si accordi precisamente con l'esperienza, non essendo ciò moralmente possibile, bastando, che a un da presso le sia: L'istesso può dirsi de' fregamenti, per la differente consistenza degli untumi, quali ora son più, ora meno densi, e che ora più, ora meno s'insinuano tra le parti, che si sfregano, e fan variare le resistenze; ma non fan, che l'uso di tali regole non dimostrino precisamente l'effetto, che debba attendersi da una machina, per contarvici sicuramente sopra; poiché questa estrema precisione è lontana da ogni uso, potendo sempre adoperar quelle, che noi diamo, & attendere da più ampie esperienze, regole più certe.

Essendo l'uso delle girelle comunissimo, non è fuor di proposito, prima di terminar questo discorso-

scorso, per isperimentare le nostre regole, di comparar le resistenze cagionate tanto dal fregamento de' perni, che dall'intirizzimento delle funi nelle girelle di differenti grandezze, tanto più, che que, che non fanno per ordinario attenzione a tal resistenza, conosceranno dal calcolo istesso, che e' non sia cotanto indifferente, qual'immaginano, il preferire le picciole girelle alle grandi, per lo poco spazio, che le prime occupano: Sia dunque, per cagion d'esempio, un peso di 800 l. proposto a levare, con una girella di 24 dita, ovvero con una di 3 sole dita: Egli è chiaro primieramente, che nell'una, e nell'altra di queste girelle, i perni debbano essere di ugual forza, come le corde, poicche devon sostenere un' ugual soma: Sia dunque il perno di ciascuna girella di un dito di diametro, e la corda di 20 linee, noi ritroveremo col calcolo, secondo le regole di sopra, che nella girella di 24 dita, oltre

Alle 800 l. che bisognano per agguagliare al peso della soma, a levar proposta; la forza motrice deve essere ancora accresciuta di

21 lib. per vincere la resistenza cagionata dall'intirizzimento della Corda, di

22 lib. per superar la resistenza cagionata dal fregamento del perno, & inoltre di

1 lib. per formontare la resistenza cagionata dall'intirizzimento della corda, per l'accrescimento di 21, e 22 lib., & in fine, di

1 lib. per vincere la resistenza cagionata dal fregamento del perno per detto accrescimento di 21, e 22 lib. Quali pesi insieme fanno quello di

845 lib. tanto che una forza motrice superiore a
tal

266. *Memoria dell'Accademia Reale*

tal pelo rileverà con la girella di 24 dita di diametro il proposto peso di 800 lib.

Ma con la girella di tre dita, l'istesso calcolo ci dimostra, che oltre al peso di 800 lib., che bisogna per uguagliare la soma, vi si richiegga ancora quello di

167 lib. per superar la resistenza cagionata dall' intirizzimento della corda; quello di

178 lib. per vincere la resistenza del fregamento del perno; quella di

37 lib. per superar la resistenza della rigidità delle corde, per l'accrescimento di 167, e 178 lib.; quella di

38 lib. per superare la resistenza del fregamento del perno per lo cennato accrescimento; quella di

8 lib. per vincere la resistenza dell' intirizzimento delle corde per l'accrescimento di 37, e 38 libe.; Et in fine quella di

8 lib. per superar la resistenza del fregamento del perno per l'accrescimento di dette 37, e 38 libe.;

Quali pesi tutti insieme, fan la somma di 1236 libe.; cioè 391 libe. più di quello, che con la girella di 24 dita sentivali, nella quale la corda, e 'l perno non fanno la resistenza uguale alla sedicesima parte del peso; quando che in quella di 3 dita, questa istessa resistenza è maggiore della metà del medesimo peso.



OSSERVAZIONI

SOPRA LA

CIRCOLAZIONE DEL SANGUE NEL FETO;

E DESCRIZIONE DELLA TESTUGGINE

E di alcuni altri Animali.

DEL SIGNOR DU-VERNEY.

* **B**Uon tempo è, che avrei io potuto dare al pubblico le osservazioni fatte su' l nuovo sistema della Circolazion del sangue nel Feto fondato dal Signor N.N. su la fabbrica del cuore della Testuggine.

Subito, ch'è lo propose, io con accuratezza lo disaminai, facendo varie esatte sezioni di molte Testuggini, & avendo riconosciuto l'errore di detta scoperta, lo combattei ne' miei esercizi del Giardin Reale, & in questa Accademia, come l'istoria di essa già pubblicata, ha riferito.

Sin d'allora composi il Trattato, che imprendo a leggere, & alcuni altri, che in appresso udirete. Ho differito di pubblicarli, e mi ci sono indotto, con pena, per lo ben della pace, e per la considerazione, che ho per l'Autor di esso; ma ho creduto dovere alla curiosità di coloro, quali, come io, levati contro di questi nuovi sentimenti non an-

no

* 23. Dec. 1699.

no avuti l'ozio, e'l comodo di attendere a simili
fezioni. L'Autore allo 'ncontro avrebbe potuto
interpretar il mio silenzio per una approvazione
del suo sentimento, e pubblicare ancora, che quan-
tunque egli mi avesse fatta una specie di disida,
non avessi io poi osato contrastarli.

Tosto che io mi diliberei, felicemente rice-
vei da Versailles una gran Testuggine terrestre d'
America, che mi giovò molto a confermar le offer-
vazioni fatte sopra di quelle, che abbiamo in
Francia: Vi ho aggiunta la descrizione del cuor del-
la Vipera, de' Ranocchi, e di alcuni pesci, che an-
molta simiglianza col cuor della Testuggine, per
non trascurar cosa, che conferir possa a metter in
chiaro tal quistione.

Nella prima parte di questo discorso, descri-
verò la struttura del cuor della Testuggine, e de-
gli altri sudetti Animali: Nella seconda ne disami-
nerò l'uso: e nella terza dedurrò da tutte due la
critica del nuovo sistema.

P A R T E P R I M A

S E Z I O N E I.

Struttura del Cuor della Testuggine.

PRima di aprire il cuore della gran Testuggine
osservai, che il guscio, quale la cuopriva,
era lungo due piedi, e 3 dita, e 2 piedi, & 1 dito
largo, e quello di sotto un piede, e 5 dita lun-
go un piede, e due dita largo, quando che quello
di sopra delle nostre ordinarie Testuggini, non è
più.

più lungo di 6, o 7 dita, e $5\frac{1}{2}$ largo, e quello di sotto 3 dita, e mezzo largo, e 5, o 6 lungo.

Il Pericardio di questi Animali è una membrana di molto stretta tessitura. Con tutta la sua circonferenza fortemente si unisce al Peritoneo, e la di lui capacità è molto grande a proporzion dell'ampiezza del cuore, vedi la *fig. 1.*

E' detto Cuore situato nella parte alta del petto sopra del fegato, senza che fra di loro vi sia Diafragma. Nelle picciole Testuggini si vede un ligamento, che dalla punta del cuore v'ad attaccarsi nel fondo del pericardio, non ritrovato in quella di America: Questo ligamento è un prolungamento della membrana, che avvolge le fibre del cuore, vedi la *fig. 3.*

La Figura del Cuore della gran Testuggine è un grand'emisfero, convessa nella parte inferiore, e piana nella superiore, nel mezzo però un poco incavata, dove si appiccano le auricole, e le arterie, in maniera, che e' rassomiglia molto all'arnione d'un Castrato: Nelle nostre picciole però si dilunga un poco più nella punta, vedi le *fig. 2. e 3.*

Nella gran Testuggine, il cuore misurato dalla metà della base alla punta, s'è ritrovato esser di un dito, e 5 linee, e quasi tre dita da un lato della base all'altro: In una delle picciole però la distanza dal mezzo della base alla punta, era di 6 linee, e quella da un lato di detta base all'altera di 9 linee.

All'intorno del Cuore di questi Animali, si osserva una specie di conserva di figura bislunga, molto simile a quella di un otre gonfiato: Vien questa formata dall'accorciamento di più vene: l'Arteriale destra, e la Vena cava inferiore imboccano nel lato destro di detta conserva, una sopra, e l'al-

L'altra sotto; e dall'altro lato si vede con similgiante situazione l'Ascellare sinistra, & una vena, che riporta il sangue dalla parte sinistra del fegato: La vena Coronaria, & alcuni altri vasi, che dalle parti vicine escono, si votano ivi; e poicche le Jugulari si scaricano nelle Ascellari, quindi è, che 'l sangue di tutte le vene raccogliessi in questa conserva, fuorché quello delle vene del polmone, *vedi le fig. 26 e 10.*

Questa conserva nel dentro, è in alcuna maniera vestita da fibre carnote, che s'incrocicchiano, & intessono, quasi come quelle, che si osservano nel di dentro delle auricole del cuor dell'Uomo: La vena Cava è pur così intrecciata per la lunghezza di quasi un dito, come ancora le imboccature degli altri vasi, *vedi la fig. 7.*

Quest'istessa conserva verso il suo mezzo s'imbocca nell'auricola destra da quella parte, che riguarda il guscio di sopra, *vedi le fig. 4 e 5.*

Le due vene del polmone, risalendo lungo il lato inferiore di ciaschedun bronco, la destra passando per di sopra la detta conserva, e la sinistra per di sopra l'Ascellare dell'istesso lato, vengono tutte due a formare la seconda conserva molto più picciola della prima, qual si scarica nell'Auricola sinistra verso il mezzo dalla parte, che riguarda il guscio di sopra, *vedi le fig. 4, e 8.*

Nell'imboccatura della gran conserva, vi son due animelle situate un poco oblique, rispetto all'auricola destra, simili a due palpebre, composte di fibre carnose, prodotte da quelle dell'auricole: sono esse attaccate al lor angolo esteriore per un fascetto di fibre, che rimontano un po' obliquamente verso il fondo dell'auricola, impiantandosi ivi, e disperdendosi.

L'anti-

L'animella inferiore si stende un poco più della superiore: quando si uniscono però, chiudono esattamente detta apertura, *vedi la fig. 13.*

La Conca della picciola conserva è parimente vestita dentro di fibre carnose di minor quantità della grande: Nelle picciole Testuggini (locche non ho osservato nella grande) vi è nella imboccatura una animella carnuta, come una mezza luna, allogata in maniera, che i suoi angoli riguardano il fondo dell'auricola destra: Ella si rassomiglia a quella, che ritrovasi negli uccelli su l'imboccamento del tronco della vena del polmone nell'auricola, *vedi le fig. 5 e 3.*

Le auricole son di differenti grandezza, la destra ha maggior capacità della sinistra, e son simili a due borse, che piegate su 'l lato, si unissero per le loro aperture, cioè per la parte più stretta: Sono esse in questo luogo una dall'altra separate da membrana, qual separazione è un poco obliqua verso il mezzo della base del cuore, più però su 'l lato manco, che su 'l dritto.

E' detta membrana in gran parte vestita di fibre carnose, continuate da quelle delle auricole: La parte bassa è puramente tendinosa, e cotanto sottile, che traspare al lume: Si attacca questa tra le due animelle, quali sono all'imboccature delle Auricole, delle quali farem parola appresso, *vedi le fig. 2, 11. 13. e 14.*

Il fondo di queste auricole è sferico, e molto più grande di quella parte, dove si uniscono: si restringono esse verso la base del cuore, formando ciascheduna un canale molto corto, che s'imbocca nelle cavità di questo, *vedi la fig. 10.*

• 11.

L'interiore di dette Auricole è tutto vestito di

di

di fibre muscolose , che s' intralciano in tante differenti maniere , che formano una molta spugnosa tessitura, soprattutto nelle picciole Testuggini ; donde è , che gonfiate , e disseccate , rassomigliano in alcun modo alla sostanza de' polmoni: La membrana , che li divide è intiera , *vedi la fig.*

13.

Nell' imboccatura di ciascuna auricola , vi è una animella , e queste due sono unite insieme per lo fondo , e rivestite di Fibre carnose dirette da un lato della base del cuore all' altro: La membrana, che fra dette auricole è , si attacca per di fuori al mezzo di dette due animelle , come si è detto , dividendole così in questa parte: Per quel verso , che loro è libero , possono esse col divenir concave in abbassandosi , dare il passo al sangue delle Auricole al cuore ; e rilevandosi , ne impediscono il ritorno : Si vede perciò , che quantunque dette due Animelle unite insieme , come sono , facciano una specie di quadrato lungo , quando si adattano contro le aperture delle Auricole ; Nientedimeno quando il sangue vi passa , ciascheduna separatamente rappresenta il quarto di un ovale concava opposta , e congiunta ad un' altra per la sommità , o se si voglia , simile a que' stovigli , detti *copricorvi* rivoltati , che si toccassero per le loro centine , *vedi le fig. 13 e 17.*

An dette Animelle queste di comune con quelle del Doccio ovale del Feto , che quando danno il passo al sangue , divengon concave , a simiglianza di grondaje ; e quando l'impediscono , e si adattano contro detto Doccio , si fan piane . Due cose contribuiscono a farli adattare così contro il doccio , la prima è la spinta del sangue , la seconda l'azione delle fibre carnose , che le compon-

gono, divenendo queste da curve, che erano, rette, e 'l sangue, che urta contro di dette animelle così appianate, & applicate contro il loro doccio, le mantiene in questa positura.

Il cuor di questo Animale ha tre cavità, una nella parte manca, e le due altre nella dritta: Quel della manca sola l'occupa tutta intiera, e le due della dritta son poste l'una sopra dell'altra; ma di queste due quella, che è più prossima al guscio superiore, è molto più grande dell'altra, occupando quasi la terza parte del cuore, che riguarda il guscio di sotto, *vedi le fig. 13 e 14.*

Chiamerò quindi appresso prima cavità una delle due, che riguarda il guscio di sopra, e quella, che riceve il sangue dell'auricola destra; seconda cavità quella, che occupa tutta la parte manca, qual riceve il sangue dall'auricola sinistra; e terza cavità quella, che stà sotto alla prima, in cui s'imbocca l'arteria del polmone.

La tessitura interiore del cuore è formata da fibre carnose di varia grossezza, intessute l'une con l'altre, maggior numero delle quali, elevandosi nel mezzo, fa quella separazione, che noi diciamo prima, e seconda cavità, quantunque in fatti non sia altra, che una, poicche detta separazione giugne fino alla metà del cuore, e non si unisce con le animelle dell'auricola, poco fa dette; in maniera che, lasciando sempre un'apertura, per cui queste due cavità si comunicano, con molta verità si dice, che queste siano una sola. Poicche la prima cavità comunica parimente con la terza, convien parimente dire, che tutte tre formino una sola; perciocche non essendo divise da alcuna animella il sangue, che ritorna dalla grande, e dalla picciola conserva, facilmente può mischiarsi, e

Memor.

S

da

da una cavità entrar nell'altra: L'animella però dell'imboccatura dell'auricola destra, essendo disposta in maniera, che'l sangue, qual vi passa, scorrendo dalla sinistra alla destra, vada solamente a riempire la prima cavità, la quale, comunicando con la terza, detto sangue nello stesso tempo entri in questa ancora; quandoche le animelle dell'auricola sinistra, essendo rivolte dalla destra alla sinistra, il sangue, che indi viene, riempie la sola seconda cavità, *vedi la fig. 17.*

Abbiamo detto, che la tessitura delle fibre carnose, per cui si divide la prima cavità dalla seconda, lasci un passaggio, donde possa il sangue andare dall'una all'altra: Vn tal passaggio è di ugual lunghezza con la base delle animelle, & ha quasi tre linee di diametro; sicche stando le animelle abbassate, vi riman sempre un apertura, donde la comunicazione della prima, e della seconda cavità non viene intieramente impedita, *vedi la fig. 17.*

Bisogna qui avvertire, che la comunicazione della prima cavità con la terza, si faccia con un apertura inarcata, composta di fibre carnose di circa due linee di diametro: E' questa su'l lato destro della base del cuore, vicino all'imboccatura dell'Aorta, che io chiamo *descendente*, *vedi la fig. 17.*

La superficie del cuore da per tutto sembra di una ugual grossezza: Avendo però egli due cavità una sopra l'altra nella parte destra, i pareti di esse sono men grossi, che quelli della seconda cavità; ma i pareti della prima son più doppi ancora di que' della terza, *vedi le fig. 12, e 14.*

Questo cuore, come quello ancora degli altri Animali, è composto da più ordini di fibre, quali
co-

cominciano da un de' lati della base, descrivono ciascuna una doppia spirale, l'una opposta all'altra, e vanno a terminare alla parte opposta dell'istessa base.

Da queste istesse fibre si formano quelle spèzie di tramezze, che dividono le cavità del cuore, e che s'intessono in varie forme, lasciando, come tante picciole cellette, che comunicano l'una con le altre; donde avviene, che essendo gonfiato, e disseccato il cuore, sembri tutto spugnoso.

Dal lato dritto della base del cuore sorgono tre Arterie considerabili in quella parte, che riguarda il guscio di sotto: Due di dette Arterie compongono l'Aorta, e'l loro capo è nella prima cavità del cuore: Gli orifizj di queste sono tra l'imboccatura dell'auricola destra, e l'apertura, donde si comunica la prima cavità con la terza, e son così vicini, che quasi toccansi, *vedi le fig. 2, 4, 9, e 17.*

La terza Arteria, che è quella del polmone, esce immediatamente dalla terza cavità del cuore, *vedi le stesse fig.*

L'imboccature di questi vasi son sostenute da una cartilagine quasi semicircolare, alla quale si appiccano parimente le loro animelle: e per ciascuna di dette imboccature ve ne son due di figura sigmoide, le quali anno l'istesso uso con quelle degli altri Animali, *vedi le fig. 14, 15, e 16.*

Sono dette arterie strettamente tra di loro ligate, e due quasi di pari, sopra delle quali stà la terza. Ho parlato finora, come farò nelle seguenti descrizioni di detto Animale, in istato, che cammina, *vedi la fig. 9.*

Nelle nostre picciole Testuggini di Terra, vengono dette arterie su'l primo lor nascere abbracciate da un Anello di fibre carnose, quale non

si ravvifa nel cuore di quella d' America, *vedi la fig. 3.*

Questi tre vasi, dopo di essersi rilevati all' altezza di cinque, o sei linee, si rincurvano a foggia di gruccia.

Quest' istessa terza arteria è quella, che forma il primo tronco dell' Aorta: Verso la parte, dove comincia ella il suo rivolgimento, divide da se un ramo considerabile, che tosto si sparte in due altri a destra, & a sinistra, il più grosso de' quali fa l' assillare, e l' più picciolo la carotide; e perciocchè ella somministra il sangue a tutte le parti superiori, io la dico Aorta ascendente: Cala di poi nel lato destro del cuore, piegata sopra a' polmoni, e senza dar altro ramo, v' a combaciarsi con quello, di cui ora parlerò, *vedi le fig. 2, e 4.*

Il secondo tronco dell' Aorta s' incurva parimente nel lato manco del cuore, e senza pur egli gettare altro ramo, scende sotto al ventricolo, e ne scomparte in questo due grossi, uno de' quali superiore tiene il luogo della Celiaca, e l' inferiore della Mesenterica; e perciò io la chiamo descendente: Poco più sotto di tal divisione si unisce alla porzione nell' Aorta ascendente, quali così unite, formano un solo Tronco, il quale calando, va a distribuirsi per le altre parti del basso ventre, e per tutte l' estremità inferiori; *vedi le stesse fig.*

L' arteria del polmone, che tocca il tronco dell' aorta descendente, nasce, come si è detto, dalla terza cavità del cuore: Ella è molto grossa, e sì uguaglia al diametro del tronco dell' aorta ascendente, quale dopo di essersi un poco rilevata, divide in due rami, che si curvano parimente a foggia di gruccia, sotto quelle de' tronchi dell' aorta, un de' quali v' a metter capo nella parte manca del pol-

polmone , e l' altro alla parte destra , passando per di sopra a due tronchi dell' aorta , *vedi le fig. 2, 4, e 9.*

L' arteria coronale è fatta di un sol tronco, qual esce dall' aorta Ascendente , poco più sopra delle anmelle Sigmoidi , e si distribuisce al cuore, & alle auricole , *vedi le fig. 11 , e 12.*

S E Z I O N E II.

Struttura del Cuore della Granocchia :

Il cuor della Granocchia è di figura conica, come quello della maggior parte degli Animali, compreso da un Pericardio di minor capacità a proporzione di quello della Testuggine .

Sotto di questo si vede una specie di conserva di circa tre linee di diametro , e di figura rotonda.

La vena cava inferiore, uscendo dal fegato, riceve da ciascun lato grossa vena , dalla parte destra una , e l' altra dalla parte sinistra di esso.

Il concorrimento di questi tre vasi forma principalmente detta conserva , la quale riceve le ascellari di ciascun lato , e la vena coronaria ancora , *vedi la fig. 1.*

Si apre detta Conserva al di sotto verso 'l lato destro dell' auricola : L' imboccatura tien due anmelle poste obliquamente , riguardo all' auricola, formando insieme due palpebre , la superior delle quali è più larga dell' inferiore , come appunto nelle Testuggini , & anno l' istesso uso , *vedi la fig. 2.*

A ciascuna parte del polmone , che riguarda il dosso , è attaccato il tronco della vena , che ne riporta 'l sangue : l' una , e l' altra di dette vene , lasciando il polmone , fan quasi due linee di cammino , in-

chinandosi l'una verso l'altra; & in unendosi, formano un solo tronco attaccato alla parte superiore della conserva: Quest' illesso tronco sbocca nell' auricola immediatamente sopra l'imboccatura della conserva nell'auricola *vedi la fig. 3.*

Il cuor di questo animale ha una sola auricola sferica, che non solamente cuopre tutta la base del cuore, ma si distende molto più.

L'imboccatura di essa è molto larga, guarnita di due animelle; una delle quali è attaccata alla parte della base del cuore, che riguarda la spina, e l'altra alla parte opposta dell' istessa base: Sono semicircolari, e simigliano a un da presso alle dette Sigmoidi, di maniera, che il sangue spinto da basso in alto, per la contrazione del cuore, li gonfia, & adatta esattamente i due orli, *vedi la fig. 4.*

Ha questo cuore un sol ventricolo, & i pareti son sottilissimi, le fibre carnute nella parte sua inferiore s'intessono in tante svariate maniere, che compongono una tessitura spugnositissima.

Esce perciò un'arteria immediatamente dal lato dritto della base del cuore, quale dal suo nascere si piega su'l lato destro dell' auricola, coprendo quasi il terzo di essa, e v'è obliquamente per la lunghezza di circa due, o tre linee, dividendosi ivi in due rami: un de' quali v'è a dritta, e l'altro a manca, curvandosi un poco; ciascnno di detti rami si suddivide in altri, *vedi la fig. 5.*

Di questi tre, il superiore, che riguarda la testa, si sparte in due rami, un de' quali si distribuisce a tutte le parti, che son sotto la gola, e l'altro monta al cervello.

Il ramo di mezzo, qual'è il più grosso, s'incurva, e forma l'Aorta discendente: Rimpetto all'ascella si disparte in due grossi rami, il più piccio-

lo de' quali si distribuisce a muscoli , che son sotto la spalla , sù'l dosso , e sù la testa ; l'al ro , che è più grande , forma l'Ascellare : Scende di poi questo ramo fin sotto al cuore , dividendo da se più rami , che vanno alla spina , & unendosi con quello del lato opposto , fanno un solo tronco , da cui si getta un grosso ramo , che tien luogo della Celiaca , e della Mesenterica , scompartendosi poi a tutte le altre parti inferiori .

Il terzo ramo , qual' è l'inferiore , divide si parimente in due altri , il più picciolo de' quali si sparte in due rami , che vanno a scompartirsi a' muscoli , che servono a' movimenti della testa : L'altro ramo si suddivide in tre , o quattro altri considerabili , che nel loro nascere si attaccano al polmone , gittandovi numero infinito di altri piccioli ramoscelli , l'un con gli altri comunicantisi , che da alto a basso per tutti i lati l'abbracciano , *vedi l'istessa fig.*

Quest' Aorta ha due anmelle Sigmoidi nell'imboccarsi al cuore , e come abbiain detto , obliquamente si alza allo spazio di circa tre linee , e in detta parte è ricoverta da fibre carnose circolari : Dentro di tal vaso si vede nel mezzo una lamina cartilaginosa , posta a schiango , attaccata solamente alla parte del canale , che riguarda la spina , e contorta in ispirale da manca a destra : Questa lamina termina in una anmella di figura sigmoide , con a lato due altre ancora dell'istessa figura , sostenute ciascheduna da un picciolo bottoncello cartilaginoso : Sono esse tutte e tre poste nella parte , dove questo vaso comincia a dividersi , e qualora si alzano , ne chiudono molto esattamente l'entrata , *ved. la fig. 6.*

Questa Mecanica molto singolare , ha grande

simiglianza con quella dell' aorta di alcuni pesci; perciocchè nella Razza, e in molti altri, l'Aorta nel suo nascere, è parimente rivestita di fibre carnosose circolari molto strette nella lunghezza di circa un dito; e nel di dentro si vedono quattro ordini di tumoretti cartilaginei, tra quali scorre il sangue, che esce dal cuore: Detti tumoretti ciascuno ha un animella, quale aperta impedisce il ritorno del sangue: Que' dell'ordine più lontano dal cuore, son li più grandi: La figura di questi è cotanto irregolare, e la grandezza delle animelle così varia, che ristuccherebbe il minuto rapporto, *vedi la fig. 7.*

S E Z I O N E III.

Struttura del Cuor della Vipera.

Il cuor della Vipera ha l'istessa figura, che quel del Granocchio, benchè più piana, e 'l lato manco sia più rilevato del dritto: E' allogato circa 6 dita più giufo dalla testa, & un dito su 'l fegato, *vedi la fig. 1.*

Il pericardio è capacissimo, e sottile, in guisa, che facilmente traspare il cuore: Vi si osservano tre vene cave, una inferiore, e due superiori; l'inferiore è più grande; la superiore dal lato dritto s'imbocca con l'inferiore, nella qual parte ciascuno di detti vasi è un pò piegato, *vedi la fig. 2.*

La superiore del lato manco, passando per sopra l'aorta discendente, si attacca all' auricola sinistra, e facendo una picciola piegatura, cala sù la base del cuore, per iscaricarsi nella vena cava inferiore, vicino alla sua imboccatura, *vedi la fig. 3.*

Il tronco formato dall'unione di questi tre vasi ha la sua imboccatura verso la metà del lato dritto dell'auricola destra, e questa imboccatura tien due animelle, come le palpebre, simili alla Testuggine, & al Granocchio, poste obliquamente riguardo all'auricola, vedi la fig. 4.

La vena del polmone è composta da due rami, uno, che riporta il sangue dalla parte superiore di esso, qual'è il più grande, e l'altro, che 'l riconduce dalla parte inferiore.

Queste due vene s'incontrano nel lato sinistro dell'auricola sinistra, e il tronco, che per tal unione si forma, v'è obliquamente per sotto la parte inferiore dell'auricola, cui strettamente è attaccata, a scaricarsi nell'istessa auricola, inserendosi v'è molto obliquamente vedi la fig. 3.

Le due auricole del cuore della Vipera; niente differiscono da quelle della picciola Testuggine terrestre, se non quanto son esse più lunghe, e più strette: Sono ancor separate per una tramezza dell'istessa figura.

Nell'imbocatura di ciascuna auricola nel cuore, evvi un'animella; e queste anno ancora l'istessa precisa conformazione con quelle del cuor della Testuggine.

Vi sono infine tre cavità in detto cuore, la di cui interior configurazione è affatto simile a quelle del cuor della Testuggine coll'istessa comunicazione.

Escono dal lato dritto della base del cuore tre arterie, due di pari, e la terza di sopra; e di queste tre, due parimente formano l'aorta vedi la fig. 1.

Il primo tronco dell'aorta monta nell'altezza di 4 o 5 linee, e si divide in due rami, il più gros-

so de' quali, che è a destra, fa la gruccia, e calato circa tre linee, divide un ramo, che è la Carotide destra; indi discende, e dopo di aver somministrato qualche ramo alla spina, v' a combaciarsi, coll' aorta dell' opposto lato: L' altro ramo produce la Carotide sinistra: Può chiamarsi questo primo tronco dell' aorta, come nella Testuggine, l' Aorta ascendente; rifondendo il sangue a tutte le parti superiori, *vedi la fig. 1.*

Il secondo tronco dell' aorta rilevasi all' altezza di circa tre linee, crocicchiandosi con le due altre; Indi fa gruccia, e scende quasi un dito e mezzo sotto del cuore, per unirsi all' aorta del lato opposto. E, in discendendo, divide un ramo da se, che v' al ventricolo: E questa può dirsi Aorta discendente, perche distribuisce il sangue alle parti inferiori, *vedi la fig. 1.*

La terza arteria, che è quella del polmone innalzasi all' altezza di quattro linee: Ella si piega sulla parte mezzana de' polmoni, e divide in due rami immediatamente sotto l' Aorta discendente.

Il ramo destinato per la parte superiore del polmone è molto più grosso dell' altro, & accompagna la vena in tutta l' estenzion sua, *vedi la fig. 1.*

Non farò parola della struttura del cuore delle Biscie, poicche non differisce ella dal cuor delle vipere, che nella distribuzione de' vasi de' polmoni,

S E Z I O N E IV.

Struttura del Cuor de' Pesci.

Volendo descrivere il cuor de' Pesci, ho scelto il Carpione, come facile ad averli.

Il cuor di questo Pesce è sotto le mascelle, che sono al di sotto delle loro ganasce, donde respirano
nel

nel fondo dell' esofago, quali io chiamerò mascelle interiori, per distinguerle da quelle, che son di sopra, e che formano l'entrata della gola. Il vano, che il cuore, comprende, è rivestito di una membrana molto pulita, quale tien luogo di pericardio in molti altri Pesci, benchè qui non possa dirsi tale, poicché 'l cuore è ancora riposto in un sacco formato da una membranuccia sottilissima, proprio suo pericardio, *vedi la fig. 1.*

Il fondo di questa istessa cavità è da una membrana chiuso, che divide il cuore da tutte le altre viscere, quale è una continuazione della precedente.

Sotto al cuore si vede una conserva fatta dall' accorrimiento di molte vene, tre delle quali escono dal fegato, e servono a solamente riportare il sangue della vena Porta, e di una parte dell' ovario: Ve ne son due di queste tre, che nel fondo di detta conserva in ciascun de' lati sgorgano; e la terza vi si scarica parimente per una larghissima imboccatura: Due altre vene risalgono dalle due bande della spina, accompagnando l'aorta, e si uniscono con le vene, quali escono da' due lobi del fegato, in ciascun lato della conserva: Questi due vasi perciò anno in ciascun de' lati di essa una istessa imboccatura: Il Tronco della vena, che riporta il sangue dalle ganasce interiori è piegato al di sopra dell' aorta, cala nella parte destra del cuore attaccato a' pareti della cavità, nella quale egli è contenuto, e facendo un giro, viene a sboccare a' fianchi della conserva, *vedi la fig. 2.*

Verso la metà della parte inferiore dell' auricula mette capo detta conserva per la superior sua parte, quale ha nella sua imboccatura due anmelle a foggia di palpebre, come quelle degli animali.

mali descritti, & altre, che sono all' imboccatura della vena cava inferiore degli Uccelli; delle quali non si farà parola, come cosa aliena dalla materia, che trattasi, *vedi la fig. 3.*

Hà detto cuore una sola auricola molto capace, adattata al lato sinistro, che, nella parte superiore avvallandosi, forma in ciascun de' lati un bernoccolo, ovvero corno; il sinistro de' quali è più grande del destro: L' imboccatura di essa è nella parte superiore del sinistro lato del cuore, *vedi la fig. 4.*

Vi son due animelle nell' imboccatura dell' auricola del cuore, una di sopra, e l' altra di sotto, appiccate per tutto il semicircolo, che formano, & aperte dalla parte della punta del cuore, donde avviene, che 'l sangue, qual per la contrazione del cuore ringorga, solleva queste, e le unisce l' un contro l' altra, come nelle Granocchie, *vedi la fig. 5.*

La figura del cuore è semicircolare, e quasi schiacciata, come una Castagna di mare: egli è posto di schiango riguardo alla testa, sicché i due lati piani son rivolti alle ganasce interiori: S' incastra egli per la base con l' aorta, con una specie di Ginglino, avendo dette due parti dell' eminenze, e delle cavità, che si congegnano, *vedi la fig. 6.*

I pareti di tal cuore son molto grossi a proporzione della di lui ampiezza, e le fibre d' una tessitura molto stretta.

Per ben intendere la distribuzione de' vasi in tal pesce, bisogna egli avere qualche cognizione della struttura delle ganasce interiori, che imprendo a disaminare: Fan queste, come ogni un sà, l' uffizio de' polmoni ne' pesci, e sono per così dire

divise in due lobi, ciascun de' quali è composto da quattro foglietti, quali posti di schiancio l'uno presso dell' altro, secondo 'l lor contorno, e sostenuti da quattro archi ossei: Chiameremo noi primo arco di ciasun lato quello, che più al cuor si avvicina.

La parte convessa di detti archi è vota, a forma di grondaja, lungo la quale scorrono i vasi, de' quali si parlerà quì appresso: Li foglietti sostenuti da detti archi occupano tutto lo spazio, che si frapone tra la mascella esteriore, & interiore: E son composti di un doppio ordine di lamette ossee, ovvero barbe: Ciascuna di queste lamine è foggjata a picciola falce, e nel suo nascere ha come un piede, o tallone più grosso del rimanente incavato al di sotto a forina di grondaja: Stando questi in piedi, posa la sua estremità solamente all' orlo dell' arco, cui è attaccato per mezzo della membrana molto densa, che cinge l' arco: La parte convessa di detta lamina è guarnita infino alla punta di filetti, che van diminuendo nella loro lunghezza, a misura, che si accostano a detta punta: La parte concava ne ha de' più corti, e n' è vestita fino alla metà, *vedi le fig. 7, e 8.*

Sono detti filetti ligati tra di loro da tutte due i lati da una membrana ossea sottilissima, che per lo mezzo le unisce in tutta quasi la lor lunghezza; ma poicché l'estremità non sono unite, rappresentano esse i denti di una sega, *vedi l'istessa fig. 8.*

Si è detto, che ciascun foglietto vien composto da un doppio ordine di lamine; bisogna aggiungere, che la parte concava di ciascuna di queste, si adatta sopra la convessa di quella, che l'è opposta, e che vengon tutte insieme ligate da una membrana dal loro nascere, fino alla metà della loro

altezza, ove divenendo più grossa, forma una specie di cordone, al di sopra del quale è ella attaccata alle lamine, per i capi di altrettante picciole lunette, quanti spazj vi son tra esse: Il rimanente della lamina è libera, e termina in una punta finissima, e molto arrendevole, *vedi la fig. 9.*

La base di queste lamine su gli orli dell'Archi, facendosi dall'estremità del loro tallone, come si è detto nel mezzo di esse, rimane un picciol voto, in forma di canal triangolare, che si stende tutto lungo l'arco, e serve ad allogare i vasi. Vedi la *Fig. 10.*

Sono esse lamine ricoperte d'una membrana sottilissima, per sostenere le ramificazioni di tutti i vasi delle ganasce interiori, i quali scorrono per la grondaja di ciascun'arco, e sono un'arteria, una vena, & un nervo.

Prima di parlare della distribuzione dell'arterie, avvertò, che la parte dell' aorta, qual nasce dal cuore, e che ha due animelle sigmoidi, come quelle della Testuggine, non è molto ampia, a proporzione di quella, che un poco più sopra la è; perciocchè tosto ella si slarga in modo, che cuopra tutta la base del cuore, restringendosi di poi a poco a poco, forma una specie di cono, dalla di cui punta esce il vaso, che è la continuazione dell'aorta: L'interiore di quella parte dilatata è ripiena di molte colonnette carnose, che van sempre stremando, sino alla sommità, e tra le loro basi vi sono de' spazj, che formano alcune cavità, nelle quali è ricevuto il sangue, che ricorre; ciocchè rinforza le azioni delle animelle pocanzi dette; e produce l'istesso effetto di quelle, che si vedono nella parte muscolosa dell'aorta della Razza, e della Grapocchia. Vedi la *Fig. 11.*

Il canale, che esce dalla punta del cono dell'aorta, scorre tra i due lobi delle ganasce interiori; Rimpetto al primo pajo d'archi di detti lobi, da ciascun suo lato scomparte grosso ramo, che si suddivide ancora in due altri; il primo de' quali scorre nella grondaja di questo primo pajo d'archi; e l'altro in quella del secondo pajo: Quest'istesso tronco nel suo corso si divide ancora in due rami, ciascun de' quali va dal lato suo al terzo pajo; e più oltre ancora in due altri, che vanno all'ultimo pajo di detti Archi.

Ciascuna Arteria, camminando lungo la base di ciascun foglietto, vi gitta altrettanti paji di rami, quante paja di lamine vi sono, e svanisce intieramente nell'estremità del foglio; Sicche l'aorta, e suoi rami non fann'altro cammino, che dal cuore fino all'estremità delle ganasce interiori, nelle quali finiscono. Vedi le *Fig. 12, e 13*: E per la distribuzione di ciascun pajo d'arterie, Vedi le *Fig. 14, e 15*.

Su l'orlo di ciascuna lamina, vi è una vena, & ogni vena viene a scaricarsi in un tronco, che scorre nella grondaja di ciascun'Arco, le di cui differenti ramificazioni si vedono chiaramente nelle Figure: Uscendo dette vene dall'estremità di ciascun'Arco, che riguarda la base del cranio, prendono la consistenza di arterie, e vanno a riunirsi due a due, per ciascun lato: Quella, per cagion di esempio, che vien fuori dal quarto Arco, dopo di aver provveduto de' rami, che scompartono il sangue agli organi del senso, al cervello, & a tutte altre parti della testa; viene ad unirsi con quella del terzo Arco, e così fanno un solo ramo, quale dopo di aver fatte due linee di cammino, si unisce a quello del lato opposto, e formano un tronco, che
scor-

scorrendo sotto la base del cranio , riceve poco appresso da ogni lato un'altro ramo formato dalla riunione delle vene del secondo , e del primo paio d'archi . Quest'istesso continua il suo corso lungo le vertebre , e distribuendo il sangue a tutte altre parti , esercita l'uffizio di aorta discendente : Queste stesse vene con l'altra loro estremità , che riguarda il principio degli Archi , vengono a sgorgare in un tronco , che s'imbocca nella conserva . Vedi le Fig. 16 , e 17.

La conformità , che s'incontra nella struttura de' cuori di questi animali , ci ha obbligato , a , nell'istesso tempo , descriverle.

Prima però di spiegarne l'uso , non farà inutile l'avvertire 1 , che per Conserva , non intendo altra cosa , che un tronco di vena formato dall'accorrimiento di molte altre , e che tien le veci di vena cava superiore , & inferiore nella Testuggine , e nel Carpione; nel Granocchio però altro non vi è , che 'l tronco della vena cava inferiore , che riceve le due ascellari ; e quantunque tal Conserva , o tronco sia guarnito di fibre carnose , chi oserà dire , ch'è non sia del genere venoso , come quelle appunto che s'imboccano nelle auricole , e nell'altre cavità del cuore degli Animali , nelle quali si osservano in tal parte simili fibre . 2 La ragione , che mi ave obbligato , ad entrare nel minuto della distribuzione delle arterie del Ranocchio , e de' Pesci , è stata , che , dovendo confutare il nuovo sistema , convenivami di far vedere , come l'orta discendente venga sempre composta da due tronchi , e talvolta da più , come ne' Pesci.

SECONDA PARTE

Uso del Cuore della Testuggine, del Granocchio, &c.

Nella descrizione, che abbiain fatta della struttura del Cuor della Testuggine, si è potuto osservare, che differisca ella in molte cose da quella della maggior parte di altri Animali.

La prima differenza è quella de' ventricoli: Perciocche se bene le tre cavità del cuore di detto Animale sian separate da tramezze, avendo però tra di esse apertura di comunicazione, non sono altro, che un sol ventricolo; quandoche negli Uomini, negli Animali quadrupedi, e negli Uccelli se ne avvisano due; perche la tramezza, che fra di essi ventricoli è, li divide intieramente: Non posson dunque chiamarsi ventricolo destro, e ventricolo sinistro le cavità del cuor della Testuggine, se si voglian unir a queste due parole le idee ordinarie; perciocche, se per un verso si rimissino riguardo alle auricole, & al corso del sangue venoso; potrebbe in verità uno esser chiamato ventricolo destro, e l'altro sinistro; ma se rispetto al nascere delle arterie; l'istessa cavità, che dicesi ventricolo destro, potrebbe essere chiamato parimente ventricolo sinistro, nascendo da questi l'aorta: Quel che chiamasi ventricolo sinistro non avrebbe dunque arterie, e quel che terzo ventricolo appellasi, non avrebbe auricole, nè vene: Locche è contrario alla fabrica del cuor dell'Uomo, & alla maggior parte degli Animali.

La seconda differenza avvisasi nella circolazio-

Memor.

T

zio-

zione del sangue per le cavità del cuore; perciocchè nell'Uomo, negli Animal quadrupedi, e negli Uccelli, tutto il sangue riportato dalla vena cava, passa per lo ventricolo destro, e di là nell'arteria del polmone; e quel che ritorna da questo, rientra nel ventricolo sinistro, e di là nell'aorta.

Ma nella Testuggine il sangue, che viene da tutte le parti del corpo, fuorchè da quella del polmone, entra nell'auricola destra, per la gran conserva, la quale, in restringendosi, per vigor delle fibre carnote, di cui è dentro vestita, lo spinge nelle auricole; e poicché l'animella, qual'è nell'imboccatura di detta auricola del cuore, è disposta in maniera, che'l sangue, qual'urta, stringendosi, scorra da sinistra a destra: Egli è costante, che in ogni volta, che detta auricola si vota, riempia non solamente la prima cavità, ma la terza ancora, con cui si comunica.

Vi sono due animelle in forma di palpebre nell'imboccatura di tal conserva, le quali nella contrazione dell'auricola si adattano, e chiudono esattamente detta apertura, impedendo, che'l sangue, di cui l'auricola è piena, non ringorghi nella conserva, costringendolo perciò ad intieramente rifondersi nel ventricolo del cuore.

Negli Uccelli si ritrovano simili animelle nell'imboccatura della vena cava nell'auricola; e ne' quadrupedi, in luogo di animelle, si osservano fra le due vene cave, e nella parte interiore della loro imboccatura alcuni rialti formati da fascetti di fibre carnose, quali di tal maniera si sviluppano intorno a detti vasi, che vi formano come tanti sfinteri, abbracciando non solamente lo spazio delle vene cave, ma l'imboccatura loro ancora, non potendosi essi raccorciare, senza ligare, per così dire
det-

dette due vene nell'entrar nell'auricola : Negli Uomini questi rialti son meno osservabili.

Quindi si vede , che tali sfinteri , & animelle anno l'istesso ufo ; perciocche , siccome le animelle dan luogo al sangue di entrare dalla conserva nell'auricola , e ne impediscono il ritorno ; detti sfinteri ancora , rilasciati , permettono al sangue delle vene , di riempir l'auricola ; quando però li stringono , chiudono l'apertura di detti vali , e resistono al ritorno.

Il sangue riportato dalla vena del polmone , riempie l'auricola sinistra ; nelle picciole Testuggini , e negli Uccelli , vi è un'animella carnuta nell'imboccatura di detta vena , che impedisce il ritorno del sangue ; ond'è , che l'auricola sinistra , restringendosi , v'adempie la seconda cavità , per cagion dell'animella , che stà nella sua imboccatura rivolta da destra a sinistra.

Tutto 'l sangue contenuto nella seconda cavità , è costretto dalla compression del cuore a rientrar nella prima , non avendo ella arterie , alle quali possa rifonderlo ; nell'istesso tempo , che 'l cuore , stringendosi pigne il sangue dalla seconda cavità nella prima , egli urta ancora nelli due tronchi dell'aorta quel sangue , che era contenuto in detta prima cavità , per dividerlo in tutte le parti . In fine qualora la prima cavità si vota , il sangue della terza cavità è parimente spinto nell'arteria , che v'ap' polmoni , e si distribuisce in tutta la lor sostanza . Quindi si vede , che queste tre cavità in un'istesso tempo si scaricano , e concorrono insieme a spingere il sangue nelle arterie .

L'anello , o sfintero , che si osserva nel nascere dell'aorta nelle picciole Testuggini , in restringendosi tosto dopo la contrazion del cuore , fa credere ,

che 'l principal di lui uso sia , di accelerare , & accrescere il moto del sangue verso l'estremità.

Nelle Granocchie, e'n molti altri Pesci occupa detto anello una considerabil parte dell'aorta ; e dà luogo a giudicare quest'istesso , cioè , che spinga , in restringendosi , con maggior forza il sangue per tutte le parti del corpo ; siccome la gran quantità delle animelle in detta parte dell'aorta allogate , fan credere , che si n destinate, per impedire il ringorgamento.

Si osserva una terza differenza intorno alla maniera , come il sangue si mescoli nelle cavità del cuore . Nell'Uomo tutto 'l sangue , che è scivero delle sue parti attive , entra nel destro ventricolo , per esser menato di là ne' polmoni , ove riceve tutte le preparazioni necessarie ad animare , & avviare le di lei parti ; donde poi si rifonde al ventricolo sinistro, e nell'aorta, che lo scomparte per tutto 'l corpo.

Nella Testuggine per ogni circolazione passa nel polmone un poco più del terzo del di lui sangue , ove riceve le stesse necessarie preparazioni per suo' usi ; e'l sangue, che vi si porta è principalmente quello , che si contiene nella terza cavità , quale è quasi che puramente venoso . L'altra porzione del sangue, nelle vene nella prima cavità riposto , si mescola con quel della seconda cavità , quell'istesso , che è ritornato dal polmone , e per tal mescolanza , viene egli a poco a poco ad essere fornito di parti attive , delle quali il sangue della prima si era provveduto nel polmone , quanto portava 'l bisogno dell'Animale ; così tutto quel che ritorna da' polmoni , s'intride nelle cavità del cuor dell'a Testuggine con quel delle vene : Nel ventricolo del cuor dell'Uomo però non si fa tal mescolanza ,
 .pal.

passando tutto 'l sangue, che ritorna da' polmoni, dal ventricolo sinistro all'aorta.

Facciam quì ancora alcune riflessioni, perche meglio si sentano le differenze, che corrono tra 'l cuor della Testuggine, e quel degli altri Animali anzidetti.

Tre cose stabiliscono particolarmente queste differenze: La prima è la comunicazione delle tre cavità: La seconda, che l'aorta tragga la sua origine dalla cavità destra: e la terza, che la sinistra, non abbia arterie.

Per ben'iscoprir la ragione di tali differenze, bisogna avvertire, che'l corpo dell'Uomo, e degli altri sudetti animali soffrono un dissipamento, e perdita considerabilissima di sostanza in tutte le funzioni, che vigilando fanno, e per lo moto celere del sangue, e de' spiriti: Qual perdita, non può bastantemente ripararsi, se tutto'l sangue scaricato dalle due vene cave nel ventricolo destro, non giri per i polmoni, da' quali si renda al ventricolo sinistro, e da questo all'aorta; perciocche ne' polmoni l'aere comunica al sangue le parti attive, penetranti sì, che 'l calore, la fluidezza, e la fermentazione quindi dipendano; per questa mescolanza istessa è reso egli adatto a nutrire, & in girando per lo cervello, a somministrare a questo parti vive, e sottili, che diciam spiriti animali, & a servire in fine per tutti gli altri usi.

Non deve dunque sorprenderci, se l'Uomo; (che ha bisogno di abbondevolissimo nutrimento, e di prodigiola quantità di spiriti da risponderli a tante, e sì differenti sensazioni, & a tanti moti, che vegliando fanfi, quali sono e violenti, e di lunga durata), abbia parimente bisogno, che tutto 'l sangue somministrato dall'una, e dall'altra vena

cava, circoli per i polmoni; e che basti alla Testuggine, qual tutto Inverno riposando agghiadata mena, e che può per più meli vivere nel più gran calor della State, ritenuta in un vaso, senza nutrimento alcuno, che ha moti molto lenti, e pulsazione di cuore ben rare, e che quasi nulla di se sva-
pora: Basti, io dico, che 'l terzo del sangue, qual' esce dal cuore, vada al polmone, per ricevere ivi le preparazioni necessarie alla vita dell'Animale, e che detta porzion di sangue si rimescoli con quello, che deve essere spinto dall'aorta in tutte le parti del corpo. Nelle Granocchie le due vene del polmone si scaricano nell'auricola: Nelle Salamandre, elle si votano nella vena cava inferiore vicino alla imboccatura di questa nel cuore; così in tutti detti Animali si fa la mescolanza, prima, che 'l sangue entri nel cuore; ma nella Testuggine, ne' Serpenti, e nelle Vipere, le due vene del polmone si scaricano nella seconda cavità, facendoli tal mescolanza nel cuor istesso. Può dunque dirli essere stato necessario, che dette cavità avessero tal comunicazione, perche 'l sangue, che rivien da' polmoni s' intridesse con quello delle vene, e che l'aorta avesse dovuta forgere dalla prima cavità, luogo appunto, ove tal mescolanza farsi; perciocche dovea ella distribuire il sangue impregnato di dette parti attive a tutto'l corpo. Quantunque i pesci abbiano molta simiglianza con questi Animali; la circolazione però in altra maniera addiviene; poichè 'l sangue, qual dal cuore esce per ogni pulsazione, si scomparte nelle ganache interiori, per numero infinito di picciole arterie, quali vestono la superficie di tutte le lamine, dalle quali sono elle composte; e le vene, quali riportano detto sangue, lo distribuiscono a tutte le parti a simiglianza di
arte-

arterie. La ragion di questa differenza è, che la picciola quantità d'aere, qual si contiene tra le parti dell'acqua, donde difficilmente, e per la compressione, che tra le lamine delle ganasce inferiori riceve, ei si divide, deve adattarsi ad una gran superficie di sangue, per bastantemente provvedere di particelle attive al bisogno di detti Animali. Più a lungo In altra Memoria si diffaminerà la circolazion del sangue ne' pesci, in parlando della loro respirazione.

Non rimane altro, che a vedere, perche nelle Testuggini l'aorta sia composta di due tronchi.

Quantunque le tre cavità del cuore nella Testuggine debbano esser considerate come un sol ventricolo, pur tuttavia convien credere, che tutto 'l sangue, quale dalla vena cava, e vena di polmoni è ivi portato, non siavi esattamente mescolato, impedendo la perfetta mescolanza quelle specie di tramezze, che distinguono dette cavità: Il sangue ancora, che vien dal polmone, votandosi per la contrazion del cuore in quella cavità, donde le aorte nascono, è verisimilmente determinato a riempir questi vasi, e sopra ogn'altro l'aorta ascendente, la di cui apertura è più larga, e più esposta alla direzione di questo sangue ravvivato; vedesi perciò, che ella sia quella, che lo somministra alla testa, & alle altre parti superiori, dove è maggiore il bisogno di abbondevoli parti attive; ma l'arteria del polmone, prendendo l'origin sua dalla terza cavità, non ha potuto riempirsi di altro sangue, che del quasi venoso della prima; adduce perciò in detto viscere, un sangue privo di parti attive, delle quali deve provvederti.

P A R T E T E R Z A.

Critica del nuovo sistema.

LA nostra descrizione del cuor della Testuggine, si ritroverà un poco differente da quella, che l'Autor del nuovo sistema ha data al Pubblico, & egli non si accorderà con noi intorno agli usi, a' quali destiniamo le parti osservate nel cuore di detto Animale; ma riguardo alla struttura, la questione è di fatto, appoggiata sopra la sezione esatta, che ne abbiám fatta; quanto all'uso, noi più precisamente lo stabiliremo, in disaminando il nuovo sistema.

Perche non possa dirsi, che io calunnj l'Autor, o sù de' fatti, che reca, o sù le conseguenze, che deduce; seguirò la disamina del suo sistema, appunto, come l'ha egli stesso inserito nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Anno 1692. in questi termini.

Primieramente ave egli avvisato, *che nel cuor di detto Animale vi sian tre ventricoli, uno a destra, l'altro a sinistra, e 'l terzo nel mezzo della base del cuore, ma più in avanti delli due altri.*

Secondamente, *che 'l ventricolo destro del cuore sia separato dal sinistro da una chiusura carnosa, e spugnosa, in mezzo alla quale vi sia un doccia ovale, simile a quello, che s'incontra nel Feto tra la vena cava, e la vena del polmone. Che nell'imboccatura di questo doccia vi sian due anmelle, una dalla parte del ventricolo destro, e l'altra da quella del ventricolo sinistro, senza che però esse im-*

pen-

pediscano la comunicazione di detti due ventricoli.

Terzamente, che 'l ventricolo destro si comunichi ancora con quello di mezzo, per un' altro ducio del diametro di quattro linee. Riceva parimente la vena cava, e nasca da lui l'Aorta, & un' arteria, che tien luogo di canal di comunicazione, qual si osserva nel Feto tra l'Aorta descendente, e l'arteria del polmone, ma nella Testuggine questa arteria di comunicazione non si riunisce all'Aorta, che nel ventre.

Quartamente, che 'l ventricolo di mezzo non riceva alcuna vena, sorgendo solamente da lui l'arteria del polmone: allo 'ncontro il ventricolo sinistro riceva la vena del polmone, senz'chè arteria alcuna da lui nasca.

Quintamente, che 'l ventricolo sinistro del cuore non abbia parimente arteria alcuna, che possa portar via il sangue, qual dalla vena del polmone li viene; e per conseguenza necessariamente li convenga, che 'l sangue, qual da detta vena si conduce nel ventricolo sinistro del cuore, passi per lo doccio ovale nel ventricolo destro, malgrado le due animelle, che sono nella di lui imboccatura.

Sestamente, che vi sia perciò luogo di credere, che nel Feto una porzion del sangue, che viene al ventricolo sinistro del cuore per la vena del polmone, si rifonda parimente nella vena cava, non ostantino le animelle, che sono nell'entrata di detto doccio, per passar nel ventricolo destro del cuore, senza entrar nel ventricolo sinistro: Perciocchè non differendo il doccio ovale della Testuggine da quello del Feto in altro, che nella situazione, e direttamente corrispondendo alla vena del polmone nell'una, e nell'altro, e vi ha tutta l'apparenza, che l'uso sia uguale nel Feto, come nella Testuggine.

* Que-

* Questo Autor dunque pretende, che 'l cammino, qual fa la comunicazione della seconda cavità del Cuore della Testuggine con la prima, possa tener luogo del doccio ovale del Feto; e che l' Aorta, qual chiamiam noi discendente, possa tener luogo del canale arteriale.

† Rispetto alla prima conformità pretesa, egli è evidente.

1. Che la situazione, e la struttura di queste due aperture siano differentissime; poicché quella del Cuor della Testuggine, che si tiene per doccio ovale, è al di dentro del Cuore, & in fatti non è altro, che una mancanza della tramezza, che divide le due prime cavità; quando che il doccio ovale del Feto è intieramente fuori del cuore, posto all' imboccatura della vena cava inferiore, su 'l lato destro del tronco della vena del polmone.

2. Il doccio ovale del Feto è sì fattamente disposto, che un animella l'apra, e chiuda. Or questo appunto non si osserva nella strada di comunicazione della Testuggine, poicché le due valvole, che sono al di sopra, non servono ad aprire, e chiudere detta strada, ma sì ben destinate unicamente sono, a far passare il sangue dalle auricole nel cuore, & ad impedirne il ritorno; poicché dette animelle abbassate, lasciano sempre tra di esse, e la Tramezza un passaggio da una cavità all' altra.

L'uso del doccio ovale nel Feto, e quello della buca del Cuore della Testuggine, è parimente differentissimo.

Quello del Feto fa libero il passaggio alla miglior parte del sangue della vena cava inferiore nel tron-

* Nel 1. & ult. art.

† Nel 2. & ult. art.

tronco della vena del polmone, discaricando perciò non solamente il polmone, ma facendo passare il sangue dalla Madre nel sinistro ventricolo del Feto, per animare, e ravvivar qualche ritorna dal polmone, e dal rimanente del corpo, ove per mancanza delle respirazioni, non ha potuta provvedersi di parti attive, che l'aere avrebbe dovuto somministrarli. L'apertura della comunicazione del Cuore della Testuggine serve a far passare il sangue dalla seconda cavità nella prima, e ben lungi discaricare i polmoni, contribuisce al contrario a maggiormente riempirli; perciocchè passando più sangue nella prima cavità, più ne entra nella terza, qual' è una continuazione di essa, e nascendo quindi l'arteria del polmone, questa in conseguenza ne riceve di vantaggio.

3. Nel Feto il sangue, che ritorna dal polmone, non è egli quello che anima, e ravviva tutta la rimanente massa, ma unicamente quel della Madre, che passa per lo doccio ovale.

Nella Testuggine allo 'ncontro il sangue, che si tragitta per l'apertura di comunicazione, qual si è voluta dir doccio ovale, ritorna da polmoni nel cuore, e serve a ravvivare tutto il rimanente della massa.

Quest' Autore pretende, che l'una, e l'altra buca corrispondano direttamente alla vena del polmone *; ma l'esperienza fa vedere, che nella Testuggine abbia ben ella comunicazione con la seconda, e con la prima cavità; ma che non possa avere alcuna corrispondenza con la vena del polmone, se non se per lo mezzo dell'auricola sinistra, l'animella frattanto, che sta nella sua entrata, non permette, che porzion di quello, che una

vol.

* Vedi il fin. dell' ult. art.

volta è caduto , e piombato nella seconda cavità , ripassi in detta auricola.

Aggiunge egli una pruova più convincente della simiglianza , che pretende esservi tra gli usi di queste due buche * , dicendo , che la cavità sinistra del Cuore della Testuggine non abbia alcuna Arteria , qual possa ricondurre il sangue , che ella riceve dalla vena del polmone , e che bisogna per conseguenza necessariamente , che il recatovi da detta vena nella cavità sinistra, passi per la doccia di comunicazione; e noi glie l'accordiamo; ma che questo facciasi , malgrado le due valvole , che pretende essere nella sua imboccatura , non ha del verisimile ; perciocche elle sonó allora sollevate, quanto si possan mai fare dal sangue , che il cuore da basso spigne in alto , & intrude nelle arterie ; e che perciò lascino libero il passaggio ; quando che l'animella del doccio ovale del feto , fa ben , che 'l sangue facilmente passi dalla vena cava inferiore alla vena del polmone ; má ne impedisce assolutamente il ritorno.

Resta presentemente a difaminarsi , se nella Testuggine il ramo dell'Aorta , che io chiamo discendente , possa aver l'istesso uso , che ha il canale arteriale del Feto.

Si pretende , che differisca solamente , perciocche non si riunisca all'altro ramo dell'Aorta , che nel ventre ; egli però è facile di far vedere , che la fabbrica , e l'uso del canale arteriale del Feto , sono intieramente differenti da que' di quest'arteria. Poicche 1. nel Feto il canale arteriale prende l'origin sua dall'arteria del polmone , e mette capo nell'Aorta discendente.

Nella Testuggine questo creduto canale di co-

mu.

* Vedi il 5. art.

municazione forge dalla prima cavità del cuore, nè ha comunicazione alcuna col tronco, nè co' tronchi de' rami dell'arteria del polmone.

2 Il canale arteriale del Feto serve a scemare a' polmoni il peso, in facendo passare la miglior parte del sangue dall'arteria del polmone nell'Aorta discendente.

Il ramo dell'Aorta, che si vuol mettere in agguaglio a detto canale, riceve il sangue, che e' contiene dalla prima cavità del Cuore; e lo distribuisce principalmente alle parti destinate per nutrirle; sicche in conseguenza niente contribuisce a scaricare i polmoni; Bisogna dunque considerare i due rami dell'Aorta della Testuggine, come due Fiumi, che da un'istessa sorgiva escono; e che dopo di aver somministrato 'l sangue, l'uno alle parti superiori, e l'altro a quelle della nutrizione, vanno a riunirsi, per formare un solo canale, che si scomparte alle altre parti del basso ventre. Tutta dunque la rassomiglianza è fondata sopra la comunicazione tra questi due rami; ma niente ella giova, per istabilire una tal comparazione. Quello ramo infine di comunicazione si osserva nelle Granocchie, nelle Salamandre, & in molti altri animali, che hanno il Cuore di un sol ventricolo, con una Aorta, rispetto a' quali in conseguenza tal paragone non deve farsi.

E' difficile il comprendere, come un Notomico addestrato, che ha preteso descriverci minutamente il Cuor della Testuggine, su di cui volea fondar il suo sistema, abbia trasandato di far menzione delle sue auricole, quali ha creduto, o voluto far credere, che inutilmente teneffero le animali nella loro imboccatura al doccio di comunicazione, una nella parte del ventricolo destro, e
l'al-

l'altra nel sinistro, e che non impedissero punto la comunicazione reciproca de' due ventricoli.

Intanto egli è fermo, che queste animelle non abbiano alcuna relazione a detto doccio, ne alle cavità del cuore; ond'è, che non deve sorprenderci, se non impediscano di passare il sangue da una cavità all'altra: Ma nella contrazion del cuore, essendo esse animelle sollevate, chiudono esattamente all'istesso sangue l'entrata nelle auricole.

Per sentir con l'Autor del sistema, bisognerebbe tenere in niun conto la natura, e credere, che contro tutte le regole della sua saggia economia abbia ella fabricate due animelle inutili, che niuna funzione nel luogo, ove l'ha ella piantate, facciano; ma come in tale occasione ha potuto obbligarle ella, che fa di queste piccole Machine in tante maniere uso, e che per mezzo di esse agevola con tanto vantaggio lo scompartimento de' liquori ne' corpi degli Animali?

Questo primo errore ha fatto cadere il Signor M. in un'altro. Ha egli raziocinato dell'animella del doccio ovale, dalle due animelle della buca della Testuggine; e dopo di essersi persuaso, che potean queste essere sforzate, non ha fatto riparo a supporre, che l'altra potea pur esserla: Falsa consequenza dedotta da falso principio; perciocchè egli è pur chiaro, che le animelle delle auricole del Cuor della Testuggine, quale fan libera l'entrata al sangue nel cuor istesso, ne impediscano il ritorno; come egli è costante, che l'animella del doccio ovale del Feto sia posta in guisa, da donar libero il passo al sangue della vena cava nell'auricola sinistra del cuore, & a chiuderlo al di lui ritorno.

La terza sorgiva d'errore, per l'Autor del
siste.

sistema, si è l'equivoco preso, allorache egli ha dato il nome di ventricoli alle cavità del cuore della Testuggine, quali ho io stimato dover distinguere col solo nome di prima, seconda, e terza cavità; ma perche egli è di accordo, che detti pretesi ventricoli tra di loro si comunichino; doveva riguardarli come un solo, e non già ragionarvi, come se tre differenti fossero così distinti, e separati fra di essi, come sono i due del Cuor dell'Uomo. Queste tre cavità del Cuor della Testuggine sono in fatti un sol ventricolo, poco differente da quello del cuor de' pesci, e delle Granocchie, e le tre arterie, che a dette tre cavità corrispondono, anno insieme nella Testuggine l'istesso uso, che l'arteria del cuore di questi altri animali, qual si è il distribuire il sangue nell'istesso tempo al polmone, & a tutte le altre parti del corpo.

Per formar distinta idea di tal fatto, convien considerare, che 'l Cuor della Testuggine faccia l'istesso in questo animale, di qualche nell'Uomo fa il ventricolo sinistro, con una differenza, che nell'Uomo il sangue del ventricolo sinistro si distribuisce a tutte le parti del corpo, fuorchè a polmoni; nella Testuggine le vene cave, e le vene del polmone si discaricano in detto unico ventricolo, e 'l sangue essendosi ivi intriso, si scorpora dall'Aorta ne' polmoni, & in tutte le altre parti del corpo dell'Animale. Ho detto dall'Aorta, perciocchè dobbiam noi riguardare le tre arterie, che sorgono dal Cuor della Testuggine, come derivanti da un'istesso tronco, poicché elcono dall'istessa forgiva, cioè da un istesso ventricolo; e come nelle Granocchie, nelle Salamandre &c. le arterie de polmoni sono rami dell'Aorta, egli è a

un da presso l'istesso nelle Testuggini, con tal differenza, che nelle Testuggini, e nelle Vipere questa arteria trae immediatamente dal cuore il suo sangue, ma nelle Granocchie lo riceve dall'Aorta. Perche l'idea delle cavità del cuor della Testuggine, e delle tre arterie, che ne sorgono, non rechi imbarazzo, può riandarsi quello soprattutto, che io ho già spiegato intorno all' uso di tali parti.

Da quanto si è detto, è facile il conoscere, che l'Autor del sistema molto inutilmente si affaticò a rinvenire nel cuor di detti Animali un doccio ovale, & un canale di comunicazione. Avrebbe scemato 'l suo affanno, se avesse considerato, che detti condotti sian necessarij solamente al Feto Umano, & a quegli Animali, il di cui cuore si rassomiglia a quel dell' Uomo: Avrebbe veduta la differenza, che vi ha, tra la circolazione, che si fa nel Feto, e quella che nella Testuggine, da non mettersi in confronto, per le due svariate, & opposte maniere di circolare. Nell' Uomo il sangue riportato dall' una, e dall' altra vena cava, è costretto a girar tutto 'ntiero per lo polmone, come si è veduto; e questa è una delle ragioni, per le quali il cuor dell' Uomo ha dovuto avere due ventricoli, & i polmoni essere così alloggiati.

Rispetto però al Feto Umano, che non respira affatto; mentre che stà nel seno della Madre, se 'l sangue somministrato dalle due vene cave andasse a girar per polmoni, l' esporrebbe ad accidenti mortali; è dunque convenuto, che la natura provvedesse all' alloggiamento de' polmoni, per vie particolari; Onde è, che ha formato ella un modo col doccio ovale, e col canale di Botal. Nelle

Te-

Testuggini, e nelle vipere, o prima, o dopo il loro uascimento, non ha ella avuto bisogno di tali ripari, perciocchè tutto 'l sangue riportato dalle vene cave di detti Animalì, non gira pe' polmoni: Quella picciola porzion di sangue, che basta a dette parti, vien portata da alcuni rami dell' Aorta, che provvede tutto il corpo di sangue. Avrebbe dunque la natura nelle Testuggini nelle Vipere e nelle Granocchie formati docci, da scemar il peso a' polmoni inutilmente.

Se l' Autor del sistema in tal occasione fusse ricorso al metodo, che tanto ha conferito a mettere in chiaro la struttura, e l'uso delle parti del corpo, vò dire alla Notomia comparata; se egli si avesse presa la briga di esaminare il Cuore, e le parti della respirazione nelle Granocchie, nelle Vipere, e ne' pesci, son sicuro, che non si sarebbe ingannato sù 'l vero uso del doccia ovale nel Feto.

Avrebbe veduto in tutti questi Animalì, che la parte del sangue imbevuta di particelle attive dell'aria, s'intrida incessantemente col sangue, che entra nel Cuore, o che vi è entrato per animarlo, e ravvivarlo; e che, essendo così mescolato, venga egli distribuito per l'aorta in tutte le parti del corpo.

Il temperamento del Feto nel sen materno niente differisce da quello di questi animalì; poichè per difetto di respirazione il suo polso è lento, e debole, il calor dolce, e temperato, il sangue mucilaginoso, come tutti gli altri liquori contenuti ne' suo' vali: I movimenti son pochi, poche le sensazioni, viene assorto in una spezie di sonno, & in un riposo, in cui tutto concorre a darli un pronto accrescimento.

In questo stato, picciola quantità di parti at-

Memor.

V

ti-

tive di aere basta , per animate , e ravvivar il suo sangue , come nella Testuggine , e negli altri Animali di simili sorte ; e poicche egli non può ricevere dette parti d' aere per mezzo della propria respirazione , bisogna , che le prenda da quella della Madre.

Le son dunque , col fugo nutricevole , che ella le somministra , portate dette parti attive , le quali devono per conseguenza penetrare , & animare il sangue , che va al cuore , e che deve essere scompartito incessantemente a tutte le parti.

A questo appunto son destinate il ventricolo sinistro , e l'Aorta : E' convenuto dunque dilungar la vena umbilicale fino all'entrata di tal ventricolo : Locche si è fatto , per mezzo del canal venoso , e del doccio ovale .

L'Autor del sistema consente , che il preteso doccio ovale della Testuggine sia succhiato , per dare luogo al sangue , che ritorna dal polmone , di prendere il cammino dell' Aorta ; perche vuol egli dunque abbandonar questo sentimento nella quistione della circolazion del sangue nel Feto ? Tutta l'economia , e la struttura delle parti del cuore , e della respirazione , l'inviterebbero a seguirla ; perche in fine ha egli a dubitare , che 'l sangue , qual ritorna dal polmon della Madre , contenuto nella vena ombilicale , non debba parimente prendere il cammino dell' Aorta , per la più spedita via , e più corta , cioè per le canal venoso , e doccio ovale ?

Io non sò , se l'Autor del nuovo sistema si arrenderà a ragioni , che sì evidenti mi pajono ; ma posso io ben compromettermi , che per molta inclinazione , qual si abbia alle nuove scoperte , Persona non si avvaccierà , a seguire il suo sentimento ;

soprattutto quando vedrà, che per istabilirlo, e' bisogna dare al doccio di comunicazione della Testugine due animelle inutili; che e' tolga al doccio ovale del Feto l'animella, che l'appartiene; che attenti affatto l'uso di quelle del cuore, chiamate Triglochines, sostenendo, che la forza movente delle auricole, unita a quella de' ventricoli, cospirino a pignere il sangue nelle arterie; che distrugga assolutamente l'unico mezzo, che vi è per formar giudizio della forza di un muscolo, sostenendo, che 'l ventricolo destro sia ugualmente forte, che 'l sinistro; quantunque sia costante, che i pareti di quest' ultimo, per esser composti di maggior numero di fibre, sian più grossi, & abbiano perciò molta maggior forza.

Non vi sarà, per dirla in una fiata, chi possa accordare ferma sodezza a tal sistema; che convien appoggiare senza meno sopra a' principj, o falsi, o donde false conseguenze si traggano, perciocche nell'applicazion di esse non si mettono in agguaglio tutte le circostanze; come avviene allora, che disaminando le capacità de' vasi, se ne deducano conclusioni, senza rimirar le forze con le resistenze; o quando falsamente si suppongano uguaglianze di forze, e di resistenze; e si conchiuda, senza aver riguardo alla capacità de' vasi. Ma tutte queste precisioni si appartengono al Trattato della circolazione del sangue nel Feto, che fra non molto vedrà il Pubblico.

SPIEGAMENTO
DELLE FIGURE.
DEL CUOR DELLA TESTUGGINE.

I. FIGURA.

R Appresenta ella il cuor rinchiuso nel suo Pericardio, e serve unicamente a far vedere la capacità di esso, rispetto all' ampiezza del cuore. Tutto quel che si vede per traverso, sarà spiegato nella seguente figura.

II. FIGURA.

Ella rappresenta il cuore, sue auricole, e suoi vasi nella grandezza lor naturale; e vi si è unita una porzione della Trachea, e de' bronchi, riguardo avendo alle arterie, & alle vene del polmone.

A La gran Conserva formata dal concorrimento delle vene seguenti.

L La vena Cava inferiore.

C L'Ascellare destra.

D La Jugulare dell' istesso lato.

E Una vena, che porta il sangue dalla parte sinistra del fegato.

F L'Ascellare sinistra.

G La Jugulare dell' istesso lato.

HH Due vene, che escono da due piccioli lobi mezzani.

I Il Cuore.

K L'Auricola destra.

L La

L La sinistra.

M L'Arteria del polmone.

N Il tronco dell' Aorta , che io chiamo discendente ; dietro di questi due vasi è nascosta quella , che chiamo Aorta ascendente .

O La Gruccia dell' Aorta ascendente .

P Ramo che esce dal suo tronco poco prima di far la gruccia : Egli si divide per ciaschun de' suo' lati in due altri , che sono .

Q L'Ascclare destra.

R La Carotide dell' istesso lato.

S L'Ascclare sinistra .

T La Carotide dell' istesso lato.

b b Due picciole Arterie , che escono dalle Carotidi , e si distribuiscano in una glandula , che occupa lo spazio , quale lasciano tra di esse .

V L'Aorta ascendente , quale , dopo di aver fatta gruccia , cala nel basso ventre , per unirsi all' Aorta del manco lato .

X La Gruccia dell' Aorta ascendente.

Y L'istesso vaso , quale dopo di essere calato sotto del ventricolo , divide da se .

d Il ramo , che fa l'uffizio di Celiaca , &

e Quello , che serve per la Mesenterica .

Z Luogo , ove le due Aorte si riuniscono .

2 Luogo , ove si divide l'arteria del polmone .

3 La Gruccia destra di tal vaso , che passa dietro i due tronchi dell' Aorta , la quale è rinchiusa sotto la gruccia dell' Aorta ascendente .

4 Il vaso istesso , che cala per lo lato esteriore del bronco , nell' impiantarli in e nel polmone .

5 La Gruccia sinistra dell' arteria del polmone posta sotto quella dell' Aorta discendente .

6 L'istesso vaso , che scende al polmone sinistro .

7 7 Le vene del polmone , che rimontano nella parte interiore de' Bronchi .

V 3 III.

III. F I G U R A.

Rappresenta ella il Cuore di una picciola Testuggine di Terra nella sua natural grandezza , per dimostrar tre cose , che non si ritrovano in quello della gran Testuggine: Le due prime sono in questa figura , e la terza particolarità , si rappresenta in altra picciola , che ho posta a fianchi di questa.

A Il Cuore.

B B Le Auricole di effo.

C C Le Arterie con le loro grucce.

D Un anello di fibre carnose , che abbraccia nell'uscir dal cuore dette Arterie.

E Un ligamento, qual si tramanda dalla punta del Cuore , e si appicca al fondo del pericardio.

F Picciola glandula posta fra le Carotidi.

La picciola figura , che l'è a' fianchi , rappresenta le due auricole da alto a basso tagliate , per far vedere l'imboccatura di ciascuna conserva , con le loro anitelle.

A Il Cuore.

B B Le Auricole aperte.

C C Le Animelle , che sono all'imboccatura della gran Conserva .

D L'Animella in forma lunare , che stà all'imboccatura della picciola Conserva , che è appunto la terza particolarità contenuta nella picciola Testuggine di Terra .

E Tramezza , che divide le Auricole.

IV. F I G U R A.

Rappresenta questa le Conserve , e le Vene , che le formano : Rappresenta ancora le Arterie: Il tutto osservato per lo guscio di sopra , cioè nell'

at-

atto del camminar dell' Animale.

- A L'Auricola destra.
 - B La sinistra.
 - C La gran Conserva.
 - D La vena Cava inferiore.
 - E L'Alcellare destra.
 - F La vena, che riporta il sangue dalla parte sinistra del fegato.
 - G L'Alcellare sinistra.
 - H Luogo, ove la gran Conserva s' impianta nell' auricola destra.
 - I I Le due vene del polmone.
 - K Loro Conserva.
 - L Luogo, ove s'imbocca nell' auricola sinistra.
 - M Tronco dell' Aorta ascendente, che non si vedeva nelle precedenti figure; quali rappresentando l' Animal rivoltato; veniva egli occupato dalle due arterie.
- La rimanente distribuzione de' vasi si è descritta nella seconda Figura.

V. F I G U R A.

Rappresenta questa ancora la Conserva picciola, e grande.

- A La Conserva grande.
- B Sua unione con l'Auricola destra.
- C L'imboccatura della picciola Conserva aperta.

VI. F I G U R A.

Rappresenta ella la gran Conserva ignuda, e non vi si ravvisa cosa di nuovo, fuorchè

- A La figura della sua imboccatura, &
- B L'intrusione della vena Coronaria.

VII. F I G U R A.

Rappresenta questa l'istessa Conserva aperta, per far vedere le fibre carnose, di cui la parte interna è vestita.

VIII. F I G U R A.

Ella rappresenta la picciola Conserva formata dal concorso delle vene del polmone, e la sua imboccatura.

IX. F I G U R A.

Rappresenta questa le tre Arterie già descritte, tagliate sù la base del Cuore, per far vedere il nascimento di esse, e l'unione.

- A L'Aorta ascendente.
- B La discendente.
- C L'Arteria del polmone.

X. F I G U R A.

Rappresenta essa il cuore sù l'Auricole rivoltato, perche si osservi la distribuzione della vena Coronaria.

- A Il Cuore.
- B B Le sue Auricole.
- C Il tronco della Vena Coronaria.
- D Sua intrusione nella gran Conserva.
- E E Suo diramamento.

XI. F I G U R A.

Rappresenta questa il Cuore, da cui sù'l loro nascere si son tagliate le tre Arterie con le sue auricole gonfiate; Serve ella principalmente, per dimostrare, come in restringendoli ciascuna auricola, faccia una specie di Canale, che s'imboc-

bocca con le cavità del Cuore: Pà vedere ancora l'origine dell'arteria Coronaria.

A Il Cuore.

BBB Le sue tre Arterie tagliate.

CC Le Auricole gonfiate.

DD Luogo, ove esse si restringono, e dove fan Canale.

E L'origine dell'arteria Coronaria, qual' esce dal tronco dell'Aorta ascendente immediatamente sù la base del Cuore.

XII. F I G U R A.

Rappresenta questa il Cuore nell'istessa veduta, l'origine delle auricole, e l'apertura loro nel Cuore con la Tramezza, quale è piegata, poichè rappresentandosi di fronte, non si vede affatto.

XIII. F I G U R A.

Rappresenta ella le Auricole, dalle quali se n'è tolta una porzione, per farne vedere la tessitura interiore, la Tramezza, che le divide, e l'animella, che stà all'imboccatura della gran Conserva. Rappresenta ancora il cuore, da cui se ne son tolte tre porzioni, una dal lato destro per far vedere la terza cavità, e suo doccio di comunicazione con la prima; l'altra dal lato manco, per iscovrire la seconda cavità: Si vede nell'istesso tempo per questi due tagli la differente grossezza de' pareti di queste istesse cavità: La terza porzione si è tolta dalla base del Cuore, per dimostrare, quanto è possibile, il sito delle animelle delle auricole, le fibre carnosche che la compongono, e l'appiccamento alla loro tramezza nel mezzo di dette Animelle.

A Auricola destra.

BB Le

- BB** Le due animelle in forma di palpebre , che stanno all' imboccatura della gran Conserva , che distintamente si vedono sopra di questa figura a parte BB .
- C** Tramezza , che divide le Auricole.
- D** L'imboccatura della picciola Conserva .
- E** Il Cuore.
- F** La terza Cavità .
- G** Doccia di sua comunicazione con la prima.
- H** Seconda cavità.
- I** Le due animelle dell' Auricola : Che più distinte possono vedersi sotto a detta figura sù l' istesse lettere .

XIV. F I G U R A.

Rappresenta la terza cavità del Cuore , e l'arteria del polmone , dalla quale si è scemata una metà dall'origin sua fino al luogo della sua divisione.

- A** Il Cuore .
- B** La terza cavità aperta.
- C** L'Arteria del polmone , che s'imbocca immediatamente in detta cavità .
- D** Una delle due animelle Sigmoidi , che sono nella sua imboccatura , quali possono meglio distinguersi nelle figure xv. e xvi. sù l' istesse lettere : Nella xv. , una di esse è posta a' fianchi , e nella xvi. sono nella lor situazione , e gonfiate.

XVII. F I G U R A.

Rappresenta il cuore guardato dal guscio di sopra , e di tal maniera aperto , che si vedano sotto la sua base due animelle , che sonò all'imboccatura delle auricole , & una picciola porzione di dette imboccature . Vi si scorgono ancora gli Orifizj de' due tronchi dell' Aorta , & un poco a fianco

chi, & al di sotto il doccio di comunicazione della prima cavità con la terza. Vi si vede in fine la prima, e la seconda cavità del cuore in tutta la loro ampiezza e 'l passaggio dell' una all' altra.

AAAA I pareti del cuore, che sono stati separati.

BB Le due animelle delle auricole.

CC Una parte delle loro imboccature, che apparisce sotto di queste animelle.

D L'Orifizio dell' Aorta ascendente, e quello della discendente.

F Doccio di comunicazione della prima cavità con la terza, quale è affatto su 'l lato destro.

G La prima cavità.

H La seconda.

IIII Le colonne di carne, che, in alzandosi, fanno una specie di tramezza, le quali sono state separate dalla parte del cuore, che l' è sopra.

KK Strada di comunicazione.

L La cartilagine attaccata all'imboccatura delle Arterie. Se l' è tolta una porzione della membrana, che la ricuopre, e quì se ne vede una sol porzione.

Al lato dritto di questa figura ve ne son due altre, una delle quali dimostra le due animelle delle auricole, come BB: La seconda rappresenta le stesse animelle, con le imboccature delle auricole, e delle due Aorte, come ancora la cartilagine in parte tolta dalla membrana di essa rivolta.



P Erche si è fatta l'impression del discorso prima del disegno delle figure, & è convenuto accomodarfi alle citazioni impresse, si è veduto alcuna volta alle stette di metter le stesse lettere, per dinotar due figure differenti, quali per altro non servono, che a meglio divisare l'istesse parti sotto differenti vedute.

I. F I G U R A. DELLA GRANOCCHIA.

- A La Conserva.
- B La Vena Cava inferiore.
- CC Le Vene, che vengono dal fegato.
- DD Le Ascellari.
- E La Vena coronaria.
- F L'imboccatura della Conserva nell'Auricola.

II. F I G U R A.
Rappresenta questa l'imboccatura della Conserva nell'Auricola.

- A La Conserva.
- B Sua imboccatura.
- CC Due animelle a figura di palpebre.

III. F I G U R A.
A La Conserva veduta dal lato della Spina.
BB Le Vene del polmone.
C Loro tronco.

IV.

D Sua imboccatura nell' Auricola .

E L' Auricola .

III. F I G U R A.

Rappresenta parimente l' istesse parti guardate dal ventre con l' Auricola , metà della quale è tagliata da alto a basso .

A La Conserva .

BB Le due vene del polmone .

C L' imboccatura del tronco della vena del polmone sopra dell' animella superiore della Conserva .

DD La metà dell' Auricola , che riguarda la spina.

EE Le due animelle della Conserva .

IV. F I G U R A.

A Il Cuore aperto .

BB Le due animelle , che sono all' imboccatura dell' Auricola .

C L' Auricola aperta .

V. F I G U R A.

Rappresenta questa il cuore , l' Auricola , la Conserva , l' Aorta con i suo' principali rami , il polmone , la destra parte del quale si ravvisa per un disegno dilicatissimo per far vedere i vasi, che passano per di sotto .

A Il Cuore .

La Conserva .

C C L' Auricola .

D Il Tronco dell' Aorta .

E E Suoi due rami , che ugualmente si distribuiscono a dritta , & a manca , suddividendosi in due altri .

F Ramo superiore , che si divide in due , l'esterior par-

parte di cui forma la Carotide .

G La Carotide .

L'interiore v' a' muscoli , che sono sotto la gola.

H l'interiore .

I Il ramo di mezzo , qual' è il più grosso , che , calando manda tre rami considerabili , il primo, notato con la lettera K , fà l'Ascellare , il secondo L , penetrando sù l'ascelle i muscoli del dosso , si divide in due rami , il primo de' quali M rimonta , e si distribuisce a' muscoli , che cuoprono le spalle , e la testa ; il secondo N , calando dietro alle Apofisi traverse delle vertebre , gitta a dritta , & a manca rami , alcuni de' quali vanno a' muscoli del dosso , e de' Lombi , ed altri entrano per i canali delle vertebre , e vanno alla spinal midolla: (Bisogna così correggere questa parte nella descrizione , in cui que' ultimi vasi non son descritti giustamente) il terzo O v' a' all' esofago.

P Unione delli due rami dell' Aorta .

Q L' Arteria , che tien le veci della Ciliaca , e della Mesenterica .

R R Terzo ramo dell' Aorta , che si divide in due altri , il più picciolo de' quali R v' a' distribuirli a' muscoli della Testa , il più grande S è l'arteria del polmone , che si divide in molti rami.

VI. F I G U R A .

A Il Cuore .

B Le fibre carnose dell' Aorta.

VI. F I G U R A .

A L' Aorta aperta .

B Lamina Cartilaginosa , che stà nel mezzo del Canale .

CC Ani-

- CC Animelle Sigmoidi , che sono al nascere dell' Aorta .
D Animella , che stà , all' estremità della lamina .
E E Due animelle , che occupano il rimanente del Canale .

VII. F I G U R A.

- A L'Aorta aperta .
BB Le fibre carnose circolari .
CCC I quattro ordini di Animelle , con i Tubercoli , che le sostengono : Si osserva , che quelli dell' ultimo ordine sono più grandi dell' altri .
-

I. F I G U R A.

DELLA VIPERA.

- A Il cuore , da cui sono state tolte le vene , per isfuggire la confusione .
a a Le Auricole .
B L' Aorta discendente .
CC L' Aorta ascendente .
DD L' Arteria del polmone :
E Un ramo , che v' allo stomaco , qual viene dall' Aorta discendente .
F Riunione delle due Aorte :
G La Carotide sinistra .
H La Carotide destra .
I Un ramo dell' Aorta ascendente , qual' v' alla Spina .
K K Rami , che vanno al polmone , il superior de' qual è più grosso .
Si vede a' fianchi di questa figura il cuore , e sue
Au.

I. FIGURA.
DEL CARPIONE.

- A Il Pericardio.
B Apertura , donde esce l'Arteria.

II. FIGURA.

- AA La Conserva.
BB Due Vene , che fan l'uffizio di vena cava inferiore.
CC Le due Vene cave superiori.
DDD Le tre Vene , che riportano il sangue dal fegato , e vena , che adduce porzion del sangue delle gnanfe interiori , e delle parti vicine.
F L'Auricola.
A Fianchi di detta Figura si osservano le due vene cave , e quelle del fegato , riunite in qualche distanza dalla Conserva.

III. FIGURA.

- Addita ella l'Auricola da alto a basso tagliata , perche si vegga l'imboccatura della Conserva.
A. La Conserva.
B L'Auricola divisa.
CC Le Animelle a forma di palpebre.

IV. FIGURA.

- Rappresenta questa il cuor rivoltato su'l lato destro per dimostrare la forma dell'Auricola.
A L'Auricola.
B Il Cuore.
C L'Aorta dilatata;

Memor.

X

V. Fl.

V. FIGURA.

- A Il Cuore.
 BB Le due Animelle, che sono all'imboccatura dell'
 Auricola.
 C L'apertura, che fra dette Animelle si osserva.

VI. FIGURA.

- Addita il Cuore rivoltato su 'l lato sinistro, perche
 si ravvisi la di lui figura, & in qual maniera
 l'aorta, quale nel suo nascere è molto dilatata,
 forga dalla sua base.
 A Il Cuore.
 B La dilatazion dell'Arteria.

VII. FIGURA.

- Rappresenta questa uno degli Archi veduto dalla
 parte di sotto, per distinguere la grondaja, e le
 due parti, che la compongono.
 A Prima parte dell'Arco.
 B Seconda parte.
 C La grondaja.

VIII. FIGURA.

- Rappresenta questa una delle lamine in particolare.
 Ne parlo qui, prima di far parola degli altri vasi,
 perciocche son queste destinate a sostenere le di-
 ramazioni di esse.
 A Tronco della lamina.
 B Filetti della parte convessa. Si vede, di esser que-
 sti ligati da una sottilissima membrana, quantun-
 que le loro estremità non le siano.
 C Filetti della parte concava.
 D Il Tallone con la sua grondaja.

IX. FIGURA.

Rappresenta questa due lamine vedute di fronte, & ornate de' loro filetti.

A La lamina, che fa la parte convessa del foglietto.

B La lamina, che forma la parte concava dell'istesso foglietto.

Quindi si vede, che i filetti offesi sian più lunghi nel lato concavo della lamina A, e più corti nel convesso della lamina B, dimodochè dette due lamine sempre si riguardano per loro filetti li più corti. Nella descrizione non si è bastantemente spiegato questo, sendosi alla rinfusa parlato delle lamine, che formano il lato convesso del foglio.

IX. FIGURA.

Rappresenta questa le lamine vedute di fianco, & staccate, per dimostrare la membrana, che l'unisce, e'l cordon, che la termina.

AAA La membrana, che unisce le lamine.

BB Il Cordon, che la termina. Vedeti come detto cordone formi una mezza luna per quanti intervalli vi sono tra le lamine.

X. FIGURA.

Rappresenta ella il canale formato dall'incontro della grondaja co' due talloni delle lamine.

XI. FIGURA.

Questa dimostra l'Aorta aperta, perchè si veggano le colonne carnose, che tiene nella sua parte inferiore; donde è, che in tal parte sia ella molto gonfia.

X

XII. FI:

XII. F I G U R A.

In questa si vede la distribuzione dell'aorta.

A Il Cuore.

B L'Auricola.

C L'Aorta dilatata.

D Sua divisione in quattro rami per ciascun lato. Vedesi parimente, che ciascun di questi rami, scorrendo tutta la lunghezza del foglio, termini affatto nella sua estremità.

EEEE Quattro rami, che si distaccano da ciascuna branca circa un dito dal loro nascere, e che al capo di ciascun foglio, si scompartono. Nell'istessa figura si osserva, come ciascuna branca divida in altrettanti rami, quante lamine vi sono.

XIII. F I G U R A.

Questa rappresenta una porzione del foglio distaccata da uno de' lati della grondaia, & un poco rivolta, per far vedere, come l'arteria è contenuta nel voto, che i talloni delle lamine lasciano fra di loro. Si è disbrigata dalla vena, che la cuopre, e tirata un pò a basso per iscoprir meglio i pari de' rami, che dà ella alle lamine.

AA Grondaja.

B Una porzione del foglio.

C L'Arteria co' suoi rami.

XIV. F I G U R A.

Ne dimostra questa un par di lamine vedute di fronte, e le arterie di esse.

AA Il pajo delle lamine.

BB Il pajo delle arterie.

Donde si osserva, come ciascun di detti vasi divide un grandissimo numero di rami, che cuopro-
no

no le due superficie di ciascuna lamina, e come queste due arterie s'imboccano l'una con l'altra nel mezzo del loro giro.

XV. FIGURA.

Rappresenta questa l'istesse Arterie distaccate dalle lamine.

XVI. FIGURA.

Rappresenta ella la distribuzione delle vene delle ganasce interiori.

Vi si osserva, che la vena contenuta in ciascun' arco riceve circa ad un terzo di distanza da catuna delle loro estremità due rami, ogn'un de' quali si commette in ciascun'ordine di fogli, a quali è allattato; & il mezzo di questa vena s'attacca alla parte mezzana di detto foglio, fu di cui è piegato.

Tal distribuzione fassi, perche il giro de' vasi, che vanno alle lamine, sia più sicuro, e più facile.

AAA Il Tronco della vena delle ganasce interiori piegato all'in sù dell'aorta.

BBBB Luogo, ove ciascuna vena si divide in tre.

CCCC Luogo, ove dette vene s'inferiscono nel Tronco A.

DDDD Luogo, ove ciascuna di dette vene pur si divide in tre, due de' quali si riportano alle lamine.

EE Luogo, dove dette vene a due a due si riuniscono da ogni lato.

F Tronco formato dalla loro unione. Si avverta, che ciascuna di queste vene, nell'uscir dall'estremità della grondaja dell'Arco, i pareti del lor canale divengono più grossi, e prendono l'istesse consistenze delle arterie, quando che tutto 'l rimane.

manente di dette vene è sottile , e delicato ,
come il più fino vaso linfatico.

G Ramo dell'ultimo arco , qual prima della sua
riunione mena molti rami all'occhio , al naso ,
& al cervello , & a tutte le parti vicine della
testa.

Fa ella le veci di aorta ascendente , e 'l tronco for-
mato dall'accozzamento di dette vene divenute
Arterie serve di aorta discendente.

XVII. F I G U R A.

Questa rappresen-^a , come tutti i rami trasversali
dell'arterie , che cuoprono le due superficie di
ciascuna lamina , vengano ad imboccarsi in una
doccia , che va per l'estremità di ciascuna lami-
na , e che immettendosi nella grondaia del tallo-
ne, v'è a deporsi nella vena contenuta nella gron-
daja dell'Arco.

A Ramo dell'Arteria distaccata dal suo tronco.

B Rami , che cuoprono la lamina in tutta la sua
lunghezza.

CC Doccia , che serve di vena , in cui s' imboc-
cano immediatamente tutti i rami dell'arteria.

D Porzione di detta vena contenuta nella gronda-
ja del Tallone.



SPIEGAMENTO

DELLA MACHINA

*Formata per difaminare l'acceleramento delle palle,
che scorrono su de' piani inchinati; per com-
pararlo con quello della caduta
de' Corpi.*

SU di una base Esagona per ciascun'angolo di
essa si piantino 6. aste di ferro centinate, &
insieme nella sommità unite in un pezzo fondu-
to, sicche formino una Gabbia Paraboloida.

Due fili di ferro paralleli, che sporgono fu fuori
cinque linee, e ravvolti in una spirale, formino
intorno alla Paraboloida una scala ugualmente
inchinata all'orizzonte, su di cui una palla di 6
linee di diametro facilmente vi scorra fino a
basso, ove ritrova ella un pezzo, che l'arresta,
e fa entrare in un Cucchiajo a molla, che to-
sto la rispigne nel pezzo, che fa corona alla Ma-
china.

Detto Cucchiajo opera per mezzo di un moto
d'orologio nascosto nella base.

Questo moto si vede a piè della Tavola, e fassi co-
me quello dell'Istrumento del Pendolo.

La linguetta 1 Il Cucchiajo 3 qual'è tirato dal pez-
zo 2 (detto Cucchiajo fa come un martello d'oro-
logio) la vite 4 serve a stringere più, o meno la
molla, che innalza il Cucchiajo. Quel che vien
notato col numero 5 ritiene l'urto di detto Cuc-
chiajo, e serve a farlo piegar prestamente quan-
to

238 *Memor. dell'Accad. Reale delle Scienze.*

to bisogna, perche scagli per appunto la palla
nella corona,

Facilmente si mette la machina della livella per
mezzo di tre viti, che dilungano, o raccorciano
i tre piedi, che portano, in rivoltando i capi di
esse per l'insù, sino a che il fin del pendolo in-
contri esattamente il punto fiduciale, qual'è
fermato nel mezzo della base.

D, E, F, G I pezzi, che compongono uno de' piedi.
AB I pezzi del punto fiduciale.

CD Uno de' piccioli bracci, che sostengono i fili
di ferro.

E' uno degl'istelli bracci separato dall'asta.



605471



Fig. 1.




Fig. 4.

Fig. 2.



Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.



Fig. 8.

de Grado Sculp.



Fig. 9.




Fig. 11.





Fig. 12.



Fig. 15.



de Grada Scu






Fig. 19.



Fig. 18.





Fig. 20.



Fig. 23. Merid.




g. 24.

de Grado Sculp.





Mem: del' 1699. Tau. I. Pag. 3



de Grado Salp.



Pag. 26.




F

rado Sculp.



An. 1699. Pag. 49. in.



de Grado' Sculp.



Mem. 1699. Page 76.

Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 6.






Fig. 8.



de Graaf




Mem. 1699. Pag. 96
 l. 30. Piedi



de Grado Sculp.


Mem. del 1699. Pag. 142

Tau. III.



de Grady 3/4

O A FVOCO



ere racchiuso in A; è fatto
 de H-I; auuene, che premendo
 l. l'animella 18. si chiuda, e
 rano, per far salire l'acqua
 in questa parte, donde la
 uo centro, G. e la Cellena B.
 mentre che quest'ultima
 rimettere l'aere, che contini
 è dimostrato, che faccdo Q.
 12. 22. L di 18. è 23. 24.
 lita di 12. piedi, è che il.
 a quello dell'Acqua buo.
 forza pari a quella di 39

de Grado Sculp.



Mem. del. 1699. Pag. 164

ma



de Grado. Sculp.

tem del 1699. Pag. 164...

Seconda.



de Gracia Sculp.



An. 1699. Pag. 185.


Femina



piati



de Grato Sculpit.







10th May 253

8th 9th 10th

8th	9th	10th
4	4	5
8	9-0	10
12	13-4	15
16	17-0	19
20	21-6	23
24	25-11	27
28	29-15	31
32	33-4	35
36	37-8	39
40	41-13	43
44	45-17	47
48	49-21	51
52	53-25	55
56	57-29	59
60	61-33	63
64	65-37	67
68	69-41	71
72	73-45	75
76	77-49	79
80	81-53	83
84	85-57	87
88	89-61	91
92	93-65	95
96	97-69	99
100	101-73	103
104	105-77	107
108	109-81	111
112	113-85	115
116	117-89	119
120	121-93	123
124	125-97	127
128	129-101	131
132	133-105	135
136	137-109	139
140	141-113	143
144	145-117	147
148	149-121	151
152	153-125	155
156	157-129	159
160	161-133	163
164	165-137	167
168	169-141	171
172	173-145	175
176	177-149	179
180	181-153	183
184	185-157	187
188	189-161	191
192	193-165	195
196	197-169	199
200	201-173	203

Grado Scup



orde

80	90	100
3-2	2-8	2-13
5-0	5-10	6-4
7-8	8-7	9-6
10-0	11-4	12-8
12-8	14-1	15-10
15-0	16-14	18-12
17-8	19-11	21-14
20-0	22-8	25-0
22-8	25-5	28-2
25-0	28-2	31-4
27-8	30-15	34-6
30-0	33-12	37-8
32-8	36-9	40-10
35-0	39-6	43-12
37-8	42-3	46-14
40-0	45-0	50-0
42-8	47-13	53-2
45-0	50-10	56-4
47-8	53-7	59-6
50-0	56-4	62-8
52-8	59-1	65-10
55-0	61-14	68-12
57-8	64-11	71-14
60-0	67-8	75-0
62-8	70-5	78-2
65-0	73-2	81-4
67-8	76-15	84-6
70-0	78-12	87-8
72-8	81-9	90-10
75-0	84-6	93-12

de Graço Sulp.
































10









An. 1699. Pag. 273.



de Græco Sculp.

